

أولمبياد الرياضيات

٤٨م

الدُّور النَّهَائِي

2024-2023



إعداد: عبد الحفيظي عادل + بلقاسم / ع.

التمارين

3

مكثث:
+ النهر ينبع الصخرة ليس بقوته ولكن
بنابرئه.



فرنسا (2017)

الترin 01

• $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$ ثم استنتج قيمة $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

• $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 1$ حيث a, b, c و d أربعة أعداد طبيعية

• $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + \frac{1}{e} = 1$ حيث a, b, c, d و e خمسة أعداد طبيعية



فرنسا (2017)

الترin 02

ليكن $X = \sqrt{1+a+2\sqrt{a}} + \sqrt{1+a-2\sqrt{a}}$ حيث a عدد حقيقي موجب.

• أثبت أن $(X^2 - 4)(X^2 - 4a) = 0$

• ما هي القيم الممكنة لـ X ؟

• $\sqrt{1000000 + 2\sqrt{999999}} + \sqrt{1000000 - 2\sqrt{999999}}$ بسط مايلي :



فرنسا (2017)


الترin 03

ثلاثة سجاد (نفرض أنها دائيرية الشكل) لديها مساحة إجمالية تقدر بـ $200m^2$.

عن طريق التداخل الجزئي بينها فإنها تغطي سطحاً قدره $140m^2$.

الجزء المغطى من قبل إثنين من السجاد بالضبط ذو مساحة إجمالية قدرها $24m^2$.

ما هي مساحة الجزء المغطى من السجاد الثلاث المتداخل ؟



فرنسا (2017)


الترin 04

المستطيل $ABCD$ بعدها a و b ، E نقطة من $[AD]$ حيث $DE = \frac{1}{4}AD$

المستقيم الموازي لـ (DC) المار من E يقطع (BC) في F .


لتكن M منتصف $[DC]$ ، المستقيم (BM) يقطع (EF) في النقطة I .

أثبت أن شبه المنحرف $EIMD$ والثلث BIF لهما نفس المساحة.



التمرин 05

فرنسا (2017)



- النقطة E هي تقاطع القطعة $[OD]$ و (C_2) . تعطى : $OA = 10$ و $DE = 6$

$$\frac{AO}{AE} = \frac{AE}{AB} \quad \text{أثبت أن: } \quad 1$$

- احسب نصف قطر الدائرة (C_2) . السؤال 2

- (C_4) هي الدائرة ذات المركز I والتي تمر بالنقطة D . (C_4) تمس (C_2) في J و تمس (C_3) في K . احسب نصف قطر الدائرة (C_4) . السؤال 3

التمرين 06

السعودية (2006)



- نعتبر x عدد حقيقي .

$$2^{1994} + 4^{997} + 8^{665} = 16^x \quad \text{حل المعادلة: } \quad \text{السؤال 1}$$

التمرين 07



- m و n عدوان حقيقيان حيث : $m+n=1$ و $m^2+n^2=2$. احسب : m^4+n^4 . السؤال 2

التمرين 08

- ليكن $x > 0$ مع $\sqrt{x+9} + \sqrt{x} = 18$
- $\sqrt{x+9} - \sqrt{x} = \frac{1}{2}$ بين أن : السؤال 1

التمرين 09

- a عدد طبيعي .
- بين أن : $(a+1)(a+2) = a(a+3) + 2$ السؤال 1
- إستنتج أن العدد : $a(a+1)(a+2)(a+3) + 1$ مربع تام . السؤال 2

التمرин 10

وزارة الجلفة - الجزائر (2018) ← مساعدة ← الملل

مربع $ABCD$ ، النقطة M تقع داخل المربع $ABCD$ حيث : $MA = MB = MH$ و H هي المسقط العمودي للنقطة M على المستقيم (CD) .

أنشئ الشكل مع توضيح خطوات الإنشاء كالتاليًّا .

1 احسب الطول AM بدلالة a . (a طول ضلع المربع) .


← الملل ← مساعدة

بريطانيا (2004)

التمرين 11

في الشكل المقابل ثلاثة مربعات متطابقة


2 جد قيس الزاوية : $\hat{DHE} + \hat{CHE}$.



إذع أنَّ الأشياء التي أردت وما أقيمت بما قد قلت بما بالفعل.

التمرين 12

بريطانيا (2002)



مستطيل فيه :

M نقطة تقع داخله بحيث : $MD = 3\text{cm}$ ، $MB = 5\text{cm}$ ، $MA = 4\text{cm}$ و

احسب الطول .


← الملل ← مساعدة

مجهول المصدر

التمرين 13

خزان أسطواني الشكل موضوع أفقياً يستعمل لتخزين الماء . حسب المعطيات ،

ما هو حجم الماء الموجود حالياً في الخزان بالتر المكعب ؟



تعتني دائرة في الأشياء بقلوبنا وليس بعمر فنتنا.

← الملل ← مساعدة

الأردن (2001)

التمرين 14

المسافة بين مدینتين A و B هي 20km و المسافة بين المدينة B ومدينة أخرى C هي 17km . سافر شخص من A إلى B بالسيارة ومن B إلى C بالقطار فبذلك استغرق بالسفر من A إلى C ساعة واحدة و $\frac{8}{3}$ دقيقة ، في العودة سافر من C إلى B بالسيارة ومن B إلى A بالقطار وبذلك استغرق من


إلى A ساعة واحدة و $\frac{2}{3}$ دقيقة .

ما سرعة كل من السيارة والقطار بالكمتر/الساعة ؟

السؤال 15

على الشكل المجاور :

احسب مجموع أقياس الزوايا الداخلية لرؤوس النجمة .



اعتقدت دائمةً أنّي إن وضع كلّ ما تبذّه
من جهد لتحقيق النجاح ، النتائج سوف تأتي.

السؤال 16

x عدد حقيقي موجب حيث : $x - \frac{1}{x} = 1$

أثبت أنّ : $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ و استنتج أنّ :

السؤال 17

a عدد حقيقي .

حل المعادلة : $(7^{3a+1})^a = 1$.

بطل هو الذي يتعلم من دروس الماضي ، يلمس الحاضر ويفكر في المستقبل.

السؤال 18

$ABCD$ مربع و S نقطة خارجه بحيث يكون المثلث SAB متساوي الضلعين و قائم في S .

نضع : $AB = x$

احسب الطول SD بدلالة x .


السؤال 19

إليك الشكل المقابل حيث : $RT = OR = OT$

نعتبر $(O; i; j)$ المعلم المتعامد و المتجانس .

احسب إحداثياتي النقطتين T و R .

يتحقق الأمر متراكماً للإثبات الطريق الموجه نحو الأعلى أو تفاريق الطريق الموجه نحو الأسفل .



الترin 20



المعلم



ـ ولاية الجلفة - الجزائر (2017) ← مساعدة

$$\cdot \frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} = \frac{4}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$

ـ بين أنّ $a = b$. السؤال

الترin 21



المعلم



ـ ولاية الجلفة - الجزائر (2017) ← مساعدة

ـ حل المعادلة : $x^2 + 12x + 35 = 0$.

الترin 22




المعلم



ـ ولاية الجلفة - الجزائر (2017) ← مساعدة

$$\cdot S = \frac{\sqrt{3}EF^2}{4}$$



ـ شبه منحرف قائم E منتصف $[BC]$.

ـ و H هي المسقط العمودي لـ E على (AD) .

ـ بين أنّ $2HE = AB + DC$. السؤال

الترin 23



المعلم



ـ ولاية الجلفة - الجزائر (2017) ← مساعدة

الترin 24



المعلم



ـ للجيـا (2007)

ـ نعتبر 2017 كسرًا : $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_3}{b_3}, \dots, \frac{a_{2017}}{b_{2017}}$ ، حيث في كل منها البسط عدد طبيعي والمقام عدد طبيعي أيضاً غير معروف .

ـ أثبت أنه إذا كان α أصغر هذه الكسور ، و β أكبرها فإنّ : $\alpha \leq \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2017}}{b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{2017}} \leq \beta$. السؤال

الترin 25




المعلم



ـ الجزـا (2017)

ـ تم تقسيم مربع إلى 6 مستطيلات لها كلّها نفس المساحة بالطريقة الموضحة في الشكل المقابل .

ـ إذا علمت أنّ $AB = 25$. فـ BC هي قيمة ؟ السؤال



ـ المـصـدـ الذي يقوـ خـوـ الـجـاجـ معـطلـ ! عـلـيكـ إـذـاـ سـعـيـلـ السـلـلـمـ فـيـ خـطـوةـ فـيـ الـوقـتـ نـفـسـهـ .



تملأ حفية خزانًا في 4 ساعات و تفرغ أخرى هذا الخزان في 5 ساعات .
إذا فتح الحفيتان معاً ، فيكم من الوقت يملأ الخزان إن كان فارغاً؟



يتقاسم ثلات سكّان هم : (جاد و إِياد و معاذ) متزلاً ريفياً به فرن مشترك .
وضع جاد في الفرن 4 قطع من الحطب ووضع إِياد 6 قطع ، أمّا معاذ فلم يكن يملك حطباً . أراد معاذ أن يطبخ طعامه في الفرن المشترك و مقابل ذلك دفع لصاحبيه 10 دنانير .



— تقابل رجلان يوماً وكانت هذه المحادثة بينهما :

<p>١ كم أعمارهم ؟</p> <p>٢ جيد ... ولكن ذلك لا يكفي .</p> <p>٣ (بعد نظره إلى رقم العمارة) يُنصحني دليل و سأخبرك بالإجابة .</p> <p>٤ عرفت الإجابة .</p>		<p>١ أنا متزوج و عندي ثلاثة أولاد .</p> <p>٢ لن أخبرك بالأعمار ولكن سأدلّك على إشارة عليها : حاصل ضرب أعمارهم هو 36 .</p> <p>٣ حاصل جمع أعمارهم يساوي رقم العمارة التي خلفك</p> <p>٤ أكبرهم أشقر .</p>
--	---	--

صفحة فلاد في الرياضيات

هناك جزيرة يعيش عليها أناس طيبون وآخرون شريرون ، الطيبون دائمًا صادقون والشريرون دائمًا كاذبون . أتى إليك جاسم وباسم ، وقال لك باسم كلانا شرير . هل تستطيع أن تعرف إلى أي فريق يتبع كل منهما ، الطيب أم الشرير ؟

أكلت طريشك وأنت تقود سيارتك فوصلت إلى مفترق طرق به طريقان : A ، B و في وسط المفترق هناك بيت به طيب و شرير ، طرقت الباب و خرج لك شخص منهم ، طبعاً أنت لا تعلم إن كان طيباً أو شريراً حتى ثق بإجابته أم لا .

الترin 30

مجموع خمسة أعداد طبيعية متتالية هو: 10^{2019}
بين أنَّ العدد الأوسط مضاعف للعدد 2.

الترin 31

وَ C أعداد حقيقة غير معدومة ، إذا كان:

$$A + \frac{1}{B} = 1 \quad \text{وَ} \quad B + \frac{1}{C} = 1$$

احسب: $A \times B \times C$

الترin 32

ولالية الجلفة - الجزائر (2019) ← مساعدة
 $EFGH$ مستطيل ، N منتصف $[FG]$ وَ M منتصف $[FE]$.
 برهن أنَّ: $5MN^2 = GM^2 + EN^2$

الترin 33

ولالية الجلفة - الجزائر (2019) ← مساعدة
 ABC مثلث قائم في النقطة B حيث: $AC = x$

h طول الارتفاع المتعلق بالضلوع $[AC]$
 $BM^2 = AB \times BC$ يتحقق المساواة:
 والمتوسُّط $[BM]$ المتعلق بالضلوع $[AC]$ (اذكر خطوات الإنشاء بدقة).

هـ وـ جـ دـ تـ صـ حـ مـ بـ ؟ فـ يـ الـ حـ

تـوجـيهـاتـ حلـ التـمـرينـ 01 ← القـرـينـ ؟ ← المـلـهـ

- ١ • تجمع عدة كسور مقاماتها مختلفة ، نقوم بتوحيد المقامات بالبحث عن المضاعف المشترك الأصغر بينها.
- الاستنتاج: لاحظ العلاقة بين مقامات كسور الجموع الأول ومقامات كسور الجموع المطلوب.
 - ٢ استعن باستنتاج السؤال السابق.
 - ٣ انطلق من نتيجة السؤال الثاني ، وبإتباع نفس خطوات حل السؤالين السابقين ستصلك إلى المطلوب.

تـوجـيهـاتـ حلـ التـمـرينـ 02 ← القـرـينـ ؟ ← المـلـهـ

- ١ هذا السؤال يتطلب تمكّن جيد من الحساب الحرفي (النشر والتحليل) مع مراعاة قواعد الحساب على الجذور.
- ٢ راجع درس حل معادلة جداء معدوم ، مع ملاحظة أن x عدد حقيقي موجب لأنّه مجموع عددين حقيقيين موجبين.
- ٣ بتعويض قيمة $a = 999999$ في عبارة x نتحصل على العبارة المطلوب تبسيطها ومن خلال نتيجة السؤال السابق نعلم أن x قيمتين محتملتين.

$$\begin{cases} \sqrt{c^2} = c & \dots\dots\dots c \geq 0 \\ \sqrt{c^2} = -c & \dots\dots\dots c \leq 0 \end{cases}$$

تـوجـيهـاتـ حلـ التـمـرينـ 03 ← القـرـينـ ؟ ← المـلـهـ

- الجزء المغطى من قبل إثنين من السجاد يمثل $a+b+c$.
- المطلوب هو حساب مساحة k .

تـوجـيهـاتـ حلـ التـمـرينـ 04 ← القـرـينـ ؟ ← المـلـهـ

- عبر عن الأطوال التي تحتاجها لحساب مساحة كل من الشكلين بدلالة بعدي هذا المستطيل a و b .



مَدْبُونٌ فِي الْجَنَّةِ وَجَبَنٌ

توجيهات حل التمارين 05 ← المنهج ← القسمة ?

لاحظ أن المثلثان AOE و ABE قائمان ولهم زاوية مشتركة ، وبالتالي لهم نفس
جيب تمامها.

2 بالاستعانة بنتيجة السؤال السابق ، احسب طول قطر الدائرة (C_2) ثم استنتج طول نصف القطر.

3 طبق مبرهنة فيثاغورس على المثلث OBI القائم في O .

توجیہات حل التمرين 06

• لاحظ أن: $16 = 2^4$ و $8 = 2^3$ و $4 = 2^2$.

- استعمل خواص العمليات على القوى والتحليل باستعمال الخاصية التوزيعية.

توجیهات حل التمرن 07

توجیہات حل التمرن 08

● لاحظ أن العبارة المعطاة والعبارة المطلوب تبيّنها هما مجموع وفرق نفس العدددين ، إذن يجب استعمال المطابقة الشهيرة الخاصة بجداء مجموع حدّين وفرقهما.

توجیهات حل التمرين 09

١ انشر ثم بسط وبعد ذلك استعمل التحليل بالخاصية التوزيعية.

2 نقول عن عدد أنه مربع تام إن امكن التعبير عنه بجداء عددين طبيعيين متساوين ،
استعن بنتيجة السؤال السابق للوصول إلى المطلوب.

توجیهات حل التمرین 10

١. المربع هو رباعي أضلاعه الأربعة متساوية، وزواياه الأربع قائمة.

- محور قطعة مستقيم هو مجموعة النقاط المتساوية المسافة عن طرفيها .

• راجع درس المستقيمات الخاصة في المثلث (3متوسط).

2 طبق مبرهنة فيثاغورس لإيجاد طول الوتر AM المطلوب.



مَدْبُونٌ فِي الْجَنَّةِ وَجَبَنٌ

توجیہات حل التمرين 11

- أنشئ نظير الشكل بالنسبة لل المستقيم (HE) فيكون مجموع قيس الزاويتان المطلوبتان هو قيس زاوية حادة من مثلث قائم و متساوي الساقين.

توجیہات حل التمرین 12

- حاول تجزئة الشكل إلى عدّة مثلثات قائمة طول وتر كل منها هو أحد الأطوال المعطاة ، ثم بتطبيق مبرهنة فيثاغورس حاول إيجاد علاقة بين الأطوال توصلك للمطلوب.

توجیہات حل التمرین 13

- عليك أن تعي أن ارتفاع مستوى الماء لا يتناسب مع حجم الخزان.

توجیہات حل التمرن 14

- بإعتبار الحركات منتظمة ، حاول إيجاد جملة معادلتين من الدرجة الأولى بجهولين وقم بحلّها.

توجیہات حل التمرین 15

- إختر مثلثاً من الشّكل ، علماً أن مجموع أقياس زواياه الداخلية 180° ثم حاول كتابة أقياس زواياه بدلالة الزوايا المطلوب جمع أقياسها.

توجیہات حل التمرین ۱۶

- انطلق من العبارة المعطاة وصولاً إلى المطلوب بعد تربيع الطرفين.

فِيمَةٌ مِّنْ أَحَدِ الْعَبَارَتَيْنِ فِي الْأُخْرَىٰ

١٧ تحقیقات

- لاحظ أن: $7^0 = 1$ • ●

- راجع درسي قواعد الحساب على القوى ومعادلة جداء معدوم.

تجهيزات المتنزه

- في المثلث المتساوي الساقين:

زاويا القاعدة متقيايسن (تساعدك هذه الخاصية في الإنشاء) .

محور قاعدته هو محور تناظر المثلث.

- الطول المطلوب هو طول وتر مثلث قائم ، حاول كتابة طول ضلعيه القائمين بدالة x .

هـ وـ جـ دـ تـ صـ حـ وـ بـ ئـ ئـ فـ يـ الـ حـ



توجيهات حل الترين 19 ← القسمه ؟ ← المنه



- راجع خواص المثلث المتقايس الأضلاع.
يمكن لهذا السؤال أن يحلّ بأكثـر من طريقة (مبرهنة فياغورس - النسب المثلثية - حالات تطابق المثلثات).

توجيهات حل الترين 20 ← القسمه ؟ ← المنه



- المطلوب هو المقارنة بين a و b ، لذلك علينا التخلص أولاً من الكسر بالتوحد ثم جداء الطرفين والوسطين ثم النشر فالتحليل.

توجيهات حل الترين 21 ← القسمه ؟ ← المنه



- لاحظ أن: $35 = 36 - 1$.
- حلّ العبارة باستعمال متطابقة مربع مجموع ثم متطابقة جداء مجموع حدّين وفرقهما، ثم حل معادلة الجداء المعدوم المتحصل عليها.

توجيهات حل الترين 22 ← القسمه ؟ ← المنه



- في المثلث المتقايس الأضلاع:
 - ◀ محور أي ضلع منه هو محور تناظر المثلث.
 - ◀ الأضلاع متقايسة.
- مساحة مثلث تساوي نصف جداء طول أحد أضلاعه والارتفاع المتعلق بهذا الضلع.

توجيهات حل الترين 23 ← القسمه ؟ ← المنه



- بتطبيق مبرهنة طالس على المثلث ADC ، جد علاقـة بين HM و DC .
- بتطبيق مبرهنة طالس على المثلث CBA ، جد علاقـة بين ME و AB .
- بجمع العلـاقـتين السابـقتـين نتحصل على المطلوب.

توجيهات حل الترين 24 ← القسمه ؟ ← المنه



- إستعمل خواص المـتـبـاـيـنـات للوصـول إلى المـطلـوب.

توجيهات حل الترين 25 ← القسمه ؟ ← المنه



- ضع $x = BC$ ، ثم حـاـول مـقـارـنةـ الأـبعـادـ فيـ كـلـ المـسـطـيلـاتـ .

توجيهات حل الترين 26 ← القسمه ؟ ← المنه



- حـاـول أن تـقارـنـ بـيـنـ قـدـرـةـ الـخـفـيـتـيـنـ فيـ زـمـنـ مشـترـكـ ، ثم تـعمـمـ النـتـيـجـةـ إـلـىـ المـطلـوبـ .



الحلقة الأولى



← القسم



مساعدة

01

1 الحساب والاستنتاج:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

بضرب طرفي المساواة في $\frac{1}{2}$ نجد:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{2} \quad \text{وعليه فإن: } \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = 1 \quad \text{لدينا: } \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{2}$$

إذن الأربعة أعداد المطلوبة هي: $d = 12, c = 4, b = 2, a = 1$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} = \frac{1}{2} \quad \text{لدينا: } \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = 1$$

بضرب طرفي المساواة في $\frac{1}{2}$ نجد:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{24} = 1 \quad \text{إضافة } \frac{1}{2} \text{ إلى طرفي المساواة نجد:}$$

إذن الخمسة أعداد المطلوبة هي: $e = 24, d = 12, c = 8, b = 4, a = 2$

فيديو

تعرف على الفيلسوف هيباتوسوس
مكتشف الأعداد غير النسبية وما
كان يزعمه

▶ fc.com/adel.maths17

حل الأحجية

أطلب الحل عبر رسالة
على الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17

أحجية

ما قيس الزاوية التي يصنعها عقربا
ساعة تشير إلى ٥:٥٥

19



← القسم



مساعدة

02

1 الإثبات:

$$X^2 = \left(\sqrt{1+a+2\sqrt{a}} + \sqrt{1+a-2\sqrt{a}} \right)^2$$

$$X^2 = 1+a+2\sqrt{a} + 1+a-2\sqrt{a} + 2\sqrt{1+2+2\sqrt{a}} \times \sqrt{1+a-2\sqrt{a}}$$

$$X^2 = 2+2a+2\sqrt{(1+a+2\sqrt{a})(1+a-2\sqrt{a})}$$

$$X^2 = 2+2a+2\sqrt{(1+a)^2 - (2\sqrt{a})^2}$$

$$X^2 = 2+2a+2\sqrt{1+a^2+2a-4a}$$


$$X^2 = 2+2a+2\sqrt{1+a^2-2a}$$

$$X^2 = 2+2a+2\sqrt{(1-a)^2}$$

يتباع ...

انتبه: $(\sqrt{a})^2 = a$ حيث a عدد موجب.

$$\begin{cases} \sqrt{a^2} = a & \dots a \geq 0 \\ \sqrt{a^2} = -a & \dots a \leq 0 \end{cases}$$





الجبر والهندسة



$$\begin{aligned}
 (X^2 - 4)(X^2 - 4a) &= \left(2a + 2\sqrt{(1-a)^2} - 2\right) \left(2 - 2a + 2\sqrt{(1-a)^2}\right) \\
 &= 4 \left(\sqrt{(1-a)^2} + (a-1)\right) \left(\sqrt{(1-a)^2} - (a-1)\right) \\
 &= 4 \left((1-a)^2 - (a-1)^2\right) \\
 &= 4 \left((a-1)^2 - (a-1)^2\right) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$


وبالتالي:

في حالة مربع فرق، $a - b$
 بهم ترتيب المضاد.
 $(a - b)^2 = (b - a)^2$
 حيث a و b أعداد.

القيمة الممكنة ل X : 2
لدينا: $X = \sqrt{1+a+2\sqrt{a}} + \sqrt{1+a-2\sqrt{a}}$ إذن: X عدد حقيقي موجب.

$$\begin{aligned}
 (X^2 - 4)(X^2 - 4a) &= 0 \\
 X^2 - 4a = 0 \quad \text{أي:} \quad X^2 - 4 = 0 \quad \text{أي:} \\
 X^2 = 4a \quad \text{أو} \quad X^2 = 4 \quad \text{أي:}
 \end{aligned}$$

مجموع عددين موجبين
هو عدد موجب.



$$\begin{aligned}
 \begin{cases} X = 2\sqrt{a} & \text{مقبول} \\ X = -2\sqrt{a} & \text{مرفوض} \end{cases} \quad \text{أو} \quad \begin{cases} X = 2 & \text{مقبول} \\ X = -2 & \text{مرفوض} \end{cases}
 \end{aligned}$$

عليه:

إذن القيمة الممكنة ل X هي 2 و $-2\sqrt{a}$.

تبسيط العبارة: 3

$$X = \sqrt{1+a+2\sqrt{a}} + \sqrt{1+a-2\sqrt{a}} = \sqrt{(1+\sqrt{a})^2} + \sqrt{(1-\sqrt{a})^2}$$

$$\sqrt{(1+\sqrt{a})^2} = 1+\sqrt{a} \quad \text{فإن: } 1+\sqrt{a} > 0$$

$$\sqrt{(1-\sqrt{a})^2} = 1-\sqrt{a} \quad \text{فإن: } a \leq 1 \quad \text{أي } 1-\sqrt{a} \geq 0$$

$$\text{ومنه: } X = 1+\sqrt{a} + 1-\sqrt{a} = 2$$

$$\sqrt{(1-\sqrt{a})^2} = -(1-\sqrt{a}) \quad \text{فإن: } a \geq 1 \quad \text{أي } 1-\sqrt{a} \leq 0$$

$$\text{ومنه: } X = 1+\sqrt{a} - (1-\sqrt{a}) = 2\sqrt{a}$$

$$X = \begin{cases} 2 & ; \quad a \leq 1 \\ 2\sqrt{a} & ; \quad a \geq 1 \end{cases}$$

إذن:

يتبع ...



الجبر والهندسة




← القرن



04 ← مساعدة

إثبات تساوي مساحتي الشكلين:

لنعتبر عن المسافات $BC = AD = b$; $AB = DC = a$ بدلالة a و b فإن EI, IF, DM, BF, DE



لدينا: $DE = \frac{b}{4}$ يعني $DE = \frac{1}{4}AD$

بما أن: $FC = \frac{1}{4}BC$ و $DE = \frac{1}{4}AD$ فإن $(AB) \parallel (EF) \parallel (DC)$

. $BF = \frac{3b}{4}$ يعني $BF = \frac{3}{4}BC$ ومنه

لدينا: M منتصف $[DC]$ إذن $DM = MC$ ومنه $\frac{DC}{2} = DM = MC$ بتطبيق مبرهنة طالس على المثلثين BCM و BFI

. $IF = \frac{3a}{8}$ $IF = \frac{3}{4}MC = \frac{3}{4} \times \frac{a}{2} = \frac{3a}{8}$ إذن $IF = \frac{BF}{BC} \times MC$ وعليه $\frac{BI}{BM} = \frac{BF}{BC} = \frac{IF}{MC}$

. $IE = \frac{5a}{8}$ $IE = a - \frac{3a}{8} = \frac{5a}{8}$ ومنه $EI = EF - IF$ إذن $EI = EF - IF$ لدينا

لحسب الآن مساحتي الشكلين:

$$A_{(MIED)} = \frac{(EI + DM) \times DE}{2} = \frac{\left(\frac{5a}{8} + \frac{a}{2}\right) \times \frac{b}{4}}{2} = \frac{\frac{9a}{8} \times \frac{b}{4}}{2} = \frac{9ab}{64}$$

$$A_{(BIF)} = \frac{BF \times IF}{2} = \frac{\frac{3b}{4} \times \frac{3a}{8}}{2} = \frac{\frac{9ab}{32}}{2} = \frac{9ab}{64}$$

وعليه شبه المنحرف $EIMD$ والمثلث BIF لهما نفس المساحة.



مد أعملنا أيضًا
الأشعة والانسحاب:



drive.google

فيديو

لما يطلبُ من اطلاق مقام
الكسر دائمًا...

▶fc.com/adel.maths17



حل الأحجية

أطلب الحل عبر رسالة
على الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17

أحجية

كيف يمكنك صنع 4 مثلثات
متقاربة الأضلاع باستخدام 6
أعواد ثقاب فقط؟



الدالة المثلثية



القرين ?



مساعدة



05

إثبات العلاقة: 1

- من المثلث AOE القائم في O لدينا:

$$\cos \widehat{EAO} = \frac{AO}{AE}$$

- من المثلث ABE القائم في E لدينا:

$$\cos \widehat{EAB} = \frac{AE}{AB}$$

$$\cdot \frac{AO}{AE} = \frac{AE}{AB}$$

ومنه

حساب نصف قطر دائرة (C_2) 2

مما سبق لدينا: $AB = \frac{AE^2}{AO}$ ومن جهة أخرى
 $OE = OD - DE = 10 - 6 = 4$

بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم $:AOE$

$$\cdot AB = \frac{AE^2}{AO} = \frac{116}{10} = 11,6 \quad \text{إذن} \quad AE^2 = AO^2 + OE^2 = 10^2 + 4^2 = 116$$

وعليه نصف قطر الدائرة (C_2) يساوي $\frac{AB}{2} = 5,8$

حساب طول نصف قطر الدائرة (C_4) 3نسمى Ω مركز الدائرة (C_2) و r طول نصف قطر الدائرة (C_4) .بما أن (C_2) و (C_4) متangentان في J فإن النقط Ω , J و I على استقامة واحدة.وعليه: $OI = OD - ID = 10 - r$ $\Omega I = \Omega J + JI = 5,8 + r$ وأيضاً

$$\Omega O = AO - A\Omega = 10 - 5,8 = 4,2$$

بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث $\Omega O I$ القائم في O :

$$\Omega I^2 = \Omega O^2 + OI^2$$

$$(5,8 + r)^2 = 4,2^2 + (10 - r)^2$$

$$\cdot r = \frac{84}{31,6} = \frac{210}{79} \quad \text{أي} \quad 31,6 \times r = 84$$



الحلول المهمة



← القرين ?



← مساعدة

06

حل المعادلة:



عدد a^n عدد طبيعي.
 $a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ عامل}} \times a$
 عددان صحيحان نسبيان.
 $(a^m)^n = a^{m \times n}$, $a^{m+n} = a^m \times a^n$

$$\begin{aligned} 2^{1994} + 4^{997} + 8^{665} &= 16^x \\ 2^{1994} + (2^2)^{997} + (2^3)^{665} &= (2^4)^x \\ 2^{1994} + 2^{1994} + 2^{1995} &= 2^{4x} \\ 2^{1994} + 2^{1994} + 2 \times 2^{1994} &= 2^{4x} \\ 2^{1994}(1+1+2) &= 2^{4x} \\ 2^2 \times 2^{1994} &= 2^{4x} \\ 2^{1996} &= 2^{4x} \\ 1996 &= 4x \\ x &= 499 \end{aligned}$$



← القرين ?



← مساعدة

07

حساب : $m^4 + n^4$

$$mn = -\frac{1}{2} \quad 1 = 2 + 2mn \quad \text{أي } (m+n)^2 = m^2 + n^2 + 2mn \quad \text{لدينا:}$$

$$.2m^2n^2 = \frac{1}{2} \quad m^2n^2 = \frac{1}{4} \quad \text{أي وبالناتي}$$

$$2^2 = m^4 + n^4 + \frac{1}{2} \quad \text{ومنه } (m^2 + n^2)^2 = m^4 + n^4 + 2m^2n^2 \quad \text{من جهة أخرى لدينا:}$$

$$. m^4 + n^4 = \frac{7}{2} \quad \text{إذن: } m^4 + n^4 = 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2} \quad \text{أي}$$

فيديو

رسوم متحركة جميلة...
فتيات القوة | باتر كاب في مواجهة
الرياضيات.

fc.com/adel.maths17



حل الأحجية

أطلب الحل عبر رسالة
على الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17

أحجية

22 قسم ، به 9 أولاد و 13 فتاة. نصف التلاميذ

يعانون من نزلات البرد.

ما هو العدد الأدنى لعدد الفتيات المصابة بنزلات

البرد؟

- a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 e. 4



الحلول المخططة



القرين ?



مساعدة 08

$$\sqrt{x+9} - \sqrt{x} = \frac{1}{2}$$

لدينا: $\sqrt{x+9} + \sqrt{x} = 18$ ومنه:

$$\begin{aligned} (\sqrt{x+9} + \sqrt{x})(\sqrt{x+9} - \sqrt{x}) &= 18(\sqrt{x+9} - \sqrt{x}) \\ (x+9) - x &= 18(\sqrt{x+9} - \sqrt{x}) \\ \frac{9}{18} &= \sqrt{x+9} - \sqrt{x} \end{aligned}$$

$$\text{إذن: } \sqrt{x+9} - \sqrt{x} = \frac{1}{2}$$



القرين ?




مساعدة 09

١ تبيين صحة المتطابقة:

$$(a+1)(a+2) = a^2 + 2a + a + 2 = a^2 + 3a + 2 = a(a+3) + 2$$

٢ الاستنتاج:

$$\begin{aligned} a(a+1)(a+2)(a+3) + 1 &= a[a(a+3) + 2](a+3) + 1 \\ &= [a^2(a+3) + 2a](a+3) + 1 \\ &= a^2(a+3)^2 + 2a(a+3) + 1 \\ &= [a(a+3)]^2 + 2a(a+3) + 1^2 \\ &= [a(a+3) + 1]^2 \end{aligned}$$



• هناك طريقتين للتحليل: البحث عن العامل المشترك (المخصصة التجزيئية) أو استعمال المطابقات الشهيرة.
• المربع التام هو عدد طبيعي ناتج عن تربيع عدد صحيح ما.

لدينا: $1 + a(a+1)(a+2)(a+3) + 1$ عدد طبيعي وبالتالي فإن $a(a+3) + 1$ مربع تام.

فيديو

طريقة رائعة وفعالة جداً لحساب طول أي شبيه عالي وانت واقف على الأرض.

fc.com/adel.maths17



حل الأحجية

أطلب الحل عبر رسالة على الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17

أحجية

وضعنا ثلاثة دومينو على الشبكة أدناه.

23

في المربع السحري مجموع الأعداد في كل سطر، كل عمود وفي كل القطفين متساوي.

	● ●	● ● ●	
● ● ●		● ●	● ●
● ● ●	● ● ●		● ● ●
● ● ●	● ● ●	● ● ●	

كيف تضع قطع الدومينو الخامسة لتحصل على مربع سحري؟



الحلقة الافتتاحية



← القرنفلي؟



10 ← مساعدة


1 إنشاء الشكل مع توضيح الخطوات:

ننشئ رباعي أضلاعه متقاربة وزواياه الأربع قائمة ونسميه المربع $ABCD$.لدينا: $MA = MB = MH$ أي أن M تنتمي إلى محور القطعة $[AB]$.و H نقطة تقاطع محور القطعة $[AB]$ مع المستقيم (CD) .بما أن النقطة M متساوية المسافة عن النقط H, B, A . فهي مركز الدائرة المحيطة برؤوس المثلث ABH وبالتالي فهي نقطة تلاقى حاور أضلاع المثلث.2 حساب الطول AM بدلالة a :لتكن L المسقط العمودي للنقطة M على المستقيم (AB) .بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم ALM نجد:

$$AM = MH \quad AM^2 = AL^2 + LM^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + (a - AM)^2$$

$$2a \times AM = \frac{a^2}{4} + a^2 \quad \text{وعليه } AM^2 = \frac{a^2}{4} + a^2 + AM^2 - 2a \times AM \quad \text{ومنه}$$


$$AM = \frac{5}{8}a \quad AM = \frac{5a^2}{4} \div 2a = \frac{5a^2}{8a} = \frac{5a}{8} \quad \text{وبالتالي}$$



← القرنفلي؟

11 ← مساعدة


إيجاد قيس الزاوية:

نقوم بإنشاء نظير الشكل بالنسبة للمستقيم (HE) ،ونرسم الضلع $[HD']$ [نظير $[HD]$] بالنسبة إلى (HE) .نفرض أن $\widehat{CHE} = \beta$ و $\widehat{DHE} = \alpha$ وطول ضلع L .المطلوب إذن هو إيجاد قيس الزاوية $\alpha + \beta$.

يتبع...



الدروس المفتوحة



تطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم : CHF

$$CH^2 = L^2 + (2L)^2 = 5L^2 \dots\dots (1)$$

تطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم : $CC'D'$

$$D'C^2 = L^2 + (2L)^2 = 5L^2 \dots\dots (2)$$

تطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم : $HA'D'$

$$D'H^2 = L^2 + (3L)^2 = 10L^2 \dots\dots (3)$$

من (1), (2) نستنتج أن $D'H^2 = D'C^2 + CH^2$ ولدينا أيضاً $CH = D'C$.


وهذا يعني أن المثلث HCD متساوي الساقين وقائم C وبالتالي: $\alpha + \beta = 45^\circ$



القرآن



12



حساب الطول : MC

ننشئ الضلع $[EF]$ يمر بالنقطة M وحامله يوازي (BC) و (AD) .

ننشئ الضلع $[GH]$ يمر بالنقطة M وحامله يوازي (AB) و (CD) .

أولاً: من المستطيل $HMEB$ $MH^2 + ME^2 = 5^2 = 25 \dots\dots (1)$

ثانياً: من المستطيل $GMEA$ $MG^2 + ME^2 = 4^2 = 16 \dots\dots (2)$

ثالثاً: من المستطيل $GMFD$ $MF^2 + MG^2 = 3^2 = 9 \dots\dots (3)$

بطرح المعادلة (2) من (1) نجد: $MH^2 - MG^2 = 25 - 16 = 9 \dots\dots (4)$

بجمع المعادلتين (3) من (4) نجد: $MF^2 + MH^2 = 18$

إذن قطر المستطيل $MC = \sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$

فيديو

اجعل انشودة محمد تسعينا
دول الرياضيات / الابصريات.

fc.com/adel.maths17

حل الأحجية

أطلب الحل عبر رسالة على الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17

أحجية

24 قسم هذَا البستان إِلَى أَرْبَعْ قُطُّعٍ مُنْفَسِّرَةٍ مُنْفَسِّرَةٍ وَنَفْسِ الشَّكْلِ بِحِيثِ يَحْتَوِي كُلُّ مِنْهَا عَلَى نَفْسِ عَدْدِ أَشْجَارِ الْبَرْقَالِ.



الحلقة المائية

↑ ↓ ← →

← القرنفلي



13

حساب حجم الماء المتواجد في الخزان:

أولاً: حساب قيس الزاوية α :



(KENKO KK-105) ، باستعمال الآلة الحاسبة: $\cos \alpha = \frac{0,5}{1} = 0,5$




DEG

60

\cos^{-1}

نتحصل في الشاشة على:

ومنه $\alpha = 60^\circ$




$$S_V = R^2 \times \pi \times \frac{2\alpha}{360}$$


$$= 1^2 \times \pi \times \frac{120}{360} = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{إذن: } S_V = \frac{\pi}{3} m^2$$

ثانياً: حساب مساحة الجزء الأخضر:





$$S_R = \frac{2C \times 0,5}{2} = \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{1^2 - 0,5^2}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \div \frac{2}{1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$



$$\text{إذن: } S_R = \frac{\sqrt{3}}{4} cm$$

انتبه ، لا يمكنك تغيير ترتيب الحدود مع الطرح

رابعاً: حساب مساحة الجزء الأصفر:




انتبه ، لا يمكنك تغيير ترتيب المدخل مع عملية الطرح.

$$S_J = S_V - S_R = \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) m^2$$



الحلول المائية



وأخيراً يكون حجم الماء:


$$V = \left(R^2 \pi - S_J \right) \times H = \left(\pi - \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \times 8 \simeq 20,21 m^3$$



14

● حساب سرعة كل من السيارة والقطار:

نفرض أن سرعة السيارة V_1 وسرعة القطار V_2 فيكون:



$$\begin{cases} \frac{20}{V_1} + \frac{17}{V_2} = \left(60 + \frac{8}{3} \right) \text{ min} \dots\dots (1) \\ \frac{17}{V_1} + \frac{20}{V_2} = \left(60 + \frac{2}{3} \right) \text{ min} \dots\dots (2) \end{cases}$$

بضرب المعادلة (1) في 17 والمعادلة (2) في 20 وبطرح (2) من (1) نجد:

$$\frac{-111}{V_2} = \frac{-444}{3} = -148 \quad \text{تکافئ} \quad \frac{17^2}{V_2} - \frac{20^2}{V_2} = \frac{188 \times 17}{3} - \frac{182 \times 20}{3}$$

$$\therefore V_2 = 45 \text{ km/h} \quad \text{أي} \quad V_2 = \frac{111}{148} = \frac{3}{4} \text{ km/min}$$

بتعويض قيمة V_2 في المعادلة (1) نجد:


فيديو

طريقة الحساب بالعداد الصيني
طريقتك نحو تنمية الذكاء والتمرين.

fc.com/adel.maths17

حل الأحجية

أطلب الحل عبر رسالة على الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17



25 قارورة مكونة من أسطوانة

وعنق سعتها 1,5 لتر.

- ما كمية السائل الموجودة في القارورة؟




الجبر والهندسة



القرين ?



15



● حساب مجموع أقياس الزوايا الداخلية:

لدينا: $\hat{E} + \hat{C} + \hat{F} = 180^\circ$ (مجموع أقياس زوايا مثلث).

وعليه: $\hat{E} + \hat{C} + (180^\circ - \hat{G}) = 180^\circ$ (و \hat{G} زاویتان متکاملتان).

إذن: $(1) \hat{E} + \hat{C} = \hat{G}$

ولدينا: $\hat{A} + \hat{D} + \hat{I} = 180^\circ$ (مجموع أقياس زوايا مثلث).

وعليه: $\hat{A} + \hat{D} + (180^\circ - \hat{J}) = 180^\circ$ (و \hat{J} زاویتان متکاملتان).

إذن: $(2) \hat{A} + \hat{D} = \hat{J}$

من جهة أخرى لدينا: $(3) \hat{G} + \hat{J} + \hat{B} = 180^\circ$

بتعويض قيمة كل من \hat{G} و \hat{J} من المعادلتين (1) و (2) في (3) نجد:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} + \hat{E} = 180^\circ$$




القرين ?

16

● إثبات أن: $x + \frac{1}{x} = \sqrt{5}$

لدينا: $x^2 + \frac{1}{x^2} - 2 = 1$ أي $x^2 + \frac{1}{x^2} - 2x\frac{1}{x} = 1$ أي $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 1$ ومنه $x - \frac{1}{x} = 1$

أي $x^2 + \frac{1}{x^2} + 2x\frac{1}{x} = 3$ بإضافة العدد 2 إلى الطرفين: $x^2 + \frac{1}{x^2} + 2 = 5$ وعليه $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3$



المطابقات الشهيرتان
 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

تشتركان في المداء a^2 و b^2
ومنعاً لاستناد في إثارة الماء $2ab$

بالتحليل: $x + \frac{1}{x} = \sqrt{5}$ وأخيراً: $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 5$

استنتاج أن: $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

لدينا: $x - \frac{1}{x} = 1$ ومنه $x = 1 + \frac{1}{x}$ بتعويض قيمة $\frac{1}{x}$ من الإثبات في السؤال السابق نجد:

$$x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{وأخيراً: } 2x = 1 + \sqrt{5} \quad \text{ومنه } x = 1 + \sqrt{5} - x$$



الحلول المهمة



← القرين ?



17



عندما a عدد، و m, n عددين صحيحان نسبيان.
 $(a^m)^n = a^{mn}$ و $a^0 = 1$
 إذا كان a عاملين معدوما، فإن
 أحد عامليه على الأقل معدوما

$$\cdot \frac{-1}{3} .$$

● حل المعادلة:

$$7^{a(3a+1)} = 7^0 \quad \text{ومنه } (7^{3a+1})^a = 1$$

وعليه $a(3a+1) = 0$ وهي معادلة جداء معدوم ،


إذن $a = 0$ أو $3a+1 = 0$ وعليه للمعادلة حلان هما: 0 و $\frac{-1}{3}$



← القرين ?



18

● حساب الطول SD بدلالة x :● بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم $:SAB$

$$2a^2 = x^2 \quad \text{أي } a^2 + a^2 = x^2 \quad \text{أي } SA^2 + SB^2 = AB^2$$



● في المثلث متساوي الساقين محور قاعده
 هو متوازيها وارقاها أيضاً . $a^2 = \frac{x^2}{2}$ ومنه

● بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم $:SHB$

$$. SH = \frac{x}{2} \quad \text{أي } SH^2 = \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{4} \quad \text{أي } \left(\frac{x}{2}\right)^2 + SH^2 = a^2$$

● بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم $'$

$$SD^2 = \frac{x^2}{4} + \frac{9x^2}{4} = \frac{10x^2}{4} \quad \text{أي } SD^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(x + \frac{x}{2}\right)^2$$

$$\therefore SD = \frac{\sqrt{10}x}{2} \quad \text{وأخيراً}$$

فيديو
Europe 1100s AD

وكان عندما بدأ الأوروبيون، القسمين في برمجة كتب الرياضيات التي
كتبها العرب في القرن الثاني عشر.

لما سمع حبيب الزاوية \sin و حبيب
تعم الزاوية \cos بخطأ الاسم ...
fc.com/adel.maths17

حل الأحجية

أطلب الحل عبر رسالة
على الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17

● مد بيد 100 شخص تم استجوابهم ، أجاب 96 بأد لديهم تلفازاً
 وأجاب 72 شخصاً بامتلاكهـم جهاز لوحي رقمي .

● ما هو العدد الأدنى من الأشخاص الذين لديهم كلـا الجهاـزين؟



أحجية

26




الجبر والهندسة



← القرين ?



19 ← مساعدة



حساب إحداثياتي النقطتين T و R :
بما أن ROT مثلث متقارن الأضلاع فإن:
 $\widehat{TOE} = \widehat{ROE} = 30^\circ$ وأيضاً $\hat{R} = \hat{O} = \hat{T} = 60^\circ$
لأن المثلثين ROE و TOE قائمين ومجموع أقياس زوايا كل منهما 180° .

$$OE = OR \times \cos \widehat{ROE} = 1 \times \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{وعليه } \cos \widehat{ROE} = \frac{OE}{OR}$$

لدينا: $x_R = x_T = \frac{\sqrt{3}}{2}$

من جهة أخرى لدينا: $RE = OR \times \sin \widehat{ROE} = 1 \times \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ $\sin \widehat{ROE} = \frac{RE}{OR}$
وبما أن النقطتين R و T متناظرتين بالنسبة إلى المستقيم (OE) فإن: $y_T = -\frac{1}{2}$ $y_R = \frac{1}{2}$

$$T\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right) \quad R\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$$

وأخيراً:



← القرين ?



20 ← مساعدة

إثبات أن: $a = b$

$$\frac{\sqrt{b} + \sqrt{a}}{\sqrt{a}\sqrt{b}} = \frac{4}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \quad \text{يكافئ} \quad \frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} = \frac{4}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = 4\sqrt{a}\sqrt{b} \quad \text{يكافئ} \quad (\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = 4\sqrt{a}\sqrt{b} \quad \text{يكافئ}$$

$$a + 2\sqrt{ab} + b = 4\sqrt{ab} \quad \text{يكافئ} \quad (\sqrt{a})^2 + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = 4\sqrt{ab} \quad \text{يكافئ}$$

$$(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2 - 2\sqrt{ab} = 0 \quad \text{يكافئ} \quad a + b + 2\sqrt{ab} - 4\sqrt{ab} = 0$$

$$a = b \quad \text{يكافئ} \quad \sqrt{a} = \sqrt{b} \quad \text{يكافئ} \quad \sqrt{a} - \sqrt{b} = 0 \quad \text{يكافئ} \quad (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = 0$$



الحلقة الـ 21



← القرنفلي ?



21 ← مساعدة

● حل المعادلة:

$$x^2 + 12x + 36 - 1 = 0 \quad x^2 + 12x + 35 = 0$$


$$(x + 6)^2 - 1 = 0 \quad (x)^2 + 2(6)(x) + (6)^2 - 1 = 0$$

$$(x + 6 - 1)(x + 6 + 1) = 0 \quad (x + 6)^2 - 1^2 = 0$$

$$(x + 5)(x + 7) = 0 \quad \text{وهي معادلة جداء معدوم وعليه:}$$

$$x = -7 \quad x = -5 \quad \text{أي } x + 5 = 0 \quad \text{أو } x + 7 = 0$$

للمعادلة حلان هما: -5 و -7 .



- حل معادلة ذات مجهول x هو إيجاد كل القيم الممكنة للعدد x التي تحقق المساواة.
- **المطابقات الشهيرة:**
أعداد a و b :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$



من أعمالنا أيضاً
الحساب الحرفي:
[drive.google](http://drive.google.com)



من أعمالنا أيضاً
المعادلات والمعرجات:
[drive.google](http://drive.google.com)



← القرنفلي ?



22 ← مساعدة

● إثبات العلاقة:

[GH] الارتفاع المتعلق بالضلع [EF] (لاحظ الشكل المقابل).


$$\text{لدينا: (1)} S_{EFG} = \frac{1}{2} EF \times GH \dots$$

بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم :

$$GH = \sqrt{GF^2 - \left(\frac{EF}{2}\right)^2} = \sqrt{GF^2 - \frac{EF^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} EF$$

بتعمير قيمة GH في (1) نجد:

$$S_{EFG} = \frac{1}{2} EF \times \frac{\sqrt{3}}{2} EF = \frac{\sqrt{3} EF^2}{4} \quad \text{وهو المطلوب.}$$



- الارتفاع في مثلث هو المستقيم الذي يشمل أحد رؤوس المثلث وبعده الضلع المقابل.
- لحساب طول أحد الضلعين القائمين في مثلث قائم ، نحسب الفرق بين مربعين الطولين الآخرين.

فيديو

لغز حدسية بوانكاريه...
قصة شيقة لعالم رياضيات فارق...
fc.com/adel.maths17


حل الأحجية

أطلب الحل عبر رسالة
علم الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17

أحجية

ما لون الصندوق رقم 982-5?

27








الدالة الخطية



القرين ؟



مساعدة



إثبات العلاقة: بما أن $(DC) \parallel (HM)$ فإن المثلثان AHM و ADC في وضعية طاليس وبالتالي:

$$2HM = DC \dots\dots (1) \quad \text{أي } \frac{1}{2} = \frac{HM}{DC} \quad \frac{AH}{AD} = \frac{HM}{DC}$$

بما أن $(AB) \parallel (EM)$ فإن المثلثان CBA و CEM في وضعية طاليس وبالتالي:

$$2EM = BA \dots\dots (2) \quad \text{أي } \frac{1}{2} = \frac{EM}{BA} \quad \frac{CE}{CB} = \frac{EM}{BA}$$

بجمع المعادلتين (1) و (2) طرفاً بطرف نجد:

$$2HE = AB + CD \quad \text{أي } 2(HM + EM) = DC + BA$$



القرين ؟

مساعدة

إثبات العلاقة: بما أن $\alpha < \beta$ أصغر هذه الكسور ، و β أكبرها

$$\text{فإن: } \alpha \leq \frac{a_n}{b_n} \leq \beta \quad \text{من أجل كل: } n \in \{1, 2, \dots, 2017\}$$

$$\begin{cases} b_1\alpha \leq a_1 \leq b_1\beta \\ b_2\alpha \leq a_2 \leq b_2\beta \\ \vdots \\ b_{2017}\alpha \leq a_{2017} \leq b_{2017}\beta \end{cases}$$

و منه: b_n عدد طبيعي غير معدوم. لدينا :

باجمع طرف بطرف نجد :

$$\alpha(b_1 + b_2 + \dots + b_{2017}) \leq a_1 + a_2 + \dots + a_{2017} \leq \beta(b_1 + b_2 + \dots + b_{2017})$$

$$\therefore \alpha \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{2017}}{b_1 + b_2 + \dots + b_{2017}} \leq \beta \quad \text{هذا ما يكفي:}$$


فيديو

تعلم طرق وأساليب تحسين الذاكرة مد بطل العالم في الذاكرة.

fc.com/adel.maths17

حل الأحجية

أطلب الحل عبر رسالة على الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17





الحلقة الـ 25

← المساعدة ? ← القرنين ←

25

● حساب قيمة BC :


نضع : $BC = x$.

المستطيل (1) و (2) لهما ضلع مشترك طوله 25 ، وبما أنّ لهما نفس المساحة فإن لهما نفس طول البعد الآخر. المستطيل (4) طوله $2x$ وبما أنّ له نفس مساحة المستطيل (1) أي $25x$ ، فإن طول عرضه هو 12,5 نفس الأمر بالنسبة للمستطيل (5).

المستطيل (3) طوله 50 ، وبما أنّ مساحته هي $25x$ ، إذن عرضه هو $\frac{x}{2}$.

المستطيل (6) طوله $x + \frac{1}{2}x = \frac{3}{2}x$ و مساحته $25x$ ، إذن عرضه هو 10.

بما أنّ الشكل مربع بعده $x + \frac{1}{2}x = \frac{3}{2}x = 10$ فإن $2,5x = 60$ ، أي $x = 24$ ، و عليه : $BC = 24$.



← المساعدة ? ← القرنين ←

26

● حساب الوقت اللازم لملء الخزان:

تملاً الحنفية الأولى في الخزان خلال ساعة واحدة (**الربع** $\frac{1}{4}$)

تفرغ الحنفية الثانية من الخزان في ساعة واحدة (**الخمس** $\frac{1}{5}$)

يبقى في الخزان من الماء خلال ساعة واحدة (**العشرين** $\frac{1}{20}$)

إذن الوقت اللازم لملء الخزان هو : $\frac{1 \times 20}{1} = 20 \text{ h}$



• هنا النص من المسائل:
تملاً حنفيات .. يشتعلن
عاملات .. تتعزز آثارنا .. إن
يكلّ بنفس الفكرة وهي
البحث عن القدر المنجز
من قبل كل طرف خلال
زمن مشترك ، تم تعليم
النتيجة باستعمال التناصية.
ملامظ: ملئ مل السائل
أيضاً بطريقة فيزيالية باعتبار
الحركات منتظمة: $X=Vt$

فيديو

أدأه يذكر في المصور المطلقة
أو كما يجب أن تعرف بالصور الأدبية

جولة ممتعة في زعف العصر
الذهبي للعلوم عند العرب ...
fc.com/adel.maths17



أطلب الحل عبر رسالة
على الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17

أحجية

29



الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 3

● كم عدد العربات سيكون في الخطوة 100 ؟



الدّليل المُلْكِي



← المساعدة



← القراءة

27

حساب طريقة تقاسم الدنانير بالعدل:

لا يجب اعتبار أن 10 دنانير قد دفعت مقابل 10 قطع من الحطب (أي بمقدار دينار لكل قطعة) ، لأن في الحقيقة هذه النقود قد دفعت مقابل الثلث ($\frac{1}{3}$) فقط من القطع العشرة ، لأن الفرن مشترك . و بالتالي القطع العشرة تقدر بـ(10×3) أي 30 ديناراً ، وبهذا يكون ثمن قطعة الحطب الواحدة 3 دنانير ← بعد التوضيح السابق أصبح بإمكاننا حساب كم يبلغ نصيب كل من الجارين من الـ 10 دنانير ، حيث أن جاد يكون قد دفع 12 ديناراً لقاء 4 قطع من الحطب ، ولتكنه استعمل الفرن لقاء 10 من الدنانير ، وبالتالي يبقى له 2 ديناراً ، بينما دفع إياض 18 ديناراً لقاء 6 قطع من الحطب ، وبطرح 10 دنانير ثمناً لاستخدامه الفرن يتبقى له 8 دنانير ، وهذا فالتقسيم الصحيح يكون بإعطاء جاد 2 دينار ، وإعطاء إياض 8 دنانير ، وبهذا يكون كل من الجيران الثلاث دفع 10 دنانير.



← المساعدة



28

حساب أعمار الأولاد الثلاثة:

قال الرجل: حاصل ضرب أعمارهم 36 ، أي أن الإحتمالات كالتالي:

$$6 \times 3 \times 2 = 36 \quad 6 \times 6 \times 1 = 36 \quad 12 \times 3 \times 1 = 36 \quad 36 \times 1 \times 1 = 36$$

$$4 \times 3 \times 3 = 36 \quad 9 \times 2 \times 2 = 36 \quad 9 \times 4 \times 1 = 36 \quad 18 \times 2 \times 1 = 36$$

ثم قال: حاصل جمع أعمارهم يساوي رقم العمارة التي خلفك:

$$6 + 3 + 2 = 11 \quad 6 + 6 + 1 = 13 \quad 12 + 3 + 1 = 16 \quad 36 + 1 + 1 = 38$$

$$4 + 3 + 3 = 10 \quad 9 + 2 + 2 = 13 \quad 9 + 4 + 1 = 14 \quad 18 + 2 + 1 = 21$$

لو نظرت إلى الأرقام ستلاحظ أمراً مهماً ، وهي أن حاصل جمع الأرقام كلها مختلفة ، فيما عدا الرقم 13 ، والمفتاح في حل اللغز يكمن هنا.

الرجل الأول أخبر الرجل الثاني بأن حاصل الجمع مساوي لرقم العمارة ، و كان رد الثاني أنه يريد دليلاً أخيراً حتى يعرف الحل ، وبهذه الكلمة يتضح لنا السبب ل حاجته للدليل الأخير ، إذا أنه من الواضح أن رقم العمارة كان 13 ، وإنما لكان عرف الأعمار مباشرة.

إذن الحل موجود بين : (6,1) و (9,2,2) . الدليل الأخير يكفي لمعرفة الإجابة ، الأول أخبر الثاني أن أكبرهم أشقر ، و كلمة أكبرهم هي الدليل ، والجواب هو أن أعمارهم هي : (9,2,2) ، لأن: (6,1,6) ليس فيها ولد أكبر بل توأم.



الحلقة الأولى



← التفريغ ?



→ مساعدة 29

● إجابة الشطر الأول من اللغز:

جسم لا يمكن أن يكون طيباً لأنَّ الطيب صادق وَ الصادق لا يمكن أن يقول عن نفسه كاذب إذن هو كاذب وَ كذبه حين جمع نفسه مع باسم في فريق واحد ، وَ عليه فإنَّ باسم طيب.

● إجابة الشطر الثاني من اللغز:


السؤال الذي تطرحه على الشخص في بيته هو : إن سألت من معك في البيت عن الطريق بما سيجيئني ؟ وَ الجواب الذي تسمعه منه خذ الطريق المخالف له.

ففرضنا أنَّ من سأله طيب فهو يعرف أنَّ من معه في البيت شرير ، وَ وبالتالي سيعطيك إجابتة الكاذبة ، فما عليك سوى أخذ الطريق المخالف لها . أما إنْ كان من سأله شريراً فهو يعرف أنَّ من معه طيب ، وَ وبالتالي سيعطيك عكس إجابتة الصادقة وَ عليه ستأخذ الطريق المخالف لها أيضاً.



← التفريغ ?

→ مساعدة 30



كلِّ المثل الآتية لها نفس المعنى:
 $x \text{ يقسم } 2 \checkmark$ $x \text{ قاسم لـ } 2 \checkmark$
 $x \text{ يقبل القسمة على } 2 \checkmark$ $x \text{ مضاعف لـ } 2 \checkmark$

$$5x = 10^{2019} \quad (\text{ومنه}) \quad (x-2) + (x-1) + x + (x+1) + (x+2) = 10^{2019}$$

$$\text{وعليه } x = \frac{10^{2019}}{5} = \frac{10 \times 10^{2018}}{5} = 2 \times 10^{2018}$$

● إثبات أنَّ العدد الأوسط مضاعف للعدد 2 :

نفرض أنَّ العدد الأوسط هو x فيكون:



← التفريغ ?

→ مساعدة 31



هل تعلم أنَّ
 $\frac{\square}{\diamond} \times \diamond = \frac{\square \times \diamond}{\diamond} = \square \times \frac{\diamond}{\diamond}$
 انتبه من الأخطاء الشائعة في المoltiplication:
 $\frac{\square + \diamond}{\square} = \diamond \times \square \quad \text{خطأ} \quad \frac{\square \times \diamond}{\square} = \diamond \checkmark \quad \text{صحيح}$

: $A \times B \times C$ حساب

$$\text{لدينا: } A = 1 - \frac{1}{B} \dots\dots (1) \quad \text{أي } A + \frac{1}{B} = 1$$

$$\text{وَ } B = 1 - \frac{1}{C} \dots\dots (2) \quad \text{أي } B + \frac{1}{C} = 1$$

$$\text{بعويض قيمة } B \text{ من (2) في (1) نجد: } A = 1 - \frac{1}{C-1} = 1 - \frac{C}{C-1} = \frac{-1}{C-1}$$

$$\therefore A \times B \times C = \left(\frac{-1}{C-1} \right) \left(1 - \frac{1}{C} \right) \times C = \left(\frac{-1}{C-1} \right) \left(\frac{C-1}{C} \right) \times C = -1$$




الدالة الخطية



القرين ?



مساعدة 32

بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم $:MFN$

$$MF^2 + FN^2 = MN^2 \dots\dots (1)$$

بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم $:MFG$

$$MF^2 + FG^2 = GM^2 \dots\dots (2)$$


بتطبيق مبرهنة فيثاغورس على المثلث القائم $:EFN$

$$EF^2 + FN^2 = EN^2 \dots\dots (3)$$

. جمع (2) و (3) طرفاً بطرف نجد:

. لكن N منتصف $[FG]$ و M منتصف $[FE]$ و عليه $FG = 2FN$ و $EF = 2MF$

بالتوييع في العلاقة السابقة نجد:



صيغة السؤال: بين .. أثبت .. برهن ..
لها نفس المعنى.
Q. E. D. هي علامة كانت أقليديوس يكتتب بها براهين.

$$MF^2 + (2FN)^2 + (2MF)^2 + FN^2 = GM^2 + EN^2$$

$$MF^2 + 4FN^2 + 4MF^2 + FN^2 = GM^2 + EN^2$$

$$5MF^2 + 5FN^2 = GM^2 + EN^2$$

$$5(MF^2 + FN^2) = GM^2 + EN^2$$

من العلاقة (1) لدينا $5MN^2 = GM^2 + EN^2$ وعليه نستنتج أن $MF^2 + FN^2 = MN^2$ وهو المطلوب.

القرين ?



مساعدة 33

خطوات إنشاء المثلث $:ABC$ مساحة المثلث ABC هي: $S_{ABC} = \frac{AB \times BC}{2}$ ومن جهة أخرى تحسب بالعلاقة: $.2S_{ABC} = AC \times h$ وعليه $S_{ABC} = \frac{AC \times h}{2}$ مما سبق نستنتج أن: $hx = BM^2$ أي $hx = AB \times BC$ أي $AC \times h = AB \times BC$ (خاصية طول المتوسط المتعلق بوتر مثلث قائم). أي $hx = \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4}$ وأخيراً $.h = \frac{x}{4}$


يتبع...



الدّائرة

اذن النقطة B تبعد عن المستقيم (AC) بـ $\frac{x}{4}$ وعليه فهي تقع على أحد المستقيمين

الموازيين للمستقيم (AC) ويبعد كل منهما عن هذا الأخير بـ $\frac{x}{4}$.




خطوات الإنشاء بدقة:

1. ننشئ قطعة $[AC]$ والنقطة M منتصفها.

2. ننشئ الدائرة (C) التي مر كرها M وقطرها $[AC]$.

3. ننشئ نصف القطر $[MA']$ العمودي على $[AC]$.

4. النقطة B هي إحدى نقاط تقاطع محور القطعة $[MA']$ مع الدائرة (C) .



الإنشاء:

فيديو

طريقة رائعة وعملية لرسم دائرة جعلية باليد العرقية...
fc.com/adel.maths17



أطلب الحل عبر رسالة على الرابط التالي:
fc.com/adel.maths17

أحجية

للفوز بجهاز بلاي ستيشن ، يجب أن ينجح معاذ في أقل من خمس دقائق في شق طريقه عبر المغامرة أدناه .

القاعدة هي كما يلي:

يمكن للمرء أن ينتقل من خانة

إلى أخرى عن طريق ضاع مشترك أو رأس مشترك.

الانتقال ممكن فقط إذا كانت الخانات تحتويان على عدادات ليسا أوليان فيما بينهما.

48	35	53	21	103	317
19	44	77	45	79	108
39	67	25	23	14	15
97	53	60	63	43	27
204	19	11	11	75	144
26	10	28	95	657	511