

على الطالب ان يختار أحد الموضوعين التاليين

ملاحظة : في كل موضوع اختر تمرين ما بين الهندسة الفضائية و الاحتمالات أما باقي التمارين فهي إجبارية

الموضوع الأول :

التمرين الاول (04ن):

1. نعتبر في المستوى المركب المنسوب الى معلم متعمد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ النقطتين A و B لاحقا هما على الترتيب $z_B = 3 - i$ ، $z_A = 4 + 2i$

أ. أكتب على الشكل الجبري ثم على الشكل المثلثي العدد المركب $\frac{z_B - z_A}{z_B}$

ب. ثم استنتج طبيعة المثلث ABO .

2. نعتبر التحويل النقطي R في المستوى الذي يرافق بكل نقطة $M(z')$ النقطة $M(z)$ و الذي يحول النقطة A إلى النقطة B و يحول النقطة B إلى النقطة O .

أ. بين ان العبارة المركبة للتحويل النقطي R هي : $z' = -iz + 1 + 3i$ ثم عين طبيعة R و عناصره المميزة . ب. عين z_C لاحقة النقطة C صورة النقطة O بالتحويل R ، ثم استنتاج طبيعة الرباعي ABOC .

3. أ. عين مجموعة النقط M من المستوى لاحقا ها z حيث : $|z - 4 - 2i| = |z|$

ب- من اجل $i + 2 \neq z$ نضع : $L = \frac{z' - 2 - i}{z - 2 - i}$.

ج- عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون L^n حقيقة .

د- بين ان : $(z' - 2 - i)^2 + (z - 2 - i)^2 = 0$.

التمرين الثاني (05ن) :

لتكن المتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ : $u_0 = 3$ و $3u_{n+1} = u_n + 4n + 4$

1. أحسب u_1 ، u_2 ، u_3 .

2. أ- برهن انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 0$.

ب- استنتاج انه من اجل كل عدد طبيعي $n \geq 1$ ، $u_n > \frac{4}{3}n$.

3. لتكن (v_n) متالية معرفة على \mathbb{N} بـ : $v_n = u_n - 2n + 1$.

أ- بين ان (v_n) هندسية يتطلب تعين أساسها وحدتها الأولى .

ب- استنتاج انه من اجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 4\left(\frac{1}{3}\right)^n + 2n - 1$.

ج- أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

4. نعتبر المتالية (w_n) المعرفة بـ $w_0 = -1$ و من اجل كل عدد طبيعي غير معروف : $3 + w_{n-1} = nw_n(n+1)$

أ- أحسب w_1 ، w_2 ، w_3 ، w_4 . ما تتخمينك لطبيعة المتالية (w_n) ؟

ب- برهن صحة تخمينك لطبيعة المتالية (w_n) ثم احسب w_{1008}

التمرين الثالث (04ن) (اختيار):

- يحتوي صندوق على ثلاثة كرات بيضاء و سبع كرات سوداء (لا يمكن التمييز بينهم عند اللمس)
- نسحب عشوائيا و في ان واحد كرتين من الصندوق و نعتبر A و B حدثين
A : الكرتان المسحبتان لونهما أسود ، B : سحب كرة بيضاء على الأقل
- أحسب احتمال A و B .
 - نعتبر التجربة العشوائية التالية : نسحب كرة واحدة من الصندوق ، فإذا كانت بيضاء نتوقف عن السحب و إذا كانت سوداء نضعها جانبا ثم نسحب كرة ثانية و أخيرا من الصندوق . ليكن C و D الحدثين التاليين :
C: " الحصول على كرة بيضاء في السحبة الاولى " . D: " الحصول على كرة بيضاء " .
- أحسب احتمال C و D .

التمرين الثالث(04ن) (اختيار):

نعتبر في الفضاء المنسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقط $A(3; -2; 1)$ ، $B(5; -3; 2)$ ، $C(2; 3; 2)$ ، $D(-1; -5; 2)$

- أ- تحقق ان النقط A ، B و C تعين مستوى (P) .
ب- أوجد العددين الحقيقيين α و β بحيث يكون الشعاع $(\alpha; 1; \beta)$ ناظمي لـ (P) .
ج- أكتب معادلة ديكارتية للمستوى (P) .
- أ- اكتب تمثيلا و سطحيا للمستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة D و يعادل المستوى (P) .
ب- أوجد احداثيات النقطة H نقطة تقاطع المستوى (P) و المستقيم (Δ) .
- (C) هي الدائرة التي مركزها H و نصف قطرها $R=2$.
- ج معادلة لسطح الكرة (S) التي مركزها D حيث : $(S) \cap (P) = (C)$.

التمرين الرابع(07ن) :

المستوى منسوب الى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$$(C_f) \text{ التمثيل البياني للدالة } f \text{ المعرفة على } \mathbb{R}^* \text{ بالعبارة : } f(x) = 1 - \frac{\ln x^2}{x}$$

- أحسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة التعريف ثم فسر النتائج هندسيا .
- أ- درس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .
ب- درس الوضعيه النسبية للمنحنى (C_f) و المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 1$.
ج- أحسب $f(x) + f(-x)$ ماذا تستنتج ؟
- بين ان المعادلة $0 = f(x)$ تقبل وحيدا α حيث : $-0.5 < \alpha < -1$ ، فسر ذلك هندسيا .
- أثبت ان المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) يشمل النقطة $(1; 0)$ و يمسه في نقطتين يطلب تعين احداثياتها ثم ج معادلة المماس (T) .
- رسم (T) ، (C_f) و (Δ) .
- أ- نقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد حلول المعادلة التالية $f(x) = mx + 1$.
7. لتكن الدالة h المعرفة على \mathbb{R}^* بـ $h(x) = 1 + \frac{\ln x^2}{|x|}$
أ- برهن أن h زوجية .
ب- أرسم المنحنى (C_h) اعتمادا على (C_f) مع الشرح .

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني(20ن)

التمرين الأول (50ن):

1. حل في \mathbb{C} المعادلة : $(z^2 + 4)(z^2 - 6z + 10) = 0$.
2. المستوى المركب المنسوب الى معلم متعمد ومتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. لتكن النقط A ، C ، B ، D و E التي لواحقها على الترتيب : $z_E = 2 - 2i$ ، $z_D = 3 + i$ ، $z_C = 3 - i$ ، $z_B = -2i$ ، $z_A = 2i$.
- أ- اكتب العدد المركب L على الشكل الأسني حيث : $L = \frac{z_C - z_A}{z_D - z_B}$ ثم فسر النتيجة هندسيا .
- ب- استنتج أنه يوجد دوران وحيد R يحول B إلى A و يحول D إلى C يطلب ايجاد زاويته .
3. لتكن (Γ_1) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تتحقق : $\arg(iz + 1 - 3i) = \frac{-\pi}{4}$.
- أ- تتحقق أن B تتبع إلى المجموعة (Γ_1) ، ثم عين طبيعة (Γ_1) .
- ب- نسمى (Γ_2) صورة (Γ_1) بالدوران R . عين المجموعة (Γ_2) .
4. نرفق بكل نقطة M من المستوى المركب ذات اللاحقة z ذات النقطة 'M ذات اللاحقة 'z بالدوران R .
- أ- اكتب العبارة المركبة للدوران R . ثم عين سابقة النقطة O بالدوران R .
- ب- عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث : $|z_A - iz + 2 + 2i| = 1$.
- ج- عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث يكون العدد المركب $\frac{z - z_B}{z - z_D}$ حقيقيا سالبا .

التمرين الثاني(40ن):

- لتكن (u_n) متتالية عدديّة معرفة على \mathbb{N} بحدها الاول $u_0 = \alpha$ و من أجل كل عدد طبيعي n :
1. عين قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة .
2. نفرض ان $u_0 = 0$.
- أ- ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية و تقاربها .
- ب- برهن بالترابع انه من اجل كل عدد طبيعي n : $0 \leq u_n < 1$.
- ج- أدرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .
3. لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} كمالي : $v_n = \frac{u_n + 2}{u_n - 1}$.
- أ- برهن ان (v_n) هندسية يطلب تعين أساسها وحدتها الاول .
- ب- أكتب عبارة u_n بدلالة n
- ج- أحسب المجموع : $P_n = v_0 \times v_1 \times \dots \times v_n$ $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ حيث :

التمرين الثالث(40ن) (اختيار):

كيس به 10 كريات متماثلة لا نفرق بينهم باللمس . 7 كريات بيضاء تحمل الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 و 3 كريات سوداء تحمل الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 2 ، 1 .

1. نسحب عشوائيا كريتين في ان واحد
2. أحسب احتمال الحصول على كريتين بيضاوين .
- ب- أحسب احتمال الحصول على كريتين تحملان رقمين فرددين .
- ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات البيضاء المسحوبة
- أ- عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .
- ب- أحسب الامل الرياضي E(X) للمتغير العشوائي X .

التمرين الثالث (40ن) (اختياري)

نعتبر في الفضاء المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D) ومعادلة ديكارتية لل المستوى (P) .

$$\text{. (P): } x + 2y - 3z - 1 = 0 \quad , \quad \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = -3 - \lambda \end{cases}$$

اختر الاجابة الصحيحة مع التعليل :

الاقتراح الثالث	الاقتراح الثاني	الاقتراح الاول	
$A(-1; 3; 2) \in (D)$	$B(2; -1; -1) \in (D)$	$C(3; 1; -4) \in (D)$	1
(D) $\vec{w}(3; 1; 4)$ هو شعاع توجيه لـ	(D) $\vec{u}(-2; 1; 1)$ هو شعاع توجيه لـ	(D) $\vec{u}(1; 2; 3)$ هو شعاع توجيه لـ	2
(P) يقطع	(P) يوازي تماما	(P) يوازي	3
المستوي (Q_3) الذي معادلته : $x + 2y - 3z + 1 = 0$	المستوي (Q_2) الذي معادلته : $-4x + 5y + 2z + 3 = 0$	المستوي (Q_1) الذي معادلته : $-3x + 2y - z - 1 = 0$	4
المسافة بين النقطة $M_1(-1; -3; 2)$ و المستوي (P) هي: $\sqrt{14}$	المسافة بين النقطة $M_1(-1; -3; 2)$ و المستوي (P) هي: 14	المسافة بين النقطة $M_1(-1; -3; 2)$ و المستوي (P) هي: $2\sqrt{3}$	5

التمرين الرابع (40ن):

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} بالعبارة : $f(x) = x - (x^2 + 1)e^{-x+1}$.

(C_f) التمثيل البياني للدالة f في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ثم بين أن $f(x) = +\infty$.

$$f'(x) = 1 + (x - 1)^2 e^{-x+1}$$

ب- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

ج- استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

2. بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند ∞ ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ) .

3. بين أن المعادلة $0 = f(x)$ تقبل حل واحدا α حيث $1.8 < \alpha < 1.9$.

4. أكتب معادلة ديكارتية للمماس (T) لمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 .

5. أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f''(x) = -(x - 1)(x - 3)e^{-x+1}$.

ب- استنتج أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعبيئها .

6. أحسب $f(0)$ ، $f(3)$ ثم أرسم (Δ) ، (C_f) و (T) .

7. نقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد و إشارة حلول المعادلة : $f(x) = x + m$.

انتهى الموضوع الثاني

موفقون في شهادة البكالوريا ان شاء الله

استاذة المادة : مباركي ف