

الفروض و الاختبارات
مع الحلول الكاملة

سلسلة
التحدي
فما

الرياضيات

لمياء محفوظ

AM

ème



دار التحدي



مقدمة

يأتي هذا الكتاب تتويجا لمجهوداتنا المتواضعة في عالم الرياضيات،
وقصدنا من وراء ذلك تقديم الخدمة لتلاميذنا الأعزاء في السنة
الرابعة متوسط من أجل تسهيل الفهم وتعميقه والتدريب على
التحكم في آليات حل التمارين والمسائل
هذا الكتاب من سلسلة التحدي في الفروض والاختبارات
يشمل عدة فروض واختبارات موزعة ومرتبطة حسب الفصول
الدراسية والتي تهدف إلى تدريب التلاميذ على كيفية التعامل
مع الأسئلة والاستفادة من الأجوبة المقترحة.

هذا وندعو تلاميذنا الأعزاء إلى الاجتهاد في حل هذه المواضيع
قبل تصفح الحلول تفعيلا للفائدة المستهدفة من وراء هذا الكتاب
الذي نأمل أن يلبي بعض حاجيات تلاميذنا في مادة الرياضيات
ويساعدهم على الفهم والتعلم.
والله من وراء القصد.

نماذج الفصل الأول

الفرض الأول



التمرين الأول

حل المعادلات إن أمكن:

- $\frac{5+x}{3} - \frac{2x-1}{4} = \frac{x}{4} + 1$
- $2(x-7) = -2(4-x)$
- $x^2 - 13 = 12$

التمرين الثاني

1 انشرو بسط العبارة A بحيث:

$$A = (4x+2)(x-2)$$

2 حلل العبارة B إلى جداء عاملين بحيث:

$$B = (3x-1)^2 - (2x+1)^2$$


3 حلل العبارة C بحيث:

$$C = B - (4x^2 - 6x - 4)$$

4 حل المعادلة: $C = 0$.

التمرين الثالث

لاحظ الشكل:



الجزء الأول

لدينا $AB = CE$

1 احسب مساحة الجزء الغير مظلل بدلالة x .

2 احسب هذه المساحة علما أن $x = 4$.

الجزء الثاني


1 ارسم الشكل بدقة.

2 ارسم الشعاع BF بحيث $\overline{BF} = \overline{BE} + \overline{BC}$

3 ما نوع الرباعي EBCF.

4 أكمل ماييلي: $\overline{BC} + \overline{FE}$

$\overline{DE} + \overline{AB}$, $\overline{AD} - \overline{ED}$





الفرض الثاني

التمرين الأول

x, y عدنان طبيعيا بحيث : $520x = 169y$

1 أحسب الكسر $\frac{x}{y}$

التمرين الثاني

أوجد قيمة x علما أن باقي القسمة الاقليدية للعدد 68 على x هو 4.
باقي القسمة الاقليدية للعدد 87 على x هو 7.

التمرين الثالث

حل المعادلات ذات المجهول x

$$x^2 = 15$$

$$x^2 + 25 = 0$$

$$2x^2 - 18 = 0$$

التمرين الرابع

ABC مثلث قائم في A بحيث :

$$AB = 4cm \quad \hat{ABC} = 60^\circ$$



التحدي في الفروض والاختبارات

1 احسب BC ثم AC (اعط الدور إلى الوحدة)

2 ارسم (C) دائرة مركزها B ونصف قطرها [AB] تقطع [BC] في E.

3 أنشئ المستقيم الذي يشمل E ويعامد [AC] في K.

4 استنتج الطول EC

5 أحسب الطولين EK, CK.





الفرض الثالث

التمرين الأول

A و B عدنان حيث:

$$A = \sqrt{300} - 4\sqrt{27} + 6\sqrt{3} \rightarrow 10\sqrt{3} - 12\sqrt{3} + 6\sqrt{3}$$

$$B = \frac{4 \times 10^5 \times 15 \times 10^{-3}}{80 \times 10^{-1}}$$

1] اكتب العدد A على شكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي.

2] أكتب العدد B كتابة علمية.

التمرين الثاني

وحدة الطول هي: cm.

ABC مثلث قائم في C.

M نقطة من [AB] و E نقطة من [AC]

بحيث $AM = 4$ $BC = 4,5$ $AC = 6$ و $(ME) \parallel (BC)$

1] ارسم الشكل.

2] بين أن $AB = 7,5$.

3] أحسب AE.

4] أحسب $\sin \hat{A}$ ثم استنتج قياس الزاوية $\hat{A}$ بالتدوير إلى الواحدة.



الفرض الرابع



التمرين الأول

بمناسبة عيد الفطر المبارك قامت أم لصنع نوعين من الحلوى: دزيريات وبقلاوة لتوزيعها على دار العجزة حيث: صنعت 105 قطعة دزيريات و 435 قطعة بقلابة، أرادت هذه الأم وضعها في علب.

[1] عيّن أكبر عدد ممكن من العلب التي تحوي أكبر عدد ممكن من كل نوع. اقترحت البنت على أمها مزج النوعين في علبة واحدة تحوي كل علبة على نفس العدد.

[2] ما هو عدد كل نوع في العلبة الواحدة؟

التمرين الثاني

x, y عدنان حقيقيان حيث:

$$x = \sqrt{20} + 2\sqrt{80} - \sqrt{45} \quad y = \frac{\sqrt{5} + 35}{\sqrt{5}} - I$$

[1] بسّط العدد x .

[2] أكتب العدد y على شكل كسر مقامه عدد ناطق.

[3] أحسب T حيث : $T = x - y$.

$$B = \frac{7 \times 10^5 \times 8 \times 10^{-8}}{5 \times 10^{-4}} \quad A = \frac{13}{3} - \frac{4}{3} \times \frac{5}{2} - II$$


[1] أحسب العبارة A ثم أكتب الناتج على أبسط شكل ممكن.

[2] أوجد الكتابة العلمية للعدد B .



التحدي في الفروض والاختبارات

التمرين الثالث



لاحظ الشكل:

① بين أن $(BC) \parallel (EF)$

② بين أن $\frac{EF}{BC} = \frac{1}{3}$

③ أحسب EF علما أن:

$$BC = 3 \text{ cm}$$


التمرين الرابع

ABC مثلث قائم في A حيث: $AB = 4 \text{ cm}$ $AC = 3 \text{ cm}$

① أحسب الطول BC ثم أحسب $\sin \hat{B}$ $\cos \hat{B}$

② أعط الدور إلى الوحدة في الدرجة للقيمة المقربة للزاوية $\hat{B}$.

الوضعية الإدماجية



الشكل المقابل يمثل قطعتين أرض

للأخوين محمد وحمزة.

① أثبت أن $(DE) \parallel (BC)$.

② أحسب: AB, AC, AE.

③ أحسب مساحة ومحيط كل قطعة.

④ قال حمزة لمحمد: مساحة

قطعتك تساوي 16 مرة مساحة

قطعتي ومحيطها يساوي 4 مرات محيط قطعتي.

هل كلام حمزة صحيح؟ علّل.



الاختبار الأول



التمرين الأول

1] إليك العبارتين A و B حيث:

$$A = \frac{2 \times \frac{3}{7}}{\frac{5}{3} - 1}, \quad B = \frac{2 \times 10^{-5} \times 12 \times 10^{-1} \times 10^2}{3 \times 10^{-7}}$$

c أحسب العبارة A.

c أعط الكتابة العلمية للعبارة B.

2] أحسب PGCD للعددين 432 و 264 ثم إختزل الكسر $\frac{264}{432}$

التمرين الثاني

1] أكتب كل من العددين E و F على شكل $a\sqrt{b}$ حيث :

a ، b عددان حقيقيان و b أصغر عدد موجب ممكن

$$E = 5\sqrt{20} + \sqrt{45} \quad ; \quad F = 5\sqrt{20} \times \sqrt{45} \times \sqrt{5}$$

2] أحسب S^2 حيث : $S = 4 - \sqrt{5}$

التمرين الثالث

ABC مثلث قائم في B حيث: $\hat{BAC} = 60^\circ$; $AB = 5 \text{ cm}$

[BD] الارتفاع (hauteur) المتعلق بالضلع [AC].

1] أحسب BC ، BD.

2] أحسب AC.

3] أحسب مساحة المثلث ABC.



التمرين الرابع

وحدة الطول السنتيمتر: (cm)


ABCD مستطيل طوله $(y+5)$ وعرضه 7.

1] عبّر عن مساحة المستطيل بدلالة y .

2] أوجد قيمة y حيث يكون محيط المستطيل ABCD يساوي 32.

مسألة

الشكل المقابل يمثل منحدر خطير يربط بين مدينة البويرة B ومدينة الأخرية C



1] أحسب مسافة الإحذار BC بالتقريب إلى 0,1؟

2] أحسب قياس زاوية الإحذار $\hat{C}$ بالتدوير إلى الوحدة للدرجة.

3] أحسب المدة الزمنية التي تستغرقها سيارة لقطع المسافة CB بسرعة منتظمة قدرها 50km/h.

4] عيّن النقطة D من [CA] حيث $CD = \frac{1}{5}CA$ المستقيم الذي يشمل

D ويوازي (AB) يقطع [BC] في النقطة T.

أ- أحسب الطولين CT و TD.

ب- استنتج قياس الزاوية $\hat{CTD}$.



الاختبار الثاني



التمرين الأول

1] احسب ثم أكتب العدد A على شكل كسر غير قابل للاختزال بحيث:

$$A = \frac{3 - \frac{2}{3}}{\frac{4}{3} + 7}$$

2] أحسب العبارة B بقيمة مقربة بالنقصان إلى 10^{-2} حيث:

$$B = 3\sqrt{2} - 5\sqrt{75} + 7\sqrt{5}$$

3] أحسب العبارة C ثم أعط الكتابة العلمية بحيث:

$$C = \frac{49 \times 10^3 \times 6 \times 10^{-6}}{14 \times 10^{-2}}$$

التمرين الثاني

متوسطة تحتوي على 320 تلميذ و480 تلميذة نريد استعمال كل التلاميذ في تكوين أفواج مختلطة ومتشابهة في التركيبة.

1] ما هو أكبر عدد ممكن لتكوين الأفواج؟

1] ما هو عدد الذكور والإناث في كل فوج؟



التمرين الثالث

ABC مثلث قائم في A بحيث $AB = 9\text{cm}$ و $AC = 6\text{cm}$

1] أحسب الطول BC , $\cos \hat{B}$, $\tan \hat{C}$

D نقطة من [AC] بحيث $AD = \frac{1}{3}AC$

E نقطة من [AB] بحيث $AE = 3\text{cm}$


2] يتبين أن $(DE) \parallel (BC)$.

3] أحسب الطول DE.

المسألة

الجزء الأول

يريد خالد كراء محلا تجاريا، فعرض عليه صاحب الوكالة محلا متكوّنا من غرفة مربعة ABCD وغرفة على شكل مثلث قائم ADE كما هو مبين في الشكل.



1] إذا علمت أن $BC = 4\text{m}$ و $EC = 7\text{m}$

أحسب الطولين ED و AE.

2] أحسب مساحة المحل كله.



الجزء الثاني

نضع $ED = xm$

- 1] بين أن مساحة المثلث EDA هي $2xm^2$.
- 2] من أجل أي قيمة لـ x تكون مساحة المثلث EDA تساوي $13m^2$.
- 3] عبّر بدلالة x عن مساحة المثلث.
- 4] إذا كان ثمن الكراء هو 4500DA للمربع الواحد. ما هو المبلغ الذي سيدفعه خالد.



الاختبار الثالث

التمرين الأول

1] احسب العبارة A على شكل $a \times 10^n$ حيث a و n عددان نسيان.

$$A = 0,7 \times 125 \times 10^{-3}$$

2] احسب العبارة B واعط الكتابة العلمية لها.

$$B = \frac{24 \times 10^{-2} \times 3 \times 10^1}{5 \times 10^4}$$


3] احسب PGCD للعددين 462 و 546 ثم اختزل الكسر $\frac{462}{546}$

التمرين الثاني

$$A = \sqrt{80} ; B = \frac{4\sqrt{35}}{\sqrt{7}} ; C = \frac{2\sqrt{2} \times \sqrt{18}}{(3\sqrt{2})^2} ; D = \frac{\pi}{\frac{3}{2}}$$

بين أن: $A=B$ و $C=D$

التمرين الثالث



وحدة الطول هي السنتيمتر.
إليك الشكل التالي حيث:



التحدي في الفروض والاختبارات

$MA = MB = x$; $MD = MC = 5$; $AD = 6$ و $(BC) // (AD)$

1] احسب قيمة العدد x .

2] استنتج نوع الرباعي $ABCD$.

3] احسب الطول CB .

التمرين الرابع

$\hat{ACB} = 40^\circ$; $AC = 5\text{cm}$ حيث: A مثلث قائم في A

1] أنجز الشكل


2] أحسب الطول AB بتدوير إلى 10^{-1} .

3] ارسم العمود المتعلق بالضلع $[BC]$ فيقطع $[BC]$ في النقطة H .

ح احسب AH بتدوير إلى 10^{-1} .

المسألة

في بيت ريفي يحاول فلاح استغلال الفراغ الموجود تحت السقف بوضع رفوف كما هو مبين في الشكل.



القطعة $[AB]$ تمثل الحائط الطي نلصق فيه الرفوف

التحدي في الفروض والاختبارات

قام صاحب البيت بأخذ القياسات الآتية:

$$AB = 1,80\text{m} ; BC = 2,40\text{m} ; AC = 3\text{m}$$

1] برهن أن المثلث ABC قائم في B.

2] أوجد قياس الزاوية $\hat{ACB}$ بتدوير إلى الوحدة.

3] علما أن المستقيمين (ED) و (CB) متوازيان و $BD = 0,60\text{m}$

ما هو طول الرف [ED].

4] الرف الثاني [GE] وضع بطريقة بحيث: $AF = 0,72\text{m}$

$$\text{و } AG = 1,20\text{m}$$

هل الرف [GF] يوازي السقف أي [BC]؟ علّل.

الاختبار الرابع



التمرين الأول

1] أوجد PGCD (72, 198)

2] احسب A ثم اكتبها على شكل كسر غير قابل للاختزال.

$$A = \frac{233}{72} - \frac{7}{36} \div \frac{2}{5}$$

التمرين الثاني

1] بسط العبارتين A و B بحيث :

$$A = \sqrt{7} \times \sqrt{28} - \sqrt{27} \times \sqrt{3} ; B = 2\sqrt{18} - 5\sqrt{72} + 3\sqrt{50}$$

2] احسب كلا من $\left(\frac{A}{B}\right)^2$; $(A+B)^2$

التمرين الثالث

احسب بعدى حديقة مستطيلة الشكل مساحتها $120m^2$ علما أن

عرضها هو ثلثي طولها (إلى $\frac{1}{100}$ بالنقصان).



التمرين الرابع

$$\cos \hat{A}BC = \cos \hat{B}CA = \frac{1}{2} \quad \text{ABC مثلث زواياه حادة بحيث:}$$

1] ما نوع المثلث ABC مبينا ذلك؟

مسألة

I - ABC مثلث قائم في A بحيث $\hat{A}BC = 30^\circ$, $AB = 6 \text{ cm}$

بين أن $BC = 4\sqrt{3} \text{ cm}$.

II - ارسم الدائرة (C) التي قطرها [AB] تقطع [BC] في D.

1] بين نوع المثلث ADB؟ علل.

2] احسب الطول AD.

3] بين أن $BD = 3\sqrt{3} \text{ cm}$

III - ارسم المستقيم (Δ) العمودي على (BC) في النقطة C يقطع (AB) في E.

1] ما هو وضع المستقيمين (AD) و (EC) علل.

2] احسب الطول EC.

$$\text{ملاحظة: } \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



نماذج الفصل الثاني



الفرض الأول



التمرين الأول

حل المعادلات التالية:

$$7x - (3x + 4) = x + 2$$

$$-3x - 1 = \frac{x+5}{2}$$

التمرين الثاني

$$E = (2x - 3)^2 - (2x - 3)(x - 2)$$

1] انشر و بسط العبارة E.

2] حلل العبارة E إلى جداء عاملين.

3] أحسب E إذا كان $x = 2$

4] حل المعادلة: $(x - 1)(2x - 3) = 0$.

التمرين الثالث

في معلم متعامد ومتجانس $O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ}$

1] علمّ النقط $C(4; 0), B(5; 7), A(-3; 1)$

2] احسب احداثيي الشعاعين $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AC}$ ثم الطولين BC, AC .

3] بيّن أن المثلث ABC قائم في C ومتساوي الساقين.

4] لتكن الدائرة (C) المحيطة بالمثلث ABC، وطول نصف قطرها.

5] صورة D بزاوية B بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CA}$.

ما نوع الرباعي DBCA؟ علّل إجابتك.



الفرض الثاني



التمرين الأول

مستطيل بعدها هما x و y حيث:

$$y = 3\sqrt{2} + 1 \quad x = 3\sqrt{2} - 1$$

[1] بين أن مساحة هذا المستطيل هي عدد طبيعي.

[2] أحسب العبارة A حيث: $A = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

التمرين الثاني

[1] أكتب العبارة K على الشكل $a\sqrt{5}$

حيث: $K = 2\sqrt{500} - 3\sqrt{45}$

[2] انشر و بسط العبارة L حيث:

$$L = (2x - 3)(x - 2) - (x - 3)^2$$

أحسب العبارة L من أجل $x = K$

[3] حل المتراجحة $x^2 - x + 15 < x^2 + 5x$

التمرين الثالث

ABC مثلث، أنشئ النقطتين E و F حيث:

$$\overline{BE} = \overline{BA} + \overline{BC} \quad \text{و} \quad \overline{CF} = \overline{AB}$$

[1] تحقق أن ABCF متوازي الأضلاع.

[2] بين أن النقطتان E و F متناظرتان بالنسبة إلى C.



التمرين الرابع

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس. الوحدة 1cm .

1] عَلمَ النّقط $A(5; 2)$ $B(2; 6)$ $C(-6; 0)$

2] بَيّن أَنَّ المثلث ABC قائم في B.

3] أحسب إحداثيتي D حتى يكون الرّباعي ABCD مستطيل.





الفرض الثالث

التمرين الأول

لتكن A عبارة جبرية حيث:

$$A = (2x - 1)^2 + (2x - 1)(5x + 2)$$



1 أنشر ثم بسط العبارة A.

2 حلّ العبارة A إلى جداء عاملين.

3 حل المعادلة $(2x - 1)(7x + 1) = 0$

التمرين الثاني

إليك الشكلين:



عَيّن قيم x بحيث يكون محيط المثلث أصغر من محيط المستطيل.

التمرين الثالث

المستوي مزود بمعلم متعامد متجانس $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$ حيث وحدة الطول

هي (cm).

1 عَلمّ النقط $C(-4; 0), B(2; -3), A(6; 5)$

2 أحسب الأطوال AB, AC, BC.

3 بيّن أنّ المثلث ABC قائم في B.

4 أحسب مساحة المثلث ABC.



الاختبار الأول



التمرين الأول

A عبارة جبرية حيث $A = (2x - 1)^2 - 49$

- 1 أنشر وبسط العبارة A.
- 2 حلل العبارة A إلى جداء عاملين.
- 3 أحسب A من أجل $x = \sqrt{3}$.
- 4 حل المتراجحة $A \leq 4x^2$ ومثل مجموعة الحلول بيانيا.

التمرين الثاني

أوجد مساحة قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها ثلاث (3) أضعاف عرضها، ومحيطها هو 168 m.

التمرين الثالث

ABC مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي A.

- 1 أنشئ D صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$.
- 2 ما نوع الرباعي ABDC؟ علّل.
- 3 أنشئ النقطة T بحيث $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CT}$.
- 4 ما نوع المثلث ATD؟ علّل.



التمرين الرابع

$(O, \overline{OI}, \overline{OJ})$ معلم متعامد ومتجانس.

1 علم النقط $C(0; 4), B(0; -1), A(2; 0)$.

2 أحسب إحداثيتي الشعاع $\overline{AB}, \overline{BC}$.

3 أحسب الأطوال AB, AC, BC .

4 استنتج أن المثلث ABC قائم.

K مركز الدائرة (C) المحيطة بالمثلث ABC .

5 أحسب إحداثيتي K ثم أحسب نصف قطر الدائرة.

6 هل النقطة $H(2, 3)$ تنتمي إلى الدائرة؟

التمرين الرابع

تعرض مكتبة بئر مراد رايس كتباً للاستعارة (مرة في كل شهر) بطريقتين مختلفتين.

الطريقة الأولى : يدفع القارئ 20DA لكل كتاب مستعار.

الطريقة الثانية : يدفع القارئ إشتراكاً شهرياً قدره 50DA ويدفع 10DA لكل كتاب مستعار.

I- 1 نسمي x عدد الكتب المستعارة.

ليكن $A(x)$ ثمن استعارة الكتب بالطريقة الأولى.

عبر بدلالة x عن $A(x)$.

ليكن $B(x)$ ثمن استعارة الكتب بالطريقة الثانية.

عبر بدلالة x عن $B(x)$.

2 استعار قارئ 4 كتب خلال شهر.

ما هي كلفته حسب كل طريقة؟



التحدي في الفروض والاختبارات

3] باستعمال الطريقة الثانية كانت كلفة القارئ 160DA شهريا

ما هو عدد الكتب التي استعارها؟

II- المستوي المنسوب إلى معلم متعاقد ومتجانس.

1cm على محور الفواصل يمثل كتابا واحدا.

1cm على محور الترتيب يمثل 10DA.

1] مثل بيانيا الدالتين A و B بالمستقيمين (D1) و (D2) على الترتيب

حيث: $(D1): y = 20x$, $(D2): y = 10x + 50$

2] بقراءة بيانية أجب عن السؤال الآتي.

ما هو عدد الكتب المستعارة لكي يتساوى المبلغان المدفوعان

بالطريقتين؟

ما هو هذا المبلغ؟

3] تحقق من ذلك حسابيا.



الاخبار الثاني

التمرين الأول

محيط مستطيل هو 144 وطوله ضعف عرضه.

أحسب طوله وعرضه ثم استنتج مساحته.

التمرين الثاني

لتكن العبارة E حيث : $E = (3x + 1)^2 - x(3x + 1)$

1 أنشر ثم بسط العبارة E.

2 حلّ العبارة E إلى جداء عاملين.

3 حل المعادلة $(3x + 1)(2x + 1) = 0$.

4 إليك المتراجحة $E \leq 6x^2 + x - 2$

حل هذه المتراجحة ثم مثلها بيانيا.

التمرين الثالث

BDS مثلث، I منتصف [SD].

1 ارسم الشكل.

2 أنشئ النقطة H نظيرة B بالنسبة إلى I.

3 أثبت أن $\overline{HD} = \overline{SB}$.

4 أنشئ النقطة R صورة D بالانسحاب الذي شعاعه

أثبت أن النقطة D منتصف [HR].



التمرين الرابع

المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{I}, \vec{J})$ وحدة الطول هي cm.

1] عَلم النقاط $A(1; 2)$, $B(-2; 1)$, $C(-3; -2)$.

2] أحسب الطولين BC و AB ما نوع المثلث ABC.

3] أحسب إحداثيي الشعاع $\overrightarrow{BC}$.

4] أنشء النقطة D صورة A بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BC}$.

5] أثبت أن الرباعي ABCD معين.

الوضعية الادماجية

$(O, \vec{I}, \vec{J})$ معلم متعامد ومتجانس للمستوي الوحدة هي 1cm لدينا

النقط $A(-4; 3)$, $B(3; 2)$, $C(1; -2)$

الجزء الأول

1] علم النقط A, B, C في المعلم $(O, \vec{I}, \vec{J})$.

2] أحسب AB.

علما أن: $AC = \sqrt{50}$ $BC = \sqrt{20}$

• استنتج نوع المثلث ABC.

3] لتكن النقطة H منتصف القطعة [BC]

• تحقق حسابيا أن إحداثيتي H هي (0, 2).

4] ماذا يمثل [AH] بالنسبة للمثلث ABC؟ علّل.

• بين أن $AH = 3\sqrt{5}$.



5] أحسب مساحة المثلث ABC.

الجزء الثاني

أحسب إحداثيتي الشعاع $\overrightarrow{AC}$.

النقطة D هي صورة B بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$.

1] عيّن النقطة D.

2] بين أن إحداثيتي D هي $(-3, 8)$.

3] ما نوع الرباعي ACDB؟ علّل.



الاختبار الثالث



التمرين الأول

A عبارة جبرية حيث:

$$A = (x^2 - 36) - (x - 6)(2x - 1)$$

- 1 أنشر وبسط العبارة A.
- 2 حلّ العبارة A إلى جداء عاملين.
- 3 أحسب A من أجل $x = -1$.
- 4 حل المعادلة: $(x - 6)(-x + 7) = 0$.
- 5 حل المتراجحة $A \leq -x^2 + 26$ ثم مثّل بيانيا مجموعة حلولها.

التمرين الثاني

أربعة أشخاص: عليّ، مصطفى، سمير ورؤوف، مجموع أعمارهم 115 سنة فإذا علمت أنّ:
عمر علي ثلاث مرّات عُمر مصطفى، وعُمر رؤوف ضعف عُمر مصطفى
بينما عُمر سمير يزيد عمره عن عُمر مصطفى بـ 10 سنوات.
ما هو عُمر كل شخص؟

التمرين الثالث

SAMU متوازي الأضلاع.

بن داودي علي

$$S M = M P$$

- 1 أنشء النقطة B بحيث يكون M منتصف [SB] بين أن

التحدي في الفروض والاختبارات

2] بين أن $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SU} = \overrightarrow{MB}$.

3] أنشئ النقطة N صورة M بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{SA}$.

3] بين أن للقطعتين [AM] و [SN] نفس المنتصف.

التمرين الرابع

(O, $\overrightarrow{OI}$, $\overrightarrow{OJ}$) معلم متعامد ومتجانس للمستوي

نقط من هذا المستوي: $A(3;3)$, $B(-2;4)$, $C(-4;-3)$

1] أحسب إحداثيات النقطة D حتى يكون الرباعي ABCD متوازي الأضلاع.

2] أحسب إحداثيات النقطة F مركز تناظره.

المسألة

في محل تجاري «ZOHRA» ثمن القلم: 15DA.

في محل تجاري «DJAMILA» ثمن القلم 10DA مع دفع بطاقة الاشتراك الشهري ثمنها 40DA مهما كان عدد الأرقام.

1] أنقل وأتمم الجدول:

عدد الأقلام المشتراة	2	5	11	14
ZOHRA الثمن المدفوع في محل				
DJAMILA الثمن المدفوع في محل				



التحدي في الفروض والاختبارات

2] نضع x عدد الأقلام المشتراة.

• عبّر عن P_1 الثمن المدفوع لشراء الأقلام من محل ZOHRA بدلالة x .

• عبّر عن P_2 الثمن المدفوع لشراء الأقلام في محل DJAMILA بدلالة x .

3] عيّن الثمن الأحسن لشراء 6 أقلام مع التعليل.

ملك يعقوب 90DA لشراء الأقلام هل الأحسن لشراء الأقلام في محل Zohra أو محل Djamila.

4] ابتداء من أي عدد من الأقلام يصبح الثمن المدفوع عند محل Zohra أقل من أو يساوي الثمن المدفوع عند محل Djamila.



نماذج الفصل الثالث





الفرض الأول

التمرين الأول

- 1 انشر ثم بسط العبارة : $(2 + 3\sqrt{3})^2$
- 2 استنتج حل المعادلة : $x^2 - 31 = 12\sqrt{3}$ (مع كتابة الحل على الشكل : $(a + b\sqrt{c})$)

التمرين الثاني

f و g دالتان بحيث : $f(x) = ax$; $g(x) = 2x - 2$

1 عَيِّن الدالة f حيث : $f(-2) = -6$

2 أحسب $g\left(\frac{1}{2}\right)$; $f(3)$

3 عَيِّن x_1 بحيث : $g(x_1) = -4$

التمرين الثالث

1 أكتب $\frac{x}{y}$ على أبسط شكل ممكن حيث : $\frac{x}{y} = \frac{\sqrt{8}}{3\sqrt{2}}$

2 أحسب x, y إذا علمت أن : $x = 2 + y$



التمرين الرابع

في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 علم النقط $A(4; 4)$ ، $B(4; -1)$ ، $C(2; 3)$.

2 أحسب الأطوال AB ، BC ، AC ثم بين طبيعة المثلث ABC .

3 أحسب إحداثيين K مركز الدائرة (c) المحيطة بالمثلث ABC .

C ما هو طول نصف قطرها؟

4 أنشئ النقطة D صورة A بالدوران الذي مركزه C وزاويته 90° واتجاهه موجب.

المسألة

قرر أحمد مطالعة الكتب، فتقدم إلى مكتبة المركز الثقافي المتواجد ببلديته، فعرض عليه المسؤول عن المكتبة اقتراحين لاستعارة الكتب.

الاقتراح الأول: مبلغ استعارة الكتاب الواحد هو $15DA$.

الاقتراح الثاني: مبلغ استعارة الكتاب الواحد هو $10DA$ مع دفع مبلغ اشتراك شهري للمكتبة قدره $40DA$.

1 أنقل ثم أتمم الجدول الآتي:

عدد الكتب المستعارة خلال شهر	2	5	
سعر الكتب بالاقتراح الأول بـ DA		75	
سعر الكتب بالاقتراح الثاني بـ DA		90	150

2 نرمز إلى عدد الكتب المستعارة بالرمز x .

نرمز بالرمز f إلى مبلغ الكتب المستعارة بالاقتراح

نرمز بالرمز g إلى مبلغ الكتب المستعارة بالاقتراح الثاني

التحدي في الفروض والاختبارات

(أ) أكتب بدلالة x كل من $f(x)$ ، $g(x)$.

(ب) حل المعادلة: $f(x) = g(x)$ ، مع إعطاء تفسير لحل هذه المعادلة.

(ج) حل المتراجحة: $15x \geq 10x + 40$.

[3] مثل بيانيا كل من الدالتين f ، g في مستوى مزود بمعلم متعامد

ومتجانس $(O, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OI})$.

حيث: $g(x) = 10x + 40$; $f(x) = 15x$

نضع 1cm على محور الفواصل يمثل كتاب واحد (1 كتاب).

نضع 1cm على محور الترتيب يمثل 10DA.

[4] من التمثيل البياني أجب عن هذين السؤالين:

(أ) ما هو الاقتراح الأفضل لأحمد عند استعارته 6 كتب؟

(ب) عند أحمد 80DA، ساعده على اختيار الاقتراح الأفضل له

لاستعارة أكبر عدد من الكتب.





الفرض الثاني

التمرين الأول

1 C عدد حيث $C = \sqrt{2} \times \sqrt{98} - \frac{3\sqrt{12}}{\sqrt{27}}$

بين أن C عدد طبيعي.

2 f عبارة جبرية حيث x عدد حقيقي

و $f(x) = 4x^2 - 9 - (2x + 3)(3x - 4)$

أ) بين أن $f(x) = (2x + 3)(1 - x)$

ب) حل المعادلة $f(x) = 0$

التمرين الثاني

13 - 10 - 14 - 8 - 6 - 10 - 13 - 13 - 14 - 6 - 8 - 13 - 14 - 10
10 - 6 - 13 - 14 - 8 - 13 - 17 - 8 - 13 - 10 - 14 - 10 - 8 -

تمثل هذه السلسلة نقاط امتحان لتلاميذ قسم الرابعة متوسط في مادة الرياضيات.

1 رتب تصاعديا هذه السلسلة.

2 ما هو عدد تلاميذ هذا القسم؟

3 ما هي العلامة الوسيطة لهذا القسم؟

4 أوجد مدى هذه السلسلة.

5 أحسب معدل القسم في هذا الامتحان مع التدوير إلى العشرة

6 أحسب النسبة المئوية للتلاميذ الذين علاماتهم أكبر من أو تساوي


10 مع التدوير إلى 10^{-1} .



التحدي في الفروض والاختبارات

التمرين الثالث

مخروط دوراني طول مولده [SA] هو 10cm ونصف قطر قاعدته 6cm. كما هو موضح في الشكل.



① أحسب طول ارتفاعه [SO].

② أحسب V_1 حجم هذا المخروط.

③ نقطع المخروط بمستوىوازي

قاعدته ويمرّ من منتصف ارتفاعه [SO].

(أ) ما هو معامل التصغير.

(ب) استنتج V_2 المخروط المصغر.

المسألة

I- شركة الرحلات ما بين المدن تقترح تسعيرتين للرحلات ما بين البليدة والجزائر.

التسعيرة الأولى: 50DA لكل رحلة.

التسعيرة الثانية: 25DA لكل رحلة مع شراء بطاقة شهرية بـ 300DA.

① نرمز لعدد الرحلات بالرمز x . عبّر بدلالة x عن المبلغ المدفوع بـ:

التسعيرة الأولى. التسعيرة الثانية.

② طالب جامعي يملك 1200DA.

ما هي عدد الرحلات الممكنة بالتسعيرة الأولى.

③ بيّن اعتمادا على الرسم أي التسعيرتين أفضل الأولى أو الثانية (مع التعليل).

III- إذا علمت أن 50DA يمثل إلا 65% من السعر الأصلي لكل

① ما هو السعر الأصلي لهذه الرحلة؟

② ما هو السعر الجديد لهذه الرحلة إذا خفضناه بـ 50%؟





الفرض الثالث

التمرين الأول

1 حل المتراجحة: $7x - 3 \geq 4x + 12$

2 ما هي قيم x الطبيعية التي ليست حلول لهذه المتراجحة؟

التمرين الثاني

لتكن العبارة الجبرية A حيث: $A = (3x - 2)^2 - (x - 1)(12x - 8)$

1 انشر وبسط العبارة الجبرية A .

2 حلّ العبارة الجبرية A إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

3 حل المعادلة: $A = 0$.

التمرين الثالث

على سطح كتاب للهندسة رسمت أشكال هندسية مألوفة (مثلثات ومستطيلات) وليس لها رؤوس مشتركة.

1 إذا كان عدد الأشكال هو 10 (4 مثلثات و 6 مستطيلات) أعط عدد رؤوس هذه الأشكال.

1 وإذا كان عدد الأشكال هو 18 وحسبنا عدد الرؤوس وجدنا 65 رؤساء، أوجد عدد المثلثات وعدد المستطيلات الموجودة على سطح هذا الكتاب.



التحدي في الفروض والاختبارات

التمرين الرابع

وحدة الطول هي (cm).

ABC مثلث حيث: $AB = 9$ ، $AC = 15$ ، M نقطة من [AC] حيث: $AM = 10$.

المستقيم الذي يشمل M ويوازي (BC) يقطع (AB) في النقطة N.


1] أحسب النسبة $\frac{AN}{AB}$.

2] أحسب الطولين: AN ، BN.

المسألة

تريد مصلحة المياه إيصال الماء من منبع موجود على ارتفاع 800m من سطح البحر، عبر أنابيب إلى القرية التي تعلو عن سطح البحر بـ 920m.

I- تُرى القرية من المنبع بزاوية 12° ، كما هو مبين في المخطط التالي:



مستوى سطح البحر

1] ما هو ارتفاع القرية بالنسبة إلى المنبع؟

2] أحسب المسافة بين القرية والمنبع.

3] علما أن طول الأنبوب الواحد هو 6m، أوجد عدد الأنابيب اللازمة لعملية؟ (أعط القيمة المقربة إلى الوحدة بالزيادة).

التحدي في الفروض والاختبارات

I- أعلنت هذه المصلحة مناقصة محلية، بعد فتح الأظرفة اختارت عرضين.

عرض المقاول فريد: تدفع المصلحة على كل أنبوب مركب مبلغ 3000DA على أن يقوم بجميع الأشغال.

عرض المقاول أحمد، أن تتكفل المصلحة بتكاليف الحفر والمقدرة بـ 50000DA وتدفع له مبلغ 2000DA على كل أنبوب مركب.

ليكن x عدد الأنابيب المركبة و $F(x)$ المبلغ الذي تدفعه المصلحة للمقاول فريد، $G(x)$ المبلغ الذي تدفعه المصلحة للمقاول أحمد.

1] أكتب كل من $F(x)$ و $G(x)$ بدلالة x .

2] أكمل الجدول التالي:

X ب (m)	20	30	
$F(x)$ ب (DA)	60000		
$G(x)$ ب (DA)		110000	210000

3] مثل بيانيا الدالتين F و G مستخدما السلم التالي:

كل 10 أنابيب تمثل بـ 1cm على محور الفواصل.

كل 20000DA تمثل بـ 1cm على محور الترتيب.

4] ما هو المقاول الذي سوف يفوز بالمناقصة؟ برّر جوابك باستخدام

البيان.



الاختبار الأول



التمرين الأول

يمثل مخطط الأعمدة الآتي توزيع نقاط فرض في مادة الرياضيات لقسم من أقسام السنة الرابعة متوسط.


1 أحسب عدد تلاميذ هذا القسم؟

2 أحسب الوسط المتوازن لهذا الفرض.

3 ما هي العلامة الوسيطة؟

4 ما هو مدى سلسلة هذه العلامات.

التكرارات



العلامات

التمرين الثاني

1 أنشر وبسط الجداء: $(3x+1)(x-2)$.

2 حلل العبارة: $A = (3x^2 - 5x - 2) + 5(x - 2)$. إلى جداء

3 حل المعادلة: $A = 0$.

4 حل المتراجحة: $A > 3x^2 - x$.



التمرين الثالث

في المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OI})$

1 علمّ النقط $A(1; -3)$ ، $B(7; 5)$ ، $C(-3; 0)$.


2 أحسب الأطوال: AB ، BC ، AC ثم بيّن أن المثلث ABC قائم.

3 عيّن إحداثيتي النقطة M مركز الدائرة (C) المحيطة بالمثلث ABC .

4 عيّن إحداثيتي D صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$.

التمرين الرابع

مخروط دوراني نصف قطر قاعدته 3cm وارتفاعه 6cm .



1 أحسب V حجم هذا الهرم.

2 نقطع هذا المخروط بمستوي مواز

لقاعدته كما في الشكل.

أحسب معامل التصغير k .

أحسب حجم المخروط الدوراني الذي

نصف قطر قاعدته MR .

المسألة


I- تقيم مؤسسة تربوية في نهاية كل سنة دراسية حفلا تكرم فيه تلاميذها

النجباء وذلك في قاعة أرضيتها على شكل مستطيل طولها ضعف عرضها

ومحيطها 36m .

1 أحسب a طول هذه القاعدة

و b عرضها.



التحدي في الفروض والاختبارات

1] أحسب حجم هذه القاعة إذا علمت أن ارتفاعها $c = 4m$ وأن سقفها هو عبارة عن نصف اسطوانة طول قطرها $6m$ وطولها $12m$ كما مبين في الشكل المقابل.

II- لشراء أحد أنواع المشروبات الغازية لتوزيعه على التلاميذ النجباء وجد المسؤول عند الشراء محلين للبيع.

الأول: يبيع القارورة الواحدة من هذا المشروب بـ $16DA$ أما خدمة النقل فهي مجانية.

الثاني: يبيع القارورة الواحدة من هذا المشروب بـ $14DA$ لكن يجب تسديد خدمة نقل المشروبات وهي $100DA$.

نسمي x عدد القارورات المشتراة من طرف المؤسسة و $f(x)$ الثمن المدفوع من طرف مسؤول المؤسسة للمحل الأول و $g(x)$ الثمن المدفوع من طرف مسؤول المؤسسة للمحل الثاني.

x عدد القارورات	10		
$F(x)$ بـ (DA)		880	
$G(x)$ بـ (DA)			450

1] عبر عن كل من $f(x)$ ، $g(x)$ بدلالة x .

2] أكمل الجدول المقابل.

3] حل المعادلة $f(x) = g(x)$ كيف تفسر النتيجة.



4 في المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OI})$.

الوحدة على محور الفواصل: 1cm يمثل 10 قارورات.

الوحدة على محور الترتيب: 1cm يمثل 100DA.

ليكن المستقيم (Δ) الذي معادلته: $y = 16x$ والمستقيم (d) الذي معادلته

$$y = 14x + 100$$

(أ) أنشئ المستقيمين (Δ) ، (d) .

(ب) اعتمادا على التمثيل البياني كم يشتري مسؤول المؤسسة من قارورة

على الأكثر إذا كان لديه 1150DA.

(ج) حل المتراجحة: $14x + 100 > 16x$.





الاختبار الثاني

التمرين الأول

1] أوجد PGCD (462, 546) ثم أوجد كسر غير قابل للاختزال للكسر

$$\frac{462}{546}$$

2] أعط الكتابة العلمية للعدد B حيث:

$$B = \frac{35 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^5}{21 \times 10^{-1}}$$

3] أكتب c على شكل $a\sqrt{b}$ حيث a عدد صحيح و b عدد طبيعي.

$$c = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{80} + \sqrt{20}$$

التمرين الثاني

سعر ثلاثة مداور ومنقلة هو 88 DA، سعر خمسة مداور وثلاثة منقلات هو 164 DA.

1] أحسب سعر المدور وسعر المنقلة.

التمرين الثالث

إليك السلسلة الإحصائية التالية التي تمثل علامات 20 تلميذ.

$$13 - 12 - 8 - 10 - 15 - 12 - 8 - 10 - 7 - 12 - 13 - 12 - 8 - 8 - 12 - 10 - 8 - 7 - 13 - 8 -$$

نظم هذه المعطيات في جدول.

1] أوجد التكرار المجمع المتزايد.



التحدي في الفروض والاختبارات

2 ما هو مدى هذه السلسلة الإحصائية.

3 أحسب الوسط الحسابي المتوازن والوسيط لهذه السلسلة الإحصائية.

التمرين الرابع

$(O, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OI})$ معلم متعامد ومتجانس.

1 علّم النقاط $A(4; 3)$, $B(-2; 1)$, $C(-1; -2)$.

2 أحسب الأطوال AB , BC , AC .

3 بين أن المثلث ABC قائم.

عين النقطة D صورة C بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BA}$.

4 ما نوع الرباعي $ABCD$ ؟ علّل.

المسألة

الجزء الأول

يقترح صاحب قاعة مسرحية على زبائنه خيارين:

الخيار الأول: يسدّد الزّبون 400 DA لمشاهدة مسرحية واحدة.

الخيار الثاني: يسدّد الزّبون إشتراك سنويا قيمته 2500 DA عندئذ

يسمح له بتسديد 150 DA لمشاهدة مسرحية واحدة.

1 ما هو الخيار الأفضل عند مشاهدة 12 مسرحية؟ علّل.

2 ما هو الخيار الأفضل عند مشاهدة 5 مسرحيات؟ علّل.

نسمي x عدد المسرحيات التي يشاهدها الزّبون خلال

و y_1 المبلغ السنوي المدفوع بالخيار الأول.

y_2 المبلغ السنوي المدفوع بالخيار الثاني.



3] عبر بدلالة x عن y_1 و y_2 .

الجزء الثاني

ليكن (d) التمثيل البياني للدالة f حيث: $f(x) = 400x$.

4] (d') التمثيل البياني للدالة g حيث: $g(x) = 150x + 2500$.

على معلم متعامد ومتجانس $(O, \overline{OJ}, \overline{OI})$ مثل (d) و (d') نأخذ

1 مسرحية $\rightarrow 1\text{cm}$ على محور الفواصل.

و $200\text{DA} \rightarrow 1\text{cm}$ على محور الترتيب.

5] أوجد بيانيا عدد المسرحيات التي من أجلها يكون الخيار الأول يساوي

الخيار الثاني.

• حل المتراجحة $400x < 150x + 2500$.

• ماذا تفسر هذه الحالة؟



الاختبار الثالث

التمرين الأول

نعتبر العدد: $A = \sqrt{500} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{20}$.

1] بين أن A يكتب على الشكل $a\sqrt{b}$ حيث a عدد صحيح نسبي.

2] أحسب العددين الآتين مع إعطاء الناتج على أبسط شكل ممكن:

$$C = \left(\frac{4}{15} - 1\right) : \frac{7}{30}, \quad B = -\frac{1}{8} \times \frac{3}{2} \times \left(-\frac{4}{15}\right)$$

التمرين الثاني

تعطى العبارة $A = (2x + 3)^2 - (2x + 3)(x - 7)$.

1] حلل العبارة A إلى جداء عاملين.

2] انشر ثم بسط العبارة A.

3] حل المعادلة: $(2x + 3)(x + 10) = 0$

التمرين الثالث

في مسابقة رمي الجلة سجل أستاذ الرياضة النتائج التي تحصل عليها تلاميذ قسمه في جدول فئات الآتي:

الطول p (m)	$5 \leq p < 7$	$7 \leq p < 9$	$9 \leq p < 11$	$11 \leq p < 13$
التكرار	6	10	9	5
مركز الفئات				

1] أتمم الجدول.

2] أحسب متوسط طول الرمية في القسم.

3] مثل التكرارات بمخطط أعمدة.



التمرين الرابع

- 1] في معلم متعامد ومتجانس علم النقط $A(-3; -2), B(3; -4), C(6; 5)$
- 2] أحسب الأطوال: CA, BC, AB .
- 3] ما نوع المثلث ABC ؟ علّل؟
- 4] أحسب إحداثيا النقطة M مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC .

الوضعية الإدماجية

تعرض حديقة الحيوانات والتسليّة لابن عكنون تسعرتين للدخول:
التسعيرة الأولى: $DA = 50$ للفرد العادي.

التسعيرة الثانية: $DA = 20$ للفرد المنظم في بعثة مع دفع مبلغ جزائي
يقدر بـ: $DA = 300$.

1] أحسب ثمن دخول 25 تلميذ و 50 تلميذ بالتسعيرة الأولى ثم بالتسعيرة الثانية.

2] إذا كان x هو عدد التلاميذ و $p_1(x)$ هو الثمن المدفوع بالتسعيرة الأولى
و $p_2(x)$ هو الثمن المدفوع بالتسعيرة الثانية.

ما هي صيغة $p_1(x)$ و $p_2(x)$ بدلالة x ؟
3] ما هو أكبر عدد ممكن من التلاميذ يمكن أن يدخل الحديقة عندما ندفع
 $DA = 1500$ في التسعيرتين.

4] ارسم المستقيمين (D_1) و (D_2) في معلم متعامد ومتجانس
 $(O, \overrightarrow{OJ}, \overrightarrow{OI})$ اللذان يمثلان الدالتين:


$$(D_1) : p_1(x) = 50x \quad \text{و} \quad (D_2) : p_2(x) = 20x + 300$$

بقراءة بسيطة للبيان المرسوم أجب عن الأسئلة الآتية:

أ) من أجل أي عدد تلاميذ تكون التسعيرتين p_1 و p_2 متساويتين؟

ب) ما هو الشرط الكافي حتى تكون التسعيرة الثانية أفضل؟





قسم الأجوية



نام الطالب

حلول نماذج الفصل الأول



الفرض الأول

التمرين الأول

حل المعادلات :

$$\diamond \frac{5+x}{3} - \frac{2x-1}{4} = \frac{x}{4} + 1$$

$$\frac{5}{3} + \frac{x}{3} - \frac{2x}{4} + \frac{1}{4} = \frac{x}{4} + 1$$

$$\frac{20}{12} + \frac{4x}{12} - \frac{6x}{12} + \frac{3}{12} = \frac{3x}{12} + \frac{12}{12}$$

$$20 + 4x - 6x + 3 = 3x + 12$$

$$4x - 6x - 3x = 12 - 20 - 3$$

$$-5x = -1$$

$$x = \frac{-11}{-5}$$

$$x = \frac{11}{5}$$

للمعادلة حل واحد : $\frac{11}{5}$

$$\diamond 2(x-7) = -2(4-x)$$

$$2x - 14 = -8 + 2x$$

$$2x = -8 + 14$$

المعادلة ليس لها حل

بن داودي حلي

$$\diamond x^2 - 13 = 12$$

$$x^2 = 12 + 13$$

$$x^2 = 25$$

$$x = \sqrt{25} \quad \text{أو} \quad x = -\sqrt{25}$$

$$x = 5$$

$$x = -5$$

للمعادلة حلان: 5 ، -5

التمرين الثاني

1 نشر وتبسيط العبارة A:

$$A = (4x + 2)(x - 2)$$

$$A = 4x^2 - 8x + 2x - 4$$

$$A = 4x^2 - 6x - 4$$

2 تحليل العبارة B:

$$B = (3x - 1)^2 - (2x + 1)^2$$

$$B = [(3x - 1) - (2x + 1)][(3x - 1) + (2x + 1)]$$

$$B = [3x - 1 - 2x - 1][3x - 1 + 2x + 1]$$

$$B = (x - 2)(5x)$$

3 تحليل العبارة C:

$$C = B - (4x^2 - 6x - 4)$$

$$C = (x - 2)(5x) - (4x^2 - 6x - 4)$$

$$C = (x - 2)(5x) - (4x + 2)(x - 2)$$

$$C = (x - 2)[(5x) - (4x + 2)]$$

$$C = (x - 2)[5x - 4x - 2]$$

$$C = (x - 2)(x - 2)$$

$$C = (x - 2)^2$$



4 حل المعادلة $C = 0$:

$$x - 2 = 0$$

$$x = 2$$

المعادلة لها حل 2

التمرين الثالث

حساب المساحة الكلية:

$$S = \frac{(x+3x) \times 3}{2}$$

$$S = \frac{3x+9x}{2}$$

$$S = \frac{12x}{2}$$

$$S = 6x$$

حساب مساحة المثلث: EBC

$$S_1 = \frac{3 \times x}{2}$$

$$S_1 = \frac{3x}{2}$$

حساب مساحة الجزء الغير المظلل:

$$S - S_1$$


$$S_2 = 6x - \frac{3x}{2}$$

$$S_2 = \frac{12x}{2} - \frac{3x}{2}$$

$$S_2 = \frac{9x}{2}$$



حساب المساحة غير مظلة: $x = 4$



EBCF متوازي أضلاع:

لأن $\vec{CF} = \vec{BE}$; $\vec{BF} = \vec{BE} + \vec{BC}$ (قطر متوازي أضلاع).
و $BC = BE$ ضلعان متتاليان في متوازي الأضلاع إذن هو معين.

$$\vec{BC} + \vec{FE} = \vec{0}$$

$$\vec{DE} + \vec{AB} = \vec{DE} + \vec{EC} = \vec{DC} \left(\vec{AB} = \vec{EC} \right)$$

$$\vec{AD} - \vec{ED} = \vec{AD} + \vec{DE} = \vec{AE}$$

الفرض الثاني



التمرين الأول

$$520x = 169y$$

حساب الكسبر $\frac{x}{y}$

$$\frac{x}{y} = \frac{169}{520}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{169 \div 13}{520 \div 13} = \frac{13}{40}$$

$$PGCD(520, 169) = 13$$

$$520 = 169 \times 3 + 13$$

$$169 = 13 \times 13 + 0$$

التمرين الثاني

باقي القسمة الاقليدية 87 على x هو 7.

باقي القسمة الاقليدية 68 على x هو 4.

$$68 = x \times a + 4$$

$$68 - 4 = x \times a$$

$$64 = x \times a$$

$$87 = x \times b + 7$$

$$87 - 7 = x \times b$$

$$80 = x \times b$$



$$PGCD(64, 80) = 16$$

$$80 = 64 \times 1 + 16$$

$$64 = 16 \times 4 + 0$$

$$x = 16$$

$$68 = 16 \times 4 + 4$$

$$87 = 16 \times 5 + 7$$



التمرين الثالث

$$x^2 = 15$$

$$x = \sqrt{15} \text{ أو } x = -\sqrt{15}$$

$$x^2 + 25 = 0$$

$$x^2 = 0 - 25$$

$$x^2 = -25$$

المعادلة ليس لها حل.

$$2x^2 - 18 = 0$$

$$2x^2 = 0 + 18$$

$$2x^2 = 18$$


$$x^2 = \frac{18}{2}$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \sqrt{9} \text{ أو } x = -\sqrt{9}$$

$$x = 3 \text{ أو } x = -3$$





حساب BC:

$$\left. \begin{aligned} \cos \hat{B} &= \frac{AB}{BC} = \frac{4}{BC} \\ \cos \hat{B} &= \cos 60^\circ = 0,5 \end{aligned} \right\} \frac{4}{BC} = 0,5$$

$$BC = \frac{4}{0,5} = 8 \text{ cm}$$

حساب AC:

نطبق نظرية فيثاغورث

$$BC^2 = AC^2 + AB^2$$

$$8^2 = 4^2 + AC^2$$

$$64 = 16 + AC^2$$

$$AC^2 = 64 - 16$$

$$AC = \sqrt{48} = 6,92 \text{ cm}$$

حساب EC:

$$EC = BC - BE$$

$$EC = 4$$

$$BE = 4 \text{ cm}$$

حساب EK و CK :

بما أن: $(AB) \parallel (EK)$ (مستقيمان عموديان على نفس المستقيم).
فإن:

$$\frac{CK}{AC} = \frac{CE}{CB} = \frac{EK}{AB}$$

$$\frac{CK}{6,92} = \frac{4}{8}$$

$$CK = \frac{6,92 \times 4}{8} = 3,46$$

$$CK = 3,46 \text{ cm}$$

$$\frac{EK}{4} = \frac{4}{8}$$

$$EK = \frac{4 \times 4}{8} = 2$$

$$EK = 2 \text{ cm}$$



الفرض الثالث

التمرين الأول

كتابة العدد A على شكل $a\sqrt{3}$ حيث a عدد طبيعي:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{300} - 4\sqrt{27} + 6\sqrt{3} \\ &= \sqrt{100} \times \sqrt{3} - 4\sqrt{9} \times \sqrt{3} + 6\sqrt{3} \\ &= 10\sqrt{3} - 4 \times 3\sqrt{3} + 6\sqrt{3} \\ &= 10\sqrt{3} - 12\sqrt{3} + 6\sqrt{3} \\ &= (10 - 12 + 6)\sqrt{3} \\ A &= 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

كتابة العدد B كتابة علمية:

$$\begin{aligned} B &= \frac{4 \times 10^5 \times 15 \times 10^{-3}}{80 \times 10^{-1}} \\ &= \frac{4 \times 15}{80} \times \frac{10^5 \times 10^{-3}}{10^{-1}} \\ &= 0,75 \times 10^3 \\ &= 7,5 \times 10^{-1} \times 10^3 \\ B &= 7,5 \times 10^2 \end{aligned}$$

التمرين الثاني

رسم الشكل:



نبين أن : $AB = 7,5\text{cm}$

في المثلث القائم ABC

بتطبيق نظرية فيثاغورث:

التحدي في الفروض والاختبارات

$$\begin{aligned} AB^2 &= AC^2 + BC^2 \\ &= 6^2 + 4,5^2 \\ &= 36 + 20,25 \end{aligned}$$

$$AB^2 = 56,25$$

$$AB = \sqrt{56,25}$$

$$AB = 7,5 \text{ cm}$$

حساب AE:

في المثلث ABC لدينا: E نقطة من [AC] ، M نقطة من [AB] و (EM) // (BC)

حسب نظرية طاليس:

$$\frac{AE}{AC} = \frac{AM}{AB} = \frac{EM}{BC}$$

$$\frac{AE}{6} = \frac{4}{7,5}$$

$$AE = \frac{4 \times 6}{7,5} = \frac{24}{7,5}$$

$$AE = 3,2 \text{ cm}$$

حساب $\sin \hat{A}$ ثم استنتاج قياس الزاوية $\hat{A}$ بالتدوير إلى وحدة:

$$\sin \hat{A} = \frac{BC}{AB}$$

$$= \frac{4,5}{7,5}$$



الفرض الرابع



التمرين الأول

1] تعيين أكبر عدد ممكن من العلب:

$$\text{PGCD}(435+105) =$$

$$435 = 105 \times 4 + 15$$

$$105 = 15 \times 7 + 0$$

$$\text{PGCD}(435, 105) = 15$$

2] عدد نوع الحلوى من الدزيريات هو: $105:15 = 7$

عدد الحلوى من نوع البقلاوة هو: $435:15 = 29$

التمرين الثاني

I- 1] تبسيط العدد x:

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{20} + 2\sqrt{80} - \sqrt{45} \\ &= \sqrt{4} \times \sqrt{5} + 2\sqrt{16} \times \sqrt{5} - \sqrt{9} \times \sqrt{5} \\ &= 2\sqrt{5} + 2 \times 4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} \\ &= 2\sqrt{5} + 8\sqrt{5} - 3\sqrt{5} \\ &= (2+8-3)\sqrt{5} \\ x &= 7\sqrt{5} \end{aligned}$$

2] كتابة العدد y على شكل كسر مقامه عدد ناطق:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{5}+35}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} &= \frac{\sqrt{5}(\sqrt{5}+35)}{5} \\ &= \frac{5(1+7\sqrt{5})}{5} = \frac{1+7\sqrt{5}}{1} \end{aligned}$$



3 حساب المجموع T بحيث:

$$\begin{aligned} T &= 7\sqrt{5} - (1 + 7\sqrt{5}) \\ &= 7\sqrt{5} - 1 - 7\sqrt{5} \\ &= -1 \\ T &= -1 \end{aligned}$$

II - حساب العبارة A:

$$\begin{aligned} A &= \frac{13}{3} - \frac{4}{3} \times \frac{5}{2} \\ &= \frac{13}{3} - \frac{20}{6} = \frac{26 - 20}{6} \\ A &= \frac{6}{6} = 1 \end{aligned}$$

الكتابة العلمية لـ B:

$$\begin{aligned} B &= \frac{7 \times 10^5 \times 8 \times 10^{-8}}{5 \times 10^{-4}} \\ &= \frac{7 \times 8}{5} \times 10^{5-8+4} \\ &= 11,2 \times 10^1 \\ &= 1,12 \times 10^1 \times 10^1 \\ B &= 1,12 \times 10^2 \end{aligned}$$

التمرين الثالث

1 بين أن (BC) // (EF)

منه: $(EF) \perp (AB)$

و $(BC) \perp (AB)$

ومنه: (BC) // (EF)



$$\boxed{2} \text{ نبين أن: } \frac{EF}{BC} = \frac{1}{3}$$

في المثلث ABC:

لدينا F نقطة من [AC] و E نقطة من [AB] و (EF) // (BC)

بتطبيق نظرية طاليس:

$$\frac{AE}{AB} = \frac{EF}{BC} = \frac{AF}{AC}$$

$$\frac{1,5}{4,5} = \frac{EF}{BC}, \quad \frac{15}{45} = \frac{EF}{BC}$$

$$\frac{EF}{BC} = \frac{1}{3} \text{ منه:}$$

$$\boxed{3} \text{ حساب EF علما أن: } BC = 3\text{cm}$$

$$\text{نعلم أن: } \frac{EF}{3} = \frac{1}{3} \text{ منه: } EF = 1$$

التمرين الرابع

$$\boxed{1} \text{ حساب الطول BC:}$$

بتطبيق نظرية فيثاغورس:

$$CB^2 = AC^2 + AB^2 = 3^2 + 4^2$$

$$CB^2 = 16 + 9$$

$$CB^2 = 25$$

$$CB = \sqrt{25}$$

$$CB = 5\text{m}$$



حساب $\hat{\sin B}$:

$$\hat{\sin B} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$\hat{\cos B} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$\hat{ABC} = \cos^{-1} 0,8$$

$$\hat{ABC} = 37^\circ$$

[2]

الوضعية الإدماجية

[1] إثبات أن $(DE) // (BC)$

$$(BC) // (DE) \quad \text{ومنه:} \quad \begin{cases} (BC) \perp (CD) \\ (DE) \perp (CD) \end{cases} \quad \text{لدينا:}$$

حساب AE :

بتطبيق نظرية فيثاغورس على المثلث القائم ADE:

$$AE^2 = AD^2 + DE^2$$

$$= 300^2 + 400^2$$

$$AE^2 = 250\,000$$

$$AE = \sqrt{250\,000}$$

$$AE = 500m$$

حساب AC :

لدينا A.C.D استقامية و B.A.E استنقامية

حيث : $(BC) // (DE)$



حسب نظرية طاليس:

$$\frac{AC}{AD} = \frac{AB}{AE} = \frac{BC}{DE}$$

منه: $(BC) \parallel (EF)$ و $[AB]$ و $[AC]$ تقاطعا في نقطة من F نقطة من (AC) و $[AB]$ و $[BC]$ تقاطعا في نقطة من (BC)

$$\frac{AC}{AD} = \frac{BC}{DE} \quad , \quad \frac{100}{400} = \frac{AC}{300} \quad , \quad AC = \frac{300 \times 100}{400}$$

حساب AB:

بتطبيق نظرية فيثاغورس على المثلث القائم ABC :

$$AB^2 = BC^2 + AC^2$$

$$= 100^2 + 75^2$$

$$AB^2 = 15\,625$$

$$AB = \sqrt{15\,625}$$

$$AB = 125\text{m}$$

3 حساب مساحة القطعة (1) «حزمة»:

$$S_1 = \frac{B \times H}{2}$$

$$= \frac{100 \times 75}{2}$$


$$S_1 = 3750\text{m}^2$$

حساب محيطها:

$$P_1 = BC + AB + AC$$

$$= 100 + 125 + 75$$

$$P_1 = 300\text{m}$$



حساب مساحة القطعة (2) «محمد»:

$$S_1 = \frac{300 \times 400}{2}$$

$$S_2 = 60\,000 m^2$$

حساب محيطها:

$$P_2 = AD + AE + DE$$

$$= 300 + 500 + 400$$

$$P_2 = 1200 m$$

4 نعم، كلام حمزة صحيح، حيث:

$$S_2 = 16 \times (S_1)$$

$$60\,000 m^2 = 16 \times 3750$$

نستنتج أن: $60\,000 m^2 = 60\,000 m^2$

و:

$$S_2 = 4 \times P_1$$

$$1200 = 4 \times 300$$

نستنتج أن: $1200 m^2 = 1200 m^2$



الاختبار الأول



التمرين الأول

[1]

$$A = \frac{2 \times \frac{3}{7}}{\frac{5}{3} - 1} = \frac{\frac{6}{7}}{\frac{2}{3}} =$$

$$= \frac{6}{7} \times \frac{3}{2} ; A = \frac{9}{7}$$

$$B = \frac{2 \times 10^{-5} \times 12 \times 10^{-1} \times 10^2}{3 \times 10^{-7}} = \frac{2 \times 12}{3} \times \frac{10^{-4}}{10^{-7}}$$

$$B = 8 \times 10^{-4-(-7)} ; B = 8 \times 10^3$$

PGCD(264,432) [2]

$$432 = 264 \times 1 + 168$$

$$264 = 168 \times 1 + 96$$

$$168 = 96 \times 1 + 72 \quad PGCD(264,432) = 24$$

$$96 = 72 \times 1 + 24$$

$$72 = 24 \times 3 + 0$$

$$\frac{264}{432} = \frac{264 \div 24}{432 \div 24} = \frac{11}{18}$$



التمرين الثاني

$$E = 5\sqrt{20} + \sqrt{45} ; E = 5\sqrt{2^2 \times 5} + \sqrt{3^2 \times 5}$$

$$= 5 \times 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$$

$$E = 10\sqrt{5} + 3\sqrt{5} ; E = 13\sqrt{5}$$

$$F = 5\sqrt{20} \times \sqrt{45} \times \sqrt{5} ; F = 30 \times 5\sqrt{5}$$

$$= 5 \times 2\sqrt{5} \times 3\sqrt{5} \times \sqrt{5} ; F = 150\sqrt{5}$$

$$= 10\sqrt{5} \times 3\sqrt{5} \times \sqrt{5}$$

حساب S_2 حيث $S = 4 - \sqrt{5}$

$$S^2 = (4 - \sqrt{5})^2$$

$$= 4^2 + (\sqrt{5})^2 - 2 \times 4 \times \sqrt{5}$$

$$S = 16 + 5 - 8\sqrt{5}$$

$$S = 21 - 8\sqrt{5}$$

التمرين الثالث

حساب BC:

$$\tan \hat{A} = \frac{BC}{AB} ; \tan 60^\circ = \frac{BC}{5}$$

$$1,73 = \frac{BC}{5} ; BC = 1,73 \times 5$$

$$BC \approx 8,6 \text{ cm}$$

حساب BD :

$$\sin 60^\circ = \frac{BD}{5} , 0,86 \times 5 = BD$$

$$BD \approx 4,3 \text{ cm}$$



حساب AC:

بتطبيق نظرية فيثاغورث على المثلث القائم ABC في B لدينا:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 \quad AC^2 = 98,96$$

$$= 5^2 + (8,6)^2 \quad AC = \sqrt{98,96}$$

$$= 25 + 73,96 \quad AC \approx 9,9 \text{ cm}$$

حساب مساحة المثلث ABC

$$S = \frac{b \times h}{2} = \frac{AB \times BC}{2} = \frac{5 \times 8,6}{2} ; S \approx 21,5 \text{ cm}^2$$

التمرين الرابع

1 □ مساحة المستطيل ABCD : لتكن S

$$S = L \times l ; S = (y + 5) \times 7$$

$$S = 7y + 35$$

2 □ نرمز محيط المستطيل بـ: P.

$$P = (L + l) \times 2$$

$$= (y + 5 + 7) \times 2$$

$$P = (y + 12) \times 2 \quad P = 2y + 24$$

قيمة y إذا كان P = 32

$$32 = 2y + 24 ; 2y = 32 - 24$$

$$2y = 8 ; y = \frac{8}{2} ; y = 4$$



مسألة

1 حساب مسافة الانحدار BC:

بتطبيق نظرية فيثاغورث على المثلث ABC القائم في A لدينا:

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 \\ &= (1500)^2 + (2000)^2 \\ &= 2250000 + 4000000 \end{aligned}$$

$$BC^2 = 6250000 ; BC = \sqrt{6250000} ; BC = 2500m$$

2 حساب زاوية $\hat{C}$ الانحدار بالتدوير إلى الوحدة:

$$\cos \hat{C} = \frac{AC}{BC} = \frac{2000}{2500} ; \cos \hat{C} = 0,8$$

$$\hat{C} = 37^\circ$$

3 حساب المدة الزمنية: التحويل:

$$V = 50km/h$$

$$V = \frac{d}{t} ; t = \frac{d}{v} \quad d = 2500m$$

$$= 2,5km$$

$$t = \frac{2,5km}{50km/h} ; t = 0,05h ; t = 0,05 \times 60 ; t = 3mn$$

4 المثلث ABC: (BA) // (TD)

بتطبيق نظرية طاليس لدينا:



التحدي في الفروض والاختبارات

$$\frac{CD}{CA} = \frac{CT}{CB} ; CD = \frac{1}{5} CA = \frac{2000}{5} ; CD = 400m$$

$$\frac{400}{2000} = \frac{CT}{2500} ; 2000CT = 400 \times 2500 ; CT = \frac{400 \times 2500}{2000}$$

$$CT = 500m$$

$$\frac{CT}{CB} = \frac{TD}{AB} ; \frac{500}{2500} = \frac{TD}{1500} ; 500 \times 1500 = 2500 \times TD$$

$$TD = \frac{500 \times 1500}{2500} ; TD = 300m$$

$$\cos T = \frac{TD}{CT} = \frac{300}{500} ; \cos T = 0,6$$

$$T \approx 53^\circ$$





الاختبار الثاني

التمرين الأول

1 حساب العبارة A بالنقصان:

$$A = \frac{3 - \frac{2}{3}}{\frac{4}{3} + 7} = \frac{\frac{9-2}{3}}{\frac{4+21}{3}} = \frac{\frac{7}{3}}{\frac{25}{3}}$$

$$A = \frac{7}{3} \times \frac{3}{25}$$

$$A = \frac{7}{25}$$

2 حساب العبارة B بقيمة مقربة 2-10

$$B = 3\sqrt{2} - 5\sqrt{75} + 7\sqrt{5}$$

$$B = 3 \times 1,41 - 5 \times 8,66 + 7 \times 2,23$$

$$B = 4,23 - 43,3 + 15,61$$

$$B = -39,07 + 15,61$$

$$B = -23,46$$

3 حساب العبارة C ثم أعط الكتابة العلمية:

الحساب:

$$C = \frac{49 \times 10^3 \times 6 \times 10^{-6}}{14 \times 10^{-2}}$$

$$C = \frac{49}{14} \times 10^3 \times 10^{-6} \times 10^2$$

$$C = 21 \times 10^{-1}$$

الكتابة العلمية:

$$C = 2,1 \times 10 \times 10^{-1}$$

$$C = 2,1 \times 10^0$$

التمرين الثاني

نعين PGDC(480 , 320)

$$480 = 230 \times 1 + 160$$

$$320 = 160 \times 2 + 0$$

منه: PGDC(480 , 320) = 160

أكبر عدد ممكن لتكوين الأفواج هو 160.

عدد الذكور: $320 \div 160 = 2$

عدد الإناث: $480 \div 160 = 3$

عدد الذكور والإناث في كل فوج هو 5 تلاميذ.

التمرين الثالث

حساب الطول BC:

بتطبيق نظرية فيثاغورث على المثلث ABC القائم في .

$$BC^2 = AC^2 + AB^2$$


$$BC^2 = 6^2 + 9^2$$

$$BC^2 = 36 + 81$$

$$BC^2 = 117$$

$$BC = \sqrt{117}$$

$$BC = 10,81$$



1 حساب $\cos \hat{B}$:

$$\cos \hat{B} = \frac{\text{طول الضلع المجاور}}{\text{طول الوتر}}$$

$$\cos \hat{B} = \frac{AB}{BC}$$

$$\cos \hat{B} = \frac{9}{10,81} \cong 0,83$$

$$\tan \hat{C} = \frac{\text{طول الضلع المقابل}}{\text{طول الضلع المجاور}}$$

$$\tan \hat{C} = \frac{AB}{AC} = \frac{9}{6} = 1,5$$

2 في المثلث CAB:

$$\frac{AD}{AC} = \frac{1}{3} = 0,33 \quad \frac{AE}{AB} = \frac{3}{9} \cong \frac{1}{3} = 0,33$$

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB} \quad \text{و منه:}$$

و النقط A . D . C على نفس الترتيب حسب النظرية العكسية

لطاليس ومنه: (BC) // (DE)

حساب الطول DE:

$$\frac{AE}{AB} = \frac{DE}{CB}$$

$$\frac{3}{9} = \frac{DE}{10,81}$$

$$DE = \frac{10,81 \times 3}{9}$$



③ في المثلث BAC:

E نقطة من [AB]

D نقطة من [AC]

(ED) // (CB) حسب نظرية طاليس.

المسألة

الجزء الأول

حساب الطول ED:

$$ED = EC - DC$$

$$ED = 7 - 4$$

$$ED = 3 \text{ m}$$

حساب AE في المثلث القائم ADE:

حسب نظرية فيثاغوس:

$$AE^2 = ED^2 + AD^2$$

$$AE^2 = 9 + 16$$

$$AE = 5$$

حساب مساحة المثلث S:

S_1 مساحة المثلث، S_2 مساحة المربع.

$$S_1 = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ m}^2$$

$$S_2 = 4 \times 4$$

$$S_2 = 16 \text{ m}^2$$

$$S = S_1 + S_2$$

$$S = 6 + 16$$

$$S = 22 \text{ m}^2$$

الجزء الثاني
مساحة EDA:

$$S = \frac{x \times 4}{2}$$

$$S = 2m^2$$

$$S = 13m^2$$

$$x = 13 \div 2$$

$$x = 6,5$$

معناه $2x = 13$ منه

مساحة المحل بدلالة x :

$$S = 2x + 16$$

المبلغ الذي يدفعه خالد:

$$22 \times 4500 = 99\,000 \text{ DA}$$



الاختبار الثالث

التمرين الأول

$$1) A = 0,7 \times 125 \times 10^{-3} = 7 \times 10^{-1} \times 125 \times 10^{-3} = 875 \times 10^{-4}$$

$$2) B = \frac{24 \times 10^{-2} \times 3 \times 10^1}{5 \times 10^4} = \frac{24 \times 3 \times 10^{-2} \times 10^1}{5 \times 10^4} = \frac{72 \times 10^{-1}}{5 \times 10^4}$$

$$B = 1,44 \times 10^{-4}$$

الكتابة العلمية $B = 1,44 \times 10^{-5}$

$$3) 546 = 462 \times 1 + 84$$

$$1,44 \times 10^{-4} = PGCD(546; 462)$$

$$462 = 84 \times 5 + 42$$

$$\frac{462}{546} = \frac{462 \div 42}{546 \div 42} = \frac{11}{13}$$

$$84 = 42 \times 2 + 0$$


التمرين الثاني

$$\left. \begin{aligned} A = \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \quad \text{و} \quad B = \frac{4\sqrt{35}}{\sqrt{7}} = 4\sqrt{\frac{35}{7}} = 4\sqrt{5} \\ \text{أو} \quad A = \sqrt{80} \cong 8,9; \quad B = \frac{4\sqrt{35}}{\sqrt{7}} = \frac{4(5,9)}{(7)} = 8,9 \end{aligned} \right\} A = B$$

$$\left. \begin{aligned} C = \frac{2\sqrt{2} \times \sqrt{18}}{(3\sqrt{2})^2} = \frac{2\sqrt{36}}{9 \times 2} = \frac{2 \times 6}{9 \times 2} = \frac{2}{3} \\ D = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1 \end{aligned} \right\} C = D$$



التمرين الثالث



(BC) // (AD) □

حسب نظرية طاليس:

$$\frac{MA}{MC} = \frac{MD}{MB} = \frac{AD}{BC}$$

$$\frac{x}{5} = \frac{5}{x} = \frac{6}{BC}$$

$$\frac{x}{5} = \frac{5}{x}, \quad x^2 = 25, \quad x = \sqrt{25}, \quad x = 5 \text{ cm}$$

الرابعي ABCD متوازي أضلاع لأن قطريه متساويان متناصفان.


هو مستطيل لأن قطريه متقايسان $AC = BD = 10$

$$BC = 6, \quad BC = \frac{6 \times 5}{5} \text{ أي } \frac{5}{5} = \frac{6}{BC}$$

التمرين الرابع

إنجاز الشكل:

حساب AB:



$$\tan 40^\circ = \frac{AB}{AC} = \frac{AB}{5}$$

$$\tan 40^\circ \approx 0,83 \quad \frac{AB}{5} = 0,83$$

$$AB = 5 \times 0,83, \quad AB = 4,2 \text{ cm}$$

التحدي في الفروض والاختبارات

حساب AH :

$$\sin 40^\circ = \frac{AH}{AC} = \frac{AH}{5}$$

$$\sin 40^\circ \approx 0,6 \quad , \quad \frac{AH}{5} = 0,6$$

$$AH = 5 \times 0,6 \quad , \quad AH = 3 \text{ cm}$$

المسألة

نبرهن أن المثلث ABC قائم في B :

$$AC^2 = 3^2 = 9 \quad \text{و} \quad AB^2 + BC^2 = (1,80)^2 + (2,40)^2$$

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 \quad \text{أي} \quad 3,24 + 5,76 = 9$$

حسب النظرية العكسية لفيتاغورث يكون المثلث ABC قائم في B.

حساب ACB :

$$\sin \hat{ACB} = \frac{AB}{AC} = \frac{1,80}{3} = 0,6$$

$$\hat{ACB} \approx 37^\circ$$

حساب طول [ED]

لدينا: (CB) // (ED)

$$\frac{AE}{AC} = \frac{AD}{AB} = \frac{ED}{CB} \quad \text{حسب نظرية طاليس:}$$

$$\frac{8 - 0,6}{1,8} = \frac{ED}{2,4} \quad \text{أي} \quad \frac{ED}{2,4} = \frac{1,2}{1,8}$$

$$\frac{1,2 \times 2,4}{1,8} = 1,6$$

نبرهن أن: $(BC) \parallel (GF)$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{AF}{AB} = \frac{0,72}{1,80} = 0,4 \\ \frac{AG}{AC} = \frac{1,20}{3} = 0,4 \end{array} \right\} \text{ أي } \frac{AF}{AB} = \frac{AG}{AC}$$

حسب نظرية طاليس العكسية يكون: $(BC) \parallel (GF)$.

الاختبار الرابع



التمرين الأول

1

$$\text{PGCD}(72, 198) = 18$$

$$198 = 72 \times 2 + 54$$

$$72 = 54 \times 1 + 18$$

$$54 = 18 \times 3 + 0$$

حساب A:

$$A = \frac{233}{2} - \frac{7}{36} \div \frac{2}{5}$$

$$A = \frac{233}{72} - \frac{7 \times 5}{36 \times 2}$$

$$A = \frac{233}{72} - \frac{35}{72}$$

$$A = \frac{233 - 35}{72}$$

$$A = \frac{198 \div 18}{72 \div 18}$$

$$A = \frac{11}{4}$$



التمرين الثاني

1

$$A = \sqrt{7} \times \sqrt{28} - \sqrt{27} \times \sqrt{3}$$

$$A = \sqrt{7} \times \sqrt{7 \times 4} - \sqrt{3 \times 9} \times \sqrt{3}$$

$$A = \sqrt{49} \times 2 - 3 \times 3$$

$$A = 7 \times 2 - 9$$

$$A = 5$$

$$B = 2\sqrt{18} - 5\sqrt{72} + 3\sqrt{50}$$

$$B = 2\sqrt{9 \times 2} - 5\sqrt{36 \times 2} + 3\sqrt{25 \times 2}$$

$$B = 2 \times 3\sqrt{2} - 5 \times 6\sqrt{2} + 3 \times 5\sqrt{2}$$

$$B = 6\sqrt{2} - 30\sqrt{2} + 15\sqrt{2}$$

$$B = (6 - 30 + 15)\sqrt{2}$$

$$B = -9\sqrt{2}$$

$$(A + B)^2 = (5)^2 + (-9\sqrt{2})^2 - 2 \times 5 \times 9\sqrt{2}$$

$$(A + B)^2 = 25 + 81 \times 2 - 90\sqrt{2}$$

$$(A + B)^2 = 25 + 162 - 90\sqrt{2}$$

$$(A + B)^2 = 187 - 90\sqrt{2}$$

$$\left(\frac{A}{B}\right)^2 = \left(\frac{5}{-9\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{25}{81 \times 2} = \frac{25}{162}$$

استاذ الرياضيات
بن داودي علي

التمرين الثالث

$$S = 120m^2$$

$$l = \frac{2}{3}L$$

$$S = l \times L$$

$$120 = \frac{2}{3}L \times l$$

$$120 = \frac{2}{3}L^2$$

$$L^2 = 120 \times \frac{3}{2}$$

$$L^2 = 180$$

$$L = \sqrt{180}$$

$$L = 13,41m$$

$$l = 13,41 \times \frac{2}{3}$$

$$l = 8,94m$$

التمرين الرابع

$$\cos \hat{A}BC = \cos \hat{B}CA = \frac{1}{2}$$


$$\hat{A}BC = 60^\circ$$

$$\cos \hat{A}CB = 60^\circ$$

$$180^\circ - (60^\circ + 60^\circ) = 60^\circ$$

ومنه ABC متقايس أضلاع.

نبيين أن:



ABD مثلث قائم في D لأن أحد أضلاعه هو قطر الدائرة.

حساب AD:

$$\sin \hat{A}BD = \frac{AD}{AB}$$

$$\sin \hat{A}BD = \sin 30^\circ = \frac{1}{2} = \frac{AD}{6}$$



$$BD = 3\sqrt{3} \quad \text{لنبتين أن}$$

$$\cos \angle ABD = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$BD = \frac{6\sqrt{3}}{2} = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

حساب EC:

نطبق نظرية طاليس:

$$\frac{BA}{BE} = \frac{BD}{BC} = \frac{AD}{EC}$$

$$\frac{6}{BE} = \frac{3\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = \frac{3}{EC}$$

$$EC = 4 \text{ cm}$$



حلول نماذج الفصل الثاني



الفرض الأول

التمرين الأول

حل المعادلات:

$$7x - (3x + 4) = x + 2$$

$$7x - 3x - 4 = x + 2 \text{ أي}$$

$$4x - 4 = x + 2 \text{ ومنه } 4x - x = 2 + 4 \quad 3x = 6$$

$x = \frac{6}{3} = 2$ وهو حل للمعادلة المعطاة.

$$-3x - 1 = \frac{x + 5}{2}$$

$$-6x - 2 = x + 5 \text{ أي}$$

$$-6x - x = 5 + 2$$

$$-7x = 7 \text{ أي } x = \frac{-7}{7} = -1$$

$$x = -1$$

وهو حل للمعادلة المعطاة.

التمرين الثاني

$$E = (2x - 3)^2 - (2x - 3)(x - 2) \text{ عبارة حيث}$$

1] نشر وبسط العبارة E:

$$E = 4x^2 - 6x + 9 - 2x^2 + 4x + 3x - 6$$

$$E = 2x^2 + x + 3$$

2] تحليل العبارة E:

$$E = (2x - 3)(x - 2)$$

$$E = (2x - 3)(2x - 3 - x + 2)$$

$$E = (2x - 3)(x - 1)$$

التحدي في الفروض والاختبارات

3 حساب E من أجل $x=2$

$$E = (2 \times 2 - 3)(2 - 1) , E = (4 - 3)(1) , E = 1$$

4 حل المعادلة:

$$(2x - 3)(x - 1) = 0$$

$$2x - 3 = 0 \quad x - 1 = 0$$

$$2x = 3 \quad x = \frac{3}{2}$$

$$x - 1 = 0 \quad x = 1$$

للمعادلة حلان هما $\frac{3}{2}$, 1

التمرين الثالث

معلم متعامد ومتجانس. $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$

حساب إحداثي $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$

$$\overrightarrow{AC}(C_x - A_x ; C_y - A_y)$$

$$\overrightarrow{AC}(4 + 3 ; 0 - 1), \overrightarrow{AC}(7 ; -1)$$

1

$$\overrightarrow{BC}(4 - 5 ; 0 - 7), \overrightarrow{BC}(-1 ; -7)$$

$$AC = \sqrt{(C_x - A_x)^2 + (C_y - A_y)^2}$$

$$AC = \sqrt{(7)^2 + (-1)^2} = \sqrt{50}$$

2

$$BC = \sqrt{(-1)^2 + (-7)^2} = \sqrt{50}$$



التحدي في الفروض والاختبارات


3] نبين أن المثلث ABC قائم في C ومتساوي الساقين

نحسب AB :

$$\begin{cases} AB = \sqrt{(5+3)^2 + (7-1)^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} \\ AB = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10, AB^2 = 100 \\ AC^2 + BC^2 = 50 + 50 = 100 \end{cases}$$

بما أن $AC^2 + BC^2 = AB^2$ فإن المثلث ABC قائم و $BC = AC$ فالمثلث قائم في C ومتساوي الساقين.

4] حساب طول نصف قطر الدائرة :



5] الرباعي DBCA مربع لأن $\overline{BD} = \overline{CA}$ فهو متوازي أضلاع. زواياه قائمة وله ضلعان متتاليان متقايسان.





الفرض الثاني

التمرين الأول

1 أبتن أن مساحة هذا المستطيل هي عدد طبيعي بحساب المسافة:

$$S = L \times l$$

$$S = (3\sqrt{2} + 1)(3\sqrt{2} - 1)$$

نعوض:

$$S = (3\sqrt{2})^2 - 1^2$$

$$S = 18 - 1$$

$$S = 17 \text{ cm}^2$$

2 حساب A:

$$A = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

$$A = \frac{1}{3\sqrt{2} - 1} + \frac{1}{3\sqrt{2} + 1}$$

$$A = \frac{1 \times (3\sqrt{2} + 1)}{(3\sqrt{2} - 1)(3\sqrt{2} + 1)} + \frac{1 \times (3\sqrt{2} - 1)}{(3\sqrt{2} + 1)(3\sqrt{2} - 1)}$$

$$A = \frac{3\sqrt{2} + 1 + 3\sqrt{2} - 1}{17}$$

$$A = \frac{(3 + 3)\sqrt{2}}{17}$$



التمرين الثاني

1 حساب K:

$$K = 2\sqrt{500} - 3\sqrt{45}$$

$$K = 2\sqrt{5^2 \times 2^2 \times 5} - 3\sqrt{9 \times 5}$$

$$K = 20\sqrt{5} - 9\sqrt{5}$$

$$K = 11\sqrt{5}$$

2 نشر وتبسيط العبارة L:

$$L = (2x - 3)(x - 2) - (x - 3)^2$$

$$L = 2x^2 - 4x - 3x + 6 - x^2 - 9 + 6x$$

$$L = x^2 - x - 3$$

3 حساب L بحيث K=x:

$$L = (11\sqrt{5})^2 - 11\sqrt{5} - 3$$

$$L = 121 \times 5 - 3 - 11\sqrt{5}$$

$$L = 602 - 11\sqrt{5}$$

4 حل المتراجحة:

$$x^2 - x + 15 < x^2 + 5x$$

$$x^2 - x^2 - x - 5x < -15$$

$$-6x < -15$$

نضرب المتراجحة في (-1)

$$(-1)(-6x) < (-1)(-15)$$


$$6x > 15$$

$$x > \frac{15}{6}$$

كل قيم x الأكبر تماماً من 2,5 هي حل للمتراجحة.

التمرين الثالث

الشكل



1] أثقّق بأنّ ABCE متوازي أضلاع:

في الرّباعي ABCE لدينا $\overline{BC} = \overline{AE}$

معناه: $BC = AE$ و $(BC) \parallel (AE)$.

ومنه ABCE متوازي أضلاع.

2] أبين بأنّ النقطتان E و F متناظرتان بالنسبة إلى C:

من البرهان الأوّل $AB = EC$ و $CF = AB$ (من المعطيات).

إذن C منتصف [EF] معناه E و F متناظرتان بالنسبة إلى C.

التمرين الرابع

1] نبين أن المثلث ABC قائم في B

حساب AB:

$$\overline{AB} \begin{pmatrix} 2-5 \\ 6-2 \end{pmatrix} \quad \overline{AB} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{(-3)^2 + 4^2}$$

$$\sqrt{9 + 16}$$

$$\sqrt{25} \quad AB = 5$$

التحدي في الفروض والاختبارات

2 حساب AC :

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 6-5 \\ 0-2 \end{pmatrix} \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -11 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$AC = \sqrt{(-11)^2 + (-2)^2}$$

$$AC = \sqrt{125}$$

3 حساب BC :

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -6-2 \\ 0-6 \end{pmatrix} \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -8 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$BC = \sqrt{(-8)^2 + (-6)^2}$$

$$BC = \sqrt{64 + 36}$$

$$BC = \sqrt{100}$$

$$BC = 10$$

بتطبيق نظرية فيثاغورس العكسية:

$$AC^2 = \sqrt{125^2}$$

$$AC^2 = 125$$

$$AB^2 + BC^2 = 5^2 + 10^2, AB^2 + BC^2 = 25 + 100$$

$$AB^2 + BC^2 = 125, AC^2 = AB^2 + BC^2$$

ومنه $125=125$ فالمثلث ABC قائم في B.

حساب إحداثيات D :

نأخذ : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ ونعلم أنّ : $D(x, y)$

$$\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+6 \\ y-0 \end{pmatrix} \text{ إذن :}$$

ومنه:

وأیضا:



التحدي في الفروض والاختبارات

ومنه:


$$-3 = x + 6$$

$$-x = 6 + 3$$

$$-x = 3$$

$$x = -3$$

وأیضا: $4 = y - 0$
 $y = -4$
 ومنه: $D(-3, -4)$



الفرض الثالث



التمرين الأول

1 نشر وتبسيط العبارة A:

$$A = (2x - 1)^2 + (2x - 1)(5x + 2)$$

$$A = 4x^2 - 4x + 1 + 10x^2 - 5x + 4x - 2$$

$$A = 14x^2 - 5x - 1$$

2 تحليل العبارة A:

$$A = (2x - 1)^2 + (2x - 1)(5x + 2)$$

$$A = (2x - 1)[(2x - 1) + (5x + 2)]$$

$$A = (2x - 1)(2x - 1 + 5x + 2)$$

$$A = (2x - 1)(7x + 1)$$

3 حل المعادلة:

$$(2x - 1)(7x + 1) = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{إما} \quad 2x - 1 = 0 \quad \text{معناه} \quad 2x = 1 \quad \text{أي} \quad x = \frac{1}{2}$$

$$x = -\frac{1}{7} \quad \text{أو} \quad 7x + 1 = 0 \quad \text{معناه} \quad 7x = -1 \quad \text{أي} \quad x = -\frac{1}{7}$$

للمعادلة حلين هما: $-\frac{1}{7}$; $\frac{1}{2}$



محيط المثلث:

$$P = (2x - 2) + (2x - 2) + (2x - 2)$$

$$P = 2x - 2 + 2x - 2 + 2x - 2$$

$$P = 6x - 6$$

محيط المستطيل:

$$P_1 = (L + l) \times 2$$

$$P_1 = (7 + x) \times 2$$

$$P_1 = 2x + 14$$

$$6x - 6 < 2x + 14 \text{ معناه } P < P_1$$

$$6x - 2x < 14 + 6$$

$$4x < 20$$


$$x < 20 \div 4$$

$$x < 5$$

من أجل $x < 5$ يكون محيط المثلث أصغر من محيط المستطيل.

التمرين الثالث

1. تعليم النقط:



التحدي في الفروض والاختبارات

2 حساب AB:

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$AB = \sqrt{(2 - 6)^2 + (-3 - 5)^2}$$

$$AB = \sqrt{(-4)^2 + (-8)^2}$$

$$AB = \sqrt{16 + 64}$$

$$AB = \sqrt{80} , \quad AB = 4\sqrt{5} \text{ cm}$$

حساب BC:

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$$

$$BC = \sqrt{(-4 - 2)^2 + (0 + 3)^2}$$

$$BC = \sqrt{(-6)^2 + (3)^2}$$

$$BC = \sqrt{36 + 9}$$

$$BC = \sqrt{45} , \quad BC = 3\sqrt{5} \text{ cm}$$

حساب AC:

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2}$$

$$AC = \sqrt{(-4 - 6)^2 + (0 - 5)^2}$$

$$AC = \sqrt{(-10)^2 + (-5)^2}$$

$$AC = \sqrt{100 + 25}$$

$$AC = \sqrt{125} , \quad AC = 5\sqrt{5} \text{ cm}$$

2 لنثبت صحة المساواة:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = (4\sqrt{5})^2 + (3\sqrt{5})^2 = 125$$

التحدي في الفروض والاختبارات

ومنه $AC^2 = AB^2 + BC^2$ أي المثلث ABC قائم في B حسب النظرية العكسية فيثاغورس.

3] حساب مساحة ABC:

$$S = \frac{BC \times AB}{2} = \frac{4\sqrt{5} \times 3\sqrt{5}}{2}$$

$$S = \frac{12 \times 5}{2} = \frac{60}{2}$$

$$S = 30 \text{ cm}^2$$





الاختبار الأول

التمرين الأول

1 النشر والتبسيط:

$$A = (2x - 1)^2 - 49$$

$$A = 4x^2 + 1 - 4x - 49$$

$$A = 4x^2 - 48 - 4x$$

2 التحليل:

$$A = (2x - 1)^2 - 49$$

$$A = (2x - 1)^2 - (7)^2$$

$$A = (2x - 1 + 7)(2x - 1 - 7)$$

$$A = (2x + 6)(2x - 8)$$

3 حساب A من أجل $x = \sqrt{3}$

$$A = 4x^2 - 48 - 4x$$

$$A = 4 \times (\sqrt{3})^2 - 48 - 4\sqrt{3}$$

$$A = 4 \times 3 - 48 - 4\sqrt{3}$$

$$A = 12 - 48 - 4\sqrt{3}$$

$$A = -36 - 4\sqrt{3}$$

4 حل المتراجحة:



التحدي في الفروض والاختبارات


$$4x^2 - 4x^2 - 4x \leq 48$$

$$-4x \leq 48$$

$$x \geq -\frac{48}{4}$$

$$x \geq -12$$

كل قيم x الأكبر من أو تساوي -12 هي حلول للمتراجحة.
التمثيل البياني:



التمرين الثاني

الترميز: العرض هو x :

الطول هو $2x$ أو $3x$ أي $6x$.

1 البحث عن العرض:

$$168 = (x + 6x) \times 2$$

$$168 = 2x + 12x$$

$$168 = 14x$$

$$x = \frac{168}{14}$$

$$x = 12m$$


العرض هو : $12m$

2 البحث عن الطول: $12 \times 6 = 72m$

مساحة القطعة هي:




التمرين الثالث



بما أن D هي صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$ معناه $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$
 منه: ABCD متوازي الأضلاع لكن $AB = AC$.
 $AB = AC = CD = BD$ أي الرباعي ABDC معين.
 نعلم أن قطري الرباعي ABDC متعامدان و $AC = CD$ يعني C تنتمي
 إلى محور [AD].
 النقاط B, C, t تنتمي إلى [AD] أي: $AT = TD$
 المثلث ATD متساوي الساقين.



التمرين الرابع



1

2 حساب إحداثيات الأشعة:

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A)$$

$$\overrightarrow{AB}(0 - 2; -1 - 0)$$

$$\overrightarrow{AB}(-2; -1)$$

$$\overrightarrow{BC}(x_C - x_B, y_C - y_B)$$

$$\overrightarrow{BC}(0 - 0; 4 - (-1))$$

$$\overrightarrow{BC}(0; 5)$$

بن داودي علي

3 حساب الأطوال:

$$AB = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2}$$

$$AB = \sqrt{4+1} \text{ أي } AB = \sqrt{5}$$

$$AC = \sqrt{(x_c - x_A)^2 + (y_c - y_A)^2}$$

$$AC = \sqrt{(0-2)^2 + (4-0)^2} \text{ أي } AC = \sqrt{(-2)^2 + (4)^2}$$

$$AC = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} \text{ ومنه :}$$

$$BC = \sqrt{(0)^2 + (5)^2} \text{ أي } BC = \sqrt{25} \text{ أي } BC = 5$$

4 حساب $AB^2 + AC^2$ و BC^2

$$BC^2 = (5)^2 = 25$$

$$AB^2 + AC^2 = (\sqrt{5})^2 + (\sqrt{20})^2 = 5 + 20 = 25$$

بما أن $BC^2 = AB^2 + AC^2$ حسب النظرية العكسية لفيثاغورث المثلث ABC قائم في A.

K منتصف الوتر [BC] فهي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC إذن:

$$x_K = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{0+0}{2} = 0 \quad x_K = 0$$

$$y_K = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{4+(-1)}{2} = \frac{3}{2} = 1,5 \quad y_K = 1,5$$

$$K(0; 1,5)$$

5 حساب منتصف القطر:

$$KB = \frac{BC}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 \quad KB = 2,5$$



التحدي في الفروض والاختبارات

6 حساب KH:

$$KH = \sqrt{(x_H - x_K)^2 + (y_H - y_K)^2}$$

$$KH = \sqrt{(2-0)^2 + \left(3-\frac{3}{2}\right)^2}$$

$$KH = \sqrt{4 + \left(\frac{6-3}{2}\right)^2} = \sqrt{4 + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{49}{4}}$$

$$KH = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2} = 2,5$$

بما أن $KA = KB$ فإن H تنتمي إلى الدائرة.

المسألة

1) نعبّر بدلالة x عن التسعيرتين:

$$A(x) = 20x \quad B(x) = 10x + 50$$

2) تكلفة أربع كتب حسب كل طريقة:

$$20 \times 4 = 80 \text{ DA}$$

$$10x + 50 = 90 \text{ DA}$$

$$160 = 10x + 50$$

$$10x = 160 - 50$$

$$10x = 110$$

$$x = \frac{110}{10}$$

عدد الكتب التي استعارها هو 11 كتاب.



التحدي في الفروض والاختبارات

II - الرسم البياني:

x	0	5
B(x)	50	100

x	0	4
A(x)	0	80

(D₁) مستقيم ممثل للدالة A.

(D₂) مستقيم ممثل للدالة B.

بيانيا إذا كان عدد الكتب المستعارة 5 فإن المبلغ المدفوع بالطريقتين متساويين وهو 100DA.

حسابيا:

$$20x = 10x + 50$$


$$20x - 10x = 50$$

$$10x = 50$$

$$x = \frac{50}{10}$$

$$x = 5$$

10DA
1livre



الاختبار الثاني



التمرين الأول

$$P = (L + 1) \times 2$$

إذا كان l هو الطول و L هو العرض فإن : $l = 2L$

$$(L + 2L) \times 2 = 144 \quad \text{ومنه:}$$

$$3L \times 2 = 144$$

$$6L = 144$$

$$L = 144 \div 6 \quad L = 24$$

إذن الطول هو 24×2 ، العرض 24

$$(24 + 48) \times 2 = \quad \text{التحقيق:}$$

$$72 \times 2 = 144$$

حساب مساحة المستطيل : $S = L \times l$

$$S = 24 \times 48 \quad S = 1152$$

التمرين الثاني

1 نشر وتبسيط العبارة E:

$$E = (3x + 1)^2 - x(3x + 1)$$

$$E = 9x^2 + 6x + 1 - 3x^2 - x$$

$$E = 6x^2 + 5x + 1$$

2 تحليل العبارة E:

$$E = (3x + 1)[(3x + 1) - x]$$

$$E = (3x + 1)(2x + 1)$$

$$(3x + 1)(2x + 1) = 0$$



التحدي في الفروض والاختبارات

معناه: إما : $3x+1=0$ أي $3x=-1$ ومنه : $x=-\frac{1}{3}$

أو : $2x+1=0$ أي $2x=-1$ ومنه : $x=-\frac{1}{2}$

للمعادلة حلان : $-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{3}$
إليك المتراجحة:

$$E \leq 6x^2 + x - 2$$


$$6x^2 + 5x + 1 \leq 6x^2 + x - 2$$

$$6x^2 - 6x^2 + 5x - x \leq -2 - 1$$


$$4x \leq -3$$

$$x \leq -\frac{3}{4} \quad x \leq -0,75$$

كل قيم x الأصغر من أو تساوي من $(-0,75)$ هي حلول للمتراجحة.



التمرين الثالث



التحدي في الفروض والاختبارات

① نبين أن : $\overline{HD} = \overline{SB}$

الرابعي HDBS فيه القطران [BH] و [DS] متناصفان فهو متوازي الأضلاع.

$$BS = DH$$

$$\overline{HD} = \overline{SB} \text{ إذن } \text{و}$$

$$(BS) // (DH)$$

نبين أن D منتصف [HR] :

نعلم أن : $SB = HD$ ①

الرابعي RBSD وفيه


$SB = DR$ ① بالانسحاب و $(SB) // (DR)$

من ① و ① نتحصل : $DR = HD$

والنقاط D ، R ، H على استقامية ومنه : D منتصف [RH].

التمرين الرابع

① تعليم النقط



2] حساب BC:

$$BC = \sqrt{(-3+2)^2 + (-2-1)^2}$$

$$BC = \sqrt{(-1)^2 + (-3)^2}$$

$$BC = \sqrt{10}$$

حساب AB:

$$AB = \sqrt{(-2-1)^2 + (1-2)^2}$$

$$AB = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2}$$

$$AB = \sqrt{9+1}$$

$$AB = \sqrt{10}$$

بما أن: $BC = AB = \sqrt{10}$ فإن المثلث ABC متساوي الساقين في B.

3] حساب $\overline{BC}$:

$$\begin{aligned} x_C - x_B &= -3 + 2 \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_C - y_B &= -2 - 1 \\ &= -3 \end{aligned}$$

$$\overline{BC}(-1, -3)$$

4] نبين أن ABCD معين:


بما أن المثلث ABC متساوي الساقين فإن: (BC) محور [AC].

نستنتج أن: القطران [BD] و [AC] متعامدان.

$\overline{BC} = \overline{AD}$ فالرباعي ABCD معين.



1 تعليم النقط



2 حساب AB:

$$AB = \sqrt{(3+4)^2 + (2-3)^2}$$

$$AB = \sqrt{7^2 + (-1)^2}$$

$$AB = \sqrt{49 + 1}$$

$$AB = \sqrt{50} \text{ cm}$$

في المثلث ABC لدينا:

$AB = AC = \sqrt{50}$ فالمثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي A.

3 حساب إحداثي H منتصف [BC]

$$\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{3+1}{2}, \frac{2-2}{2} = 0$$



التحدي في الفروض والاختبارات

4 [AH] ارتفاع محور ومتوسط في المثلث ABC لأن المثلث ABC متساوي الساقين.

$$AH = 3\sqrt{5}$$

بتطبيق نظرية فيثاغورس على المثلث القائم AHB.

$$AB^2 = AH^2 + HB^2$$

$$AH^2 = AB^2 - HB^2$$

$$AH^2 = \sqrt{50}^2 - \left(\frac{\sqrt{20}}{2}\right)^2$$

$$AH^2 = 50 - 5$$

$$AH^2 = 45$$

$$AH = \sqrt{45}$$

$$AH = 3\sqrt{5}$$

5 [حساب مساحة المثلث ABC]:

$$S = \frac{\sqrt{20} \times 3\sqrt{5}}{2}$$

$$S = 15 \text{ cm}^2$$

الجزء الثاني

حساب $\overrightarrow{AC}$: معين

$$x_C - x_A = 1 + 4 = 5$$

$$y_C - y_A = -2 - 3 = -5$$



بين أن: $D(8, -3)$

بما أن: $\overline{BD} = \overline{AC}$

$$\overline{BD}(x-3; y-2)$$

ب-

$$\overline{BD}(x-3; y-2)$$

$$x-3=5$$

$$x=5+3$$

$$x=8$$

منه: $D(8, -3)$

ج- نوع الرباعي ACDB متوازي الأضلاع لأن:

$$\overline{AC} = \overline{BD} \text{ (بالانسحاب).}$$

وبما أن: القطران متعامدان فالرباعي ACDB معين.



الاختبار الثالث

التمرين الأول

1 نشر وتبسيط العبارة A:

$$A = (x^2 - 36) - (x - 6)(2x - 1)$$

$$A = x^2 - 36 - 2x^2 + x + 12x - 6$$

$$A = -x^2 + 13x - 42$$

2 تحليل العبارة A إلى جداء عاملين:

$$A = (x^2 - 36) - (x - 6)(2x - 1)$$

$$A = (x - 6)(x + 6) - (x - 6)(2x - 1)$$

$$A = (x - 6)[(x + 6) - (2x - 1)]$$

$$A = (x - 6)(x + 6 - 2x + 1)$$

$$A = (x - 6)(-x + 7)$$

3 حساب العبارة A من أجل

$$A = ((-1)^2 - 36) - (-1 - 6)(2(-1) - 1)$$

$$A = (-35) - (-7)(-3)$$

$$A = (-35) - (+21)$$

$$A = -35 - 21$$

$$A = -56$$

4 حل المعادلة:

$$(x - 6)(-x + 7) = 0$$

معناه: $x = 6 = 0$
 بن داودي عالم
 معناه: $x = 6$

ولدينا:

$$-x + 7 = 0$$

$$-x = -7$$

$$x = 7 \text{ ومنه :}$$

العدان 6، 7 هما حلا لهذه المعادلة.

$$\boxed{5} \text{ حل المتراجحة: } A \leq x^2 + 26$$

معناه:


$$-x^2 + 13x - 42 \leq -x^2 + 26$$

$$-x^2 + x^2 + 13x \leq 26 + 42$$

$$13x \leq 68$$

$$x \leq \frac{68}{13}$$

كل قيم x الأصغر أو تساوي $\frac{68}{13}$ هي حل لهذه المتراجحة.
التمثيل البياني:



التمرين الثاني

$$x + 3x + 2x + x + 10 = 115$$

$$7x = 115 - 10$$

$$7x = 105$$

$$x = 15$$

لدينا : مصطفى يمثل x

علي يمثل $3x$

سمير يمثل $x + 10$

رؤوف يمثل $2x$


ومنه: عُمر مصطفى هو: 15 سنة

عُمر علي هو: $3 \times 15 = 45$ سنة.

عُمر رؤوف: $2 \times 15 = 30$ سنة.

عُمر سмир: $15 + 10 = 25$ سنة.

التمرين الثالث



1. بين أن $\overline{SM} = \overline{MB}$.

بما أن $\overline{SM}$ و $\overline{MB}$ لهما: نفس المنحى ، نفس الطول ، نفس الاتجاه

إذن : $\overline{SM} = \overline{MB}$.

2. نبين أن $\overline{SA} + \overline{SU} = \overline{MB}$

في المتوازي الأضلاع SAMU لدينا في خواص الأضلاع.

$SU = AM$ و $(SU) \parallel (AM)$ ومنه : $\overline{SU} = \overline{AM}$

إذن : $\overline{SA} + \overline{SU} = \overline{SA} + \overline{AM}$



التحدي في الفروض والاختبارات

منه: نعلم أنّ: $\overline{SM} = \overline{MB}$

إذن: $\overline{SA} + \overline{AM} = \overline{SM}$

نستنتج أن: $\overline{SA} + \overline{SU} = \overline{MB}$

3] نبين أن للقطعتين [AM] و [SN] نفس المنتصف.

الرباعي SANM فيه $\overline{SA} = \overline{MN}$ (بالانسحاب) منه:


$SA = MN$ و $(SA) \parallel (MN)$.

من الرباعي SAMN متوازي الأضلاع:

من خواص القطران متناصفان.

نستنتج أنّ للقطعتين: [AN] و [SN] نفس المنتصف.

التمرين الرابع



1] حساب إحداثتي النقطة D:

حتى يكون الرباعي ABCD متوازي الأضلاع:

يكفي أن يكون: $\overline{AD} = \overline{BC}$



التحدي في الفروض والاختبارات

نفرض: $D(x, y)$.

$$\overline{AD} \begin{pmatrix} x-3 \\ y-3 \end{pmatrix} = \overline{BC} \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \end{pmatrix}$$

إذن: $x-3=-2$ و $y-3=-7$

ومنه $x=-2+3$ ومنه $y=-7+3$

$$x=1 \quad y=-4$$

ومنه: $D(1, -4)$

2] نأخذ F منتصف أحد القطرين في المتوازي الأضلاع ABCD

F منتصف [AC] إذن:

$$F\left(\frac{-4+3}{2}, \frac{-3+3}{2}\right) \quad F\left(\frac{-1}{2}, \frac{0}{2}\right)$$

$$F(-0,5, 0)$$

المسألة

1] أنقل وأتمم الجدول:

عدد الأقلام المشتراة	2	5	11	14
ZOHRA الثمن المدفوع في محل	30	75	165	210
DJAMILA الثمن المدفوع في محل	60	90	150	180

2] نعبّر عن P_1 بدلالة x $P_1 = 15x$

نعبّر عن P_2 بدلالة x $P_2 = 10x + 40$

3] الثمن لشراء 6 أقلام من محل Zohra : $6 \times 15 = 90$

الثمن لشراء 6 أقلام من محل DjamilA :

$$6 \times 15 = 90$$

$$60 + 40 = 100$$

الحل الأحسن لشراء 6 أقلام هو محل Zohra.

التحدي في الفروض والاختبارات

4] عدد الأقلام المشتراة بـ 90DA من محل Zohra : $90 \div 15 = 6$

عدد الأقلام المشاراة بـ 90DA من محل Djamila

$$90 - 40 = 50$$

$$50 \div 10 = 5$$

إذن الأحسن ليعقوب أن يشتري من محل Zohra

$$15x \leq 10x + 40$$

$$15x - 10x \leq 40$$

$$5x \leq 40$$

$$x \leq 8$$

إذن ابتداء من العدد 8 يصبح الثمن المدفوع عند المحل Zohra أقل أو يساوي الثمن المدفوع عند محل Djamila.



حلول نماذج الفصل الثالث





الفرض الأول

التمرين الأول

1) نشر وتبسيط العبارة:

$$\begin{aligned}(2 + 3\sqrt{3})^2 &= 2^2 + (3\sqrt{3})^2 + 2 \times 2 \times 3\sqrt{3} \\ &= 4 + 9 \times 3 + 12\sqrt{3} \\ &= 4 + 27 + 12\sqrt{3} \\ &= 31 + 12\sqrt{3}\end{aligned}$$

2) استنتاج حل المعادلة:

$$\begin{aligned}x^2 - 31 &= 12\sqrt{3} \\ x^2 &= 31 + 12\sqrt{3} \\ x^2 &= (2 + 3\sqrt{3})^2 \\ x^2 - (2 + 3\sqrt{3})^2 &= 0 \\ [x - (2 + 3\sqrt{3})][x + (2 + 3\sqrt{3})] &= 0 \\ (x - 2 - 3\sqrt{3})(x + 2 + 3\sqrt{3}) &= 0\end{aligned}$$

إما $x - 2 - 3\sqrt{3} = 0$ معناه $x = 2 + 3\sqrt{3}$

أو $x + 2 + 3\sqrt{3} = 0$ معناه $x = -2 - 3\sqrt{3}$

للمعادلة حلان وهما $2 + 3\sqrt{3}$ و $-2 - 3\sqrt{3}$



التمرين الثاني

$$f(x) = ax ; g(x) = 2x - 2$$

1] تعيين الدالة f حيث:

$$f(-2) = -6$$

$$\begin{aligned} f(-2) &= a \times (-2) \\ &= -2a \end{aligned}$$

$$a = 3 ; f(x) = 3x \text{ ومنه } -6 = -2a ; a = \frac{-6}{-2} \text{ معناه}$$

2] حساب $g\left(\frac{1}{2}\right)$:

$$g(x) = 2x - 2$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \frac{1}{2} - 2 ; g\left(\frac{1}{2}\right) = -1$$

$$f(3) = 3 \times 3 ; f(3) = 9 : f(3) \text{ حساب}$$

3] تعيين: x_1 حيث $g(x_1) = -4$

لدينا:

$$\left. \begin{aligned} g(x_1) &= 2x_1 - 2 \\ g(x_1) &= -4 \end{aligned} \right\}$$

$$2x_1 - 2 = -4$$

$$2x_1 = -4 + 2 ; 2x_1 = -2 ; x_1 = -1$$

التمرين الثالث

1] كتابة $\frac{x}{y}$ على أبسط شكل ممكن حيث:

$$\frac{x}{y} = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}}{\frac{4}{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{3}$$

التحدي في الفروض والاختبارات

2 حساب x, y علما أن:

$$x = 2y$$

$$x - y = 2 \dots\dots\dots 1$$

$$3x = 2y \quad ; \quad 3x - 2y = 0 \dots\dots\dots 2$$

لنحل الجملة:

$$\begin{cases} x - y = 2 \dots\dots\dots 1 \\ 3x - 2y = 0 \dots\dots\dots 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y = 2 \dots\dots\dots 1 \\ 3x - 2y = 0 \dots\dots\dots 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2x + 2y = -4 \dots\dots\dots 1 \\ 3x - 2y = 0 \dots\dots\dots 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2x + 2y = -4 \dots\dots\dots 1 \\ 3x - 2y = 0 \dots\dots\dots 2 \end{cases}$$

بالجمع طرفا إلى طرف المعادلة 1 و 2 نحصل على:

$$-2x + 2y + 3x - 2y = -4 + 0$$

$$x = -4$$


نعوض x بقيمته في المعادلة 1:

$$-4 - y = 2 \quad ; \quad -y = 2 + 4 \quad ; \quad -y = 6$$

$$y = -6$$

التمرين الرابع

1



التحدي في الفروض والاختبارات

(ج) حل المتراجحة:

$$15x \geq 10x + 40$$


$$15x - 10x \geq 40$$

$$5x \geq 40$$

$$x \geq \frac{40}{5}$$

$$x \geq 8$$

[3]



[4] (أ) عند استعارة 6 كتب الاقتراح الأول هو الأفضل لأن المستقيم الذي يمثل

$f(x) = 15x$ يقع تحت المستقيم الذي معادلته $g(x) = 10x + 40$

(ب) لاستعارة أكبر عدد من الكتب الاقتراح الأول هو الأفضل



الفرض الثاني

التمرين الأول

1] أبين أن C عدد طبيعي:

$$C = \sqrt{2} \times \sqrt{98} - \frac{3\sqrt{12}}{\sqrt{27}}$$

$$C = \sqrt{2 \times 98} - \frac{3 \times 2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}}$$

$$= \sqrt{196} - 2 = 14 - 2 ; C = 12$$

2] لنبين أن: $f(x) = (2x+3)(1-x)$

$$f(x) = 4x^2 - 9 - (2x+3)(3x-4)$$

تحليل العبارة $f(x)$ إلى جداء عاملين:

$$f(x) = (2x-3)(2x+3) - (2x+3)(3x-4)$$

$$= (2x+3)[(2x-3) - (3x-4)]$$

$$= (2x+3)(2x-3-3x+4)$$

$$f(x) = (2x+3)(1-x)$$

حل المعادلة: $f(x) = 0$

$$(2x+3)(1-x) = 0$$

$$\text{إما: } 2x+3=0, \quad 2x=-3, \quad x=-\frac{3}{2}$$

$$\text{أو: } 1-x=0, \quad x=1$$

للمعادلة حلان وهما 1 و $-\frac{3}{2}$



التمرين الثاني

1) الترتيب التصاعدي لهذه السلسلة:

6	<	8	<	10	<	13	<	14	<	17	
↓		↓		↓		↓		↓		↓	
3		5		6		7		5		1	
الجداء	18	40	60	91	70	17	التكرار				

2) تلاميذ هذا القسم ← 27

$$\frac{27+1}{2} = \frac{28}{2} = 14 \text{ الرتبة الوسيطة:}$$

$$\frac{10+10}{2} = \frac{20}{2} = 10 \rightarrow \text{العلامة الوسيطة}$$

$$17 - 6 = 11 \text{ حساب مدى هذه السلسلة:}$$

$$M = \frac{18 + 40 + 60 + 91 + 70 + 17}{27} = \frac{296}{27} \text{ حساب معدل القسم:}$$

$$M \approx 10,96 \approx 11$$

$$\begin{cases} 27 \rightarrow 100 \\ 19 \rightarrow x \end{cases} ; x = \frac{19 \times 100}{27} = 70,4\% \quad [6]$$

التمرين الثالث

$$SA = 10\text{cm} , OA = R = 6\text{cm}$$

1) حساب SO:

تطبيق نظرية فيثاغورث على المثلث القائم في O: SAO . لدينا:

$$SA^2 = SO^2 + OA^2$$

$$SO^2 = SA^2 - OA^2$$

$$SO^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36$$

$$SO = 8\text{cm}$$



التحدي في الفروض والاختبارات

2 حساب حجم هذا المخروط:

$$V = \frac{1}{3} \times B \times h = \frac{1}{3} \times \pi R^2 \times h$$

$$= \frac{1}{3} \times 3,14 \times 6^2 \times 8 = \frac{3,14 \times 36 \times 8}{3}$$

$$V = 301,44 \text{ cm}^3$$

3 أ) حساب معامل الصغير k:

ليكن O' منتصف [SO] بالتالي: SO' = 4

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

ب) استنتاج V₂ حجم المخروط المصغر:

$$V_2 = V \times k^3$$

$$= 301,44 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 ; V_2 = 37,68 \text{ cm}^3$$

المسألة

I 1 التسعيرة الأولى: 50x < 50DA

التسعيرة الثانية: 25x + 300 < 25DA + 300DA

$$y = 1200\text{DA} , 50x \quad 2$$

$$x = 24 , x = \frac{1200}{50} , 1200 = 50x$$

عدد الرحلات الممكنة بالتسعيرة الأولى: 24 رحلة.


1-II

	f(x)	
x	0	4
y	0	200

	g(x)	
x	0	2
y	300	350



التحدي في الفروض والاختبارات



III- السعر الأصلي لهذه الرحلة: $\frac{65}{100}x = 50$

$$65x = 5000, \quad x = \frac{5000}{65}$$

$$x = 76,92 DA$$

السعر الجديد:

$$76,92 \left(1 - \frac{5}{100}\right) = 76,92 \times 0,95$$

$$= 73,07 DA$$

$$73,07 \left(1 + \frac{5}{100}\right) = 73,07 \times 1,05$$

$$= 76,72 DA$$



الفرض الثالث



التمرين الأول

1 حل المتراجحة : $7x - 3 \geq 4x + 12$

لدينا: $7x - 3 \geq 4x + 12$ أي: $7x - 4x \geq 3 + 12$

منه: $3x \geq 15$ وبالتالي: $x \geq 5$

حلول المتراجحة هي كل الأعداد الحقيقية الأكبر من أو تساوي 5.

2 قيم x الطبيعية التي ليست حلا لهذه المتراجحة هي:

0, 1, 2, 3, 4.

التمرين الثاني

1 النشر:

$$A = (3x - 2)^2 - (x - 1)(12x - 8)$$

$$A = (9x^2 + 4 - 12x) - (12x^2 - 8x - 12x + 8)$$

$$A = 9x^2 + 4 - 12x - 12x^2 + 8x + 12x - 8$$

$$A = -3x^2 + 8x - 4$$

2 التحليل:

$$A = (3x - 2)^2 - (x - 1)(12x - 8)$$

$$A = (3x - 2)^2 - 4(x - 1)(3x - 2)$$

$$A = (3x - 2)[(3x - 2) - 4(x - 1)]$$

$$A = (3x - 2)[(3x - 2) - (4x - 4)]$$

$$A = (3x - 2)(x - 2 - 4x + 4)$$

$$A = (3x - 2)(-x + 2)$$



3 حل المعادلة:

$$A = 0 \text{ معناه: } 3x - 2 = 0 \text{ أو } -x + 2 = 0$$

$$\text{أي: } x = \frac{2}{3} \text{ أو } x = 2$$

$$\text{للمعادلة حلان هما: } \frac{2}{3} \text{ و } 2.$$

التمرين الثالث

1 إيجاد عدد رؤوس هذه الأشكال:

$$\text{عدد رؤوس 4 مثلثات هو: } 3 \times 4 = 12$$

$$\text{عدد رؤوس 6 مستطيلات هو } 4 \times 6 = 24$$

$$\text{ومنه عدد رؤوس كل الأشكال هو } 12 + 24 = 36.$$

2 إيجاد عدد المثلثات وعدد المستطيلات :

نضع x عدد المثلثات.

نضع y عدد المستطيلات.

$$\text{بما أن عدد الأشكال هو 18 فإن: } x + y = 18.$$

$$\text{وبما أن عدد الرؤوس هو 65 فإن: } 3x + 4y = 65.$$

نتحصّل على الجملة:

$$\begin{cases} x + y = 18 \dots\dots\dots 1 \\ 3x + 4y = 65 \dots\dots\dots 2 \end{cases}$$

نحل الجملة:

الحل بطريقة التعويض :

من المساواة 1 نستخرج قيمة المجهول x :

$$\text{لدينا : } 3 \dots\dots\dots x = 18 - y$$

نعوض قيمة x في المساواة 2



التحدي في الفروض والاختبارات

$$3x + 4y = 65$$

$$3(18 - y) + 4y = 65$$

$$54 - 3y + 4y = 65$$

$$54 + y = 65$$

$$y = 65 - 54$$

$$y = 11$$

نعوض قيمة y في المساواة 1

$$x = 18 - y$$

$$x = 18 - 11$$

$$x = 7$$

حل الجملة هو $(7, 11)$.

إذا عدد المثلثات هو 7 و عدد المستطيلات هو 11.

التمرين الرابع

1 في المثلث ABC لدينا:


$M \in [AC]$ و $N \in [AB]$ و $(MN) \parallel (BC)$

حسب نظرية طاليس نجد:

$$\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB} = \frac{MN}{BC} \dots\dots\dots (1)$$

ومنه : $\frac{AN}{AB} = \frac{AM}{AC}$ لكن $\frac{AM}{AC} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

ومنه : $\frac{AN}{AB} = \frac{2}{3}$



2 حساب AN:

$$\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB} \text{ من (1) نجد:}$$

$$\text{لكن } AM = 10, AC = 15, AB = 9$$

$$\frac{AN}{9} = \frac{10}{15} \text{ أي: } \frac{AN}{9} = \frac{2}{3}$$

$$\text{ومنه: } AN = \frac{18}{3} = 6 \text{ أي: } AN = 6 \text{ cm.}$$

حساب BN:

$$\text{لدينا: } BN = AB - AN$$

$$\text{ومنه: } BN = 9 - 6 = 3 \text{ أي: } BN = 3 \text{ cm.}$$

المسألة


1- إيجاد y ارتفاع القرية بالنسبة إلى المنبع.

$$y = 920 - 800 = 120$$

ومنه: ارتفاع القرية بالنسبة إلى المنبع هو: 120m.

2 حساب المسافة بين المنبع والقرية.

نمثل الوضعية بالمخطط التالي:



التحدي في الفروض والاختبارات

المثلث ABC قائم في B إذن $\sin 12^\circ = \frac{AB}{AC}$ أي: $AC = \frac{AB}{\sin 12^\circ}$

نستعمل الحاسبة نجد: $AC = 577,17m$ (قيمة مدورة إلى 10^{-2}).
إذا: المسافة بين القرية والمنبع هي $577,17m$.

3 البحث عن عدد الأنابيب اللازمة:

$$\frac{AC}{6} = \frac{577,17}{6} = 96,19$$

عدد الأنابيب اللازمة هو: 97 أنبوب.

-II

$$F(x) = 3000x \quad G(x) = 50000 + 2000x \quad [1]$$

2 اتمام الجدول:

X ب (m)	20	30	80
F(x) ب (DA)	60000	90000	240000
G(x) ب (DA)	90000	110000	210000

3 التمثيل البياني للدالة F هو المستقيم (OB) الذي معادلته:

$$y = 3000x \quad \text{بحيث: } O(0;0) \quad B(20;60000)$$


التمثيل البياني للدالة G هو المستقيم (AC) معادلته:

$$y = 2000x + 50000 \quad \text{بحيث:}$$

$$C(30;110000) \quad A(20;90000)$$



التحدي في الفروض والاختبارات



4. عدد الأنابيب اللازمة هو 97 أنبوب و من أجل هذا العدد يكون المستقيم الممثل للدالة G واقع أسفل المستقيم الممثل للدالة G إذن المقاول أحمد هو الذي سوف يفوز بالمناقصة.



الاختبار الأول



التمرين الأول

العلامات	8	9	11	12	13	14	16
التكرار	3	5	2	4	2	7	2
الجداء	24	45	22	48	26	98	32

عدد تلاميذ القسم: 25

2 حساب الوسط المتوازن.

$$M = \frac{24 + 45 + 22 + 48 + 26 + 98 + 32}{25}$$

$$M = \frac{295}{25} ; M = 11,8$$

3 العلامة الوسيطة:

$$25 + 1 = 26 , \frac{26}{2} = 13 \rightarrow \text{الرتبة الوسيطة}$$

العلامة الوسيطة هي 12

4 مدى هذه السلسلة هي: $16 - 8 = 8$

التمرين الثاني

1 نشر وتبسيط الجداء:

$$(3x+1)(x-2) = (3x \times x) - (3x \times 2) + (1 \times x) - (1 \times 2)$$

$$= 3x^2 - 6x + x - 2$$

$$(3x+1)(x-2) = 3x^2 - 5x - 2$$

2 تحليل العبارة:

$$A = (3x - 5x - 2) + 5(x - 2)$$

$$A = (3x + 1)(x - 2) + 5(x - 2)$$

$$A = (x - 2)[3x + 1 + 5] ; A = (x - 2)(3x + 6)$$

3 حل المعادلة: $A = 0$

$$(x - 2)(3x + 6) = 0 \quad A = 0 \quad \text{معناه}$$

$$x - 2 = 0 \quad \text{معناه} \quad x = +2$$

$$\text{أو } 3x + 6 = 0 \quad \text{معناه} \quad 3x = -6 \quad , \quad x = -\frac{6}{3} \quad , \quad x = -2$$

للمعادلة حلان وهما 2 و -2.

4 حل المتراجحة:

$$A > 3x^2 - x$$

$$3x^2 - 5x - 2 > 3x^2 - x$$

$$3x^2 - 5x - 3x^2 + x > 2$$

$$-4x > 2$$

$$(-1)(-4x) < 2(-1)$$

$$4x < -2 ; \quad x < -\frac{2}{4} , \quad x < -\frac{1}{2}$$


كل قيم x الأصغر تماما من $-\frac{1}{2}$ هي حلول للمتراجحة.

التمرين الثالث

$$A(1; -3); \quad B(7; 5); \quad C(-3; 0) \quad [4]$$



1



2 حساب AB :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$AB = \sqrt{(7 - 1)^2 + (5 + 3)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2}$$

$$= \sqrt{100} ; AB = 10 \text{ cm}$$

حساب BC :

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$$

$$BC = \sqrt{(-3 - 7)^2 + (0 - 5)^2} = \sqrt{(-10)^2 + (-5)^2} = \sqrt{100 + 25}$$

$$= \sqrt{125} \text{ cm}$$



حساب AC:

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2}$$

$$AC = \sqrt{(-3-1)^2 + (0+3)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (3)^2} = \sqrt{16+9}$$

$$AC = \sqrt{25} ; AC = 5 \text{ cm}$$

لنبين أن ABC قائم في A نتحقق من صحة المساواة.

$$\left. \begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 \\ BC^2 &= (\sqrt{125})^2 = 125 \\ AB^2 + AC^2 &= 10^2 + 5^2 \\ &= 100 + 25 \\ &= 125 \end{aligned} \right\}$$

$$\text{منه: } BC^2 = AB^2 + AC^2$$

أي المثلث ABC قائم في A حسب النظرية العكسية لفيتاغورث.

3] بما أن M هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC القائم في A فإنها منتصف الوتر [BC] قطر هذه الدائرة (c).

$$M\left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2}\right); \left(\frac{7-3}{2}, \frac{5+0}{2}\right); M\left(2, \frac{5}{2}\right)$$

4] D(x, y) صورة C بالانسحاب الذي شعاعه معناه $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A)$$

$$\overrightarrow{AB}(7-1; 5+3); \overrightarrow{AB}(6; 8)$$

$$\overrightarrow{CD}(x_D - x_C, y_D - y_C); (x_D + 3, y_D)$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$

$$x + 3 = 6 - 3 ; x = 3$$

$$y = 8 - 3 = 5$$

$$R = 3\text{cm} ; h = 6\text{cm} \quad [1]$$

$$V = \frac{1}{3} \times B \times h ; B = \pi R^2$$

$$= 3,14 \times 3^2$$

$$B = 3,14 \times 9 ; B = 28,26$$

$$V = \frac{1}{3} \times 28,26 \times 6 ; V = 56,52\text{cm}^3$$

حساب معامل التصغير K : [2]

$$K = \frac{AM}{AO} = \frac{2}{6} ; K = \frac{1}{3}$$

$$V' = V \times k^3 = 56,52 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3$$

$$V' = 56,52 \times \frac{1}{27} ; V' = 2,09\text{cm}^3$$

المسألة

I- القاعدة على شكل مستطيل:

$$P = (L + l) \times 2$$

$$P = (a + b) \times 2$$

$$a = 2b$$

$$36 = (2b + b) \times 2$$

$$36 = 3b \times 2$$

$$36 = 6b$$

$$b = \frac{36}{6} ; b = 6\text{m} \quad \text{العرض}$$

$$a = 2b ; a = 2 \times 6 ; a = 12\text{m} \quad \text{الطول}$$

التحدي في الفروض والاختبارات

2] حساب حجم القاعة:

حساب حجم متوازي المستطيلات : $h = 4m$

$$V = 6 \times 12 \times 4 ; V = 288m^3$$

حساب حجم نصف الأسطوانة:

$$\frac{\pi R^2}{2} = \frac{3,14 \times 9}{2} = 14,13m$$

$$V_2 = 14,13 \times 12 ; V = 169,56m^3$$

$$V' = V_1 + V_2 = 288 + 169,56$$

$$V' = 457,56m^3$$

-II

$$f(x) = 16x$$

$$g(x) = 14x + 100$$

2] تكملة الجدول:

x عدد القارورات	10	55	25
$F(x)$ بـ (DA)	160	880	400
$G(x)$ بـ (DA)	240	870	450

3] حل المعادلة:

$$16x = 14x + 100$$


$$16x - 14x = 100$$

$$2x = 100 ; x = \frac{100}{2} ; x = 50$$

عند شراء 50 قارورة يكون الثمن متساوي بالنسبة للصيغة الأولى والصيغة الثانية.

x أ.





ب) يشتري هذا المسؤول 70 قارورة (بالتقريب) حسب البيان.
ج) حل المتراجحة :

$$14x + 100 > 16x$$

$$14x - 16x > -100$$

$$-2x > -100$$

كل قيم x الأصغر تماماً من 25 هي حلول المتراجحة

بن داودي علي

الاختبار الثاني



التمرين الأول

$$546 - 462 = 84$$

$$\text{PGCD}(462, 546) = 42 \quad [1]$$

$$462 - 84 = 378$$

$$126 - 84 = 42$$

$$378 - 84 = 294$$

$$84 - 42 = 42$$

$$294 - 84 = 210$$

$$42 - 42 = 0$$

$$210 - 84 = 126$$

الكسر غير قابل للاختزال للكسر:

$$\frac{462}{546} = \frac{462 \div 42}{546 \div 42} = \frac{11}{13} \quad \text{هو} \quad \frac{462}{546}$$

[2] الكتابة العلمية للعدد B:

$$\frac{35 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^5}{21 \times 10^{-1}} = \frac{35 \times 3}{21} \times 10^{-3} \times 10^5 \times 10^1$$

$$= 5 \times 10^3$$

[3] كتابة C على شكل $a\sqrt{b}$.

$$C = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{80} + \sqrt{20}$$

$$C = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{2^2 \times 2^2 \times 5} + \sqrt{2^2 \times 5}$$

$$C = 3\sqrt{5} - 8\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$$

$$C = -3\sqrt{5}$$



التمرين الثاني

نفرض x يمثل المدور و y يمثل المنقلة.

سعر ثلاثة مداور ومنقلة هو 88DA معناه:

$$3x + y = 88$$

سعر خمسة مداور وثلاث منقلات هو 164DA معناه:

$$5x + 3y = 164$$

إيجاد سعر المدور وسعر المنقلة نحل جملة معادلتين:

$$\begin{cases} 3x + y = 88 \\ 5x + 3y = 164 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + y = 88 \\ 5x + 3y = 164 \end{cases}$$

بضرب طرفا المعادلة (1) في العدد 3:

$$\begin{cases} 3x + y = 88 \dots\dots\dots (1) \\ 5x + 3y = 164 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + y = 88 \dots\dots\dots (1) \\ 5x + 3y = 164 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -9x - 3y = -264 \\ 5x + 3y = 164 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -9x - 3y = -264 \\ 5x + 3y = 164 \end{cases}$$

يجمع طرفا المعادلتين طرف لطرف:

$$-9x + 5x - 3y + 3y = -264 + 164$$

$$-4x = -100$$

$$x = 25$$

بتعويض x قيمة في المعادلة (1):

$$3 \times 25 + y = 88$$

$$75 + y = 88$$

$$y = 88 - 75$$

$$y = 13$$

ومنه سعر المدور هو 25DA.

سعر المنقلة هو 13DA.



التمرين الثالث

العلامات	7	8	10	12	13	15
التكرارات	2	6	3	5	3	1
التكرار المجمع الصاعد	2	8	11	16	19	20

حساب الوسط الحسابي المتوازن:

$$M = \frac{2 \times 7 + 8 \times 6 + 10 \times 3 + 12 \times 5 + 13 \times 3 + 15 \times 1}{20}$$

$$M = \frac{206}{20} \quad M = 10,3$$

حساب الوسيط:

$$N = 20$$

$$P \times 20 = 2$$

$$15 \times 20 = 2$$


منه الوسيط هو الرتبة: 10 و 1 + 10

$$\frac{10 + 10}{2} = \frac{20}{2} = 10 \quad \text{إذن :}$$

$$\text{المدى : } 15 - 8 = 7.$$



التمرين الرابع



حساب $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2-4 \\ 1-3 \end{pmatrix}$$

$$AB = \sqrt{(-6)^2 + (-2)^2}$$

$$AB = \sqrt{36 + 4}$$

$$AB = \sqrt{40} \text{ cm}$$

حساب $\overrightarrow{BC}$:

$$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1+2 \\ -2-1 \end{pmatrix}$$

$$BC = \sqrt{1^2 + (-3)^2}$$

$$BC = \sqrt{10} \text{ cm}$$

حساب AC:

$$\overline{AC} \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \end{pmatrix} \quad \overline{AC} \begin{pmatrix} -1-4 \\ -2-3 \end{pmatrix}$$

$$AC = \sqrt{25 + 25}$$

$$AC = \sqrt{50} \text{ cm}$$

نبين أن المثلث قائم: حسب النظرية العكسية لفيثاغورس لدينا:

$$BA^2 + BC^2 = \sqrt{40^2} + \sqrt{10^2}$$

$$BA^2 + BC^2 = 40 + 10 \\ = 50$$

$$AC^2 = \sqrt{50^2} = 50 \quad \text{منه:} \\ BA^2 + BC^2 = AC^2$$

محققة فالمثلث قائم في B.

بما أن: $\overline{BA} = \overline{CD}$ معناه $BA = CD$ و $(BA) \parallel (CD)$
فالرباعي ABCD متوازي الأضلاع ولدينا B قائمة.
فالرباعي ABCD مستطيل.

المسألة

الجزء الأول

1] عند مشاهدة 12 مسرحية بالخيار الأول:

$$400 \times 12 = 4800 \text{ DA}$$

عند مشاهدة 12 مسرحية بالخيار الثاني:

$$150 \times 12 + 2500 = 4300 \text{ DA}$$

ومنه لمشاهدة 12 مسرحية أفضل خيار هو الثاني.

التحدي في الفروض والاختبارات

2] عند مشاهدة 5 مسرحيات بالخيار الأول:

$$400 \times 5 = 2000 \text{ DA}$$

عند مشاهدة 5 مسرحيات بالخيار الثاني:

$$150 \times 5 + 2500 = 3250 \text{ DA}$$

عند مشاهدة 5 مسرحيات الخيار الأفضل هو الأول.

$$y_1 = 400x \quad y_2 = 150x + 2500 \quad [3]$$

الجزء الثاني

4] حل المتراجحة:

$$400x < 150x + 2500$$

$$400x - 150 < 2500$$

$$250x < 2500$$

$$x < 10$$

معناه عندما نشاهد 10 مسرحيات بالخيار الأفضل هو الخيار الأول.


5] التمثيل البياني لـ (d) و (d'):

x	0	1
f(x)	0	400

x	0	2
g(x)	2500	2800



التحدي في الفروض والاختبارات



قيم x الأصغر تماماً من 25 هي حلول المعادلة



الاختبار الثالث

التمرين الأول

1

$$A = \sqrt{500} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{20}$$

$$= 10\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 3 \times 2\sqrt{5} = (10 - 2 + 6)\sqrt{5} = 14\sqrt{5}$$

2

$$B = \left(-\frac{1}{8}\right) \times \left(\frac{3}{2}\right) \times \left(-\frac{4}{15}\right) = \frac{-3}{16} \times \left(-\frac{4}{15}\right) = \frac{1}{20}$$

$$C = \left(\frac{4}{15} - 1\right) \div \frac{7}{30} = \left(\frac{4}{15} - \frac{15}{15}\right) \times \frac{30}{7} = \left(-\frac{11}{15}\right) \times \frac{30}{7} = \frac{-22}{7}$$

التمرين الثاني

1 التحليل:

$$A = (2x + 3)^2 - [(2x + 3)(x - 7)]$$

$$A = (2x + 3)[(2x + 3) - (x - 7)]$$

$$A = (2x + 3)(2x + 3 - x + 7) = (2x + 3)(x + 10)$$

2 النشر:

$$A = (2x + 3)^2 - (2x + 3)(x - 7)$$

$$= (4x^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2) - (2x^2 - 14x + 3x - 21)$$

$$= 4x^2 + 12x + 9 - 2x^2 + 14x - 3x + 21$$

$$= 2x^2 + 23x + 30$$

3 حل المعادلة:

$$(2x+3)(x+10)=0$$

$$2x+3=0 \quad x+10$$

$$x = \frac{-3}{2}$$

$$x = -10$$

للمعادلة حلان هما: -10 و $\frac{-3}{2}$

التمرين الثالث

1 الجدول:


الطول p (m)	$5 \leq p < 7$	$7 \leq p < 9$	$9 \leq p < 11$	$11 \leq p < 13$
التكرار	6	10	9	5
مركز الفئات	$\frac{5+7}{2} = 6$	$\frac{7+9}{2} = 8$	$\frac{9+11}{2} = 10$	$\frac{11+13}{2} = 12$

2 متوسط طول الرمية في القسم هي:

$$M = \frac{6 \times 6 + 8 \times 10 + 10 \times 9 + 12 \times 5}{30} = \frac{266}{30} = 8,86$$


3 التكرارات بمخطط الأعمدة:

التكرار



الطول





$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 - (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(3+3)^2 + (-4+2)^2}$$

$$= \sqrt{(6)^2 + (-2)^2} = \sqrt{36+4} = \sqrt{40}$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 - (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(6+3)^2 + (5+2)^2}$$

$$= \sqrt{(9)^2 + (7)^2} = \sqrt{81+49} = \sqrt{130}$$

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 - (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(6-3)^2 + (5+4)^2}$$

$$= \sqrt{(3)^2 + (9)^2} = \sqrt{9+81} = \sqrt{90}$$



التحدي في الفروض والاختبارات

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 \text{ أي } (\sqrt{130})^2 = (\sqrt{40})^2 + (\sqrt{90})^2$$

$$130 = 40 + 90 \quad \text{أي} \quad 130 = 130$$

[3]

حسب عكس نظرية فيثاغورث يكون المثلث ABC قائم في B.

M منتصف AC [4]

$$M\left(\frac{x_A + x_C}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$$

$$M\left(\frac{(-3) + (6)}{2}; \frac{(-2) + (5)}{2}\right), \quad M\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$$

الوضعية الإدماجية

[1] ثمن دخول 25 تلميذ هو:

$$50(25) = 12500 \text{ DA}$$

التسعيرة الأولى:

$$20(25) + 300 = 500 + 300 = 800 \text{ DA}$$

التسعيرة الثانية:

ثمن دخول 50 تلميذ هو:

$$50(50) = 2500 \text{ DA}$$

التسعيرة الأولى:

$$20(50) + 300 = 1000 + 300 = 1300 \text{ DA}$$

التسعيرة الثانية:

[2] التعبير بدلالة x :

$$P_1(x) = 50x \text{ و } P_2(x) = 20x + 300$$

[2] التسعيرة الأولى هي:

$$50x = 1500 \quad x = \frac{1500}{50}$$



التحدي في الفروض والاختبارات

التسعيرة الثانية هي

$$20x + 300 = 1500$$


$$20x = 1500 - 300, 20x = 1200 \quad x = \frac{1200}{20}$$

$$x = 60$$

$$(\Delta_1): P_1(x) = 50x \quad (\Delta_2): P_2(x) = 20x + 300 \quad [4]$$

x	0	2
$P_1(x)$	0	100

x	0	5
$P_2(x)$	300	400



(i)

$$P_1(x) = P_2(x)$$

$$50x = 20x + 300$$

$$50x - 20x = 300$$

$$30x = 300$$

$$x = \frac{300}{30}$$

من أجل $x = 10$ تكون .

(ب) تكون التسعيرة الثانية أفضل من التسعيرة الأولى بعد 10 تلاميذ.