

الميسر في الرياضيات

4AM

دروس ملخصة

200

تمارين محلولة بالتفصيل

التواتية

وفق المنهاج / المعرفة
حداث / الإدارة التربوية الوطنية
سعيدة

El Monamira
El Mouyasser



الملكية

الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة

Les entiers Naturels et Les Entiers Relatifs

(1) قاسم عدد طبيعي

a و b عدنان طبيعيان حيث $b \neq 0$ ، يكون العدد b قاسما للعدد a إذا كان باقي القسمة الإقليدية للعدد a على b معدوما.

مثال: 7 قاسم للعدد 56 لأن $56 = 7 \times 8 + 0$

نتيجة: يكون عدد طبيعي b قاسما للعدد a إذا وجد العدد c حيث $a = b \times c$

(2) خواص قواسم عدد طبيعي

خاصية 1: a, b, c أعداد طبيعية غير معدومة ، إذا كان c يقسم كلا من a و b فإن c يقسم كلا من $(a+b)$ و $(a-b)$.

مثال: $\left\{ \begin{array}{l} 5 \text{ قاسم } 50 \\ 5 \text{ قاسم } 20 \end{array} \right.$ أي 5 قاسم لـ $(50+20)$ و 5 قاسم لـ $(50-20)$

خاصية 2: a, b, c أعداد طبيعية غير معدومة ، إذا كان c يقسم كلا من a و b فإن c يقسم باقي القسمة الإقليدية لـ a على b .

مثال: $\left\{ \begin{array}{l} 6 \text{ قاسم } 24 \\ 6 \text{ قاسم } 60 \end{array} \right.$ أي 6 قاسم لباقي $(60+24)$ و 6 قاسم لباقي 12

1 قاسم لكل عدد طبيعي

ملاحظة:

(3) إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين طبيعيين:

القاسم المشترك لعددين طبيعيين a و b هو عدد طبيعي يقسم كلا منهما.

الصفحة	الموضوع
05	الأعداد الطبيعية و الأعداد الناطقة
11	الحسابات على الجذور
17	الحساب الحر
23	المعادلات من الدرجة الأولى والثانية لمجهول واحد
30	المترجمات
36	الدوال
44	جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين
49	الإحصاء
57	نظرية طاليس
64	النسب المثلثية في مثلث قائم
72	الأشعة والإنسحاب
79	المعالم
87	الدوران - الزوايا - المضلعات المنتظمة
95	الهندسة في الفضاء
106	بعض قوانين الهندسة
110	موضوع شهادة التعليم المتوسط
113	حلول التمارين

أكبر قاسم مشترك لهذين العددين يسمى القاسم المشترك الأكبر لهما.
ونكتب $PGCD(a;b)$.

مثال: لإيجاد $PGCD(30;45)$ نتبع إحدى الطريقتين الآتيتين:

الطريقة الأولى :

قواسم 30 هي : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

قواسم 45 هي : 1, 3, 5, 9, 15, 45.

$$PGCD(30;45) = 15$$

الطريقة الثانية : " خوارزمية إقليدس "

(أ) حساب الفروق المتتالية

$$45 - 30 = 15$$

$$30 - 15 = 15$$

$$15 - 15 = 0$$

نتوقف هنا لأن الفرق
يساوي 0

$$PGCD(30;45) = 15 \text{ ومنه}$$

(ب) القسمة الاقليدية

$$45 = 30 \times 1 + 15$$

$$30 = 15 \times 2 + 0$$

نتوقف هنا لأن الباقي
يساوي 0

$$PGCD(30;45) = 15 \text{ ومنه}$$

(4) العددان الأوليان فيما بينهما

تذكرة: العدد الأولي هو العدد الذي يقبل القسمة على نفسه وعلى 1 فقط

مثال :

a, b عدنان طبيعيين ، نقول أن a و b أوليان فيما بينهما

إذا كان $PGCD(a;b) = 1$.

مثال: العددان 16 و 27 أوليان فيما بينهما لأن $PGCD(16;27) = 1$

(5) الكسر الغير قابل للاختزال

a, b عدنان طبيعيين حيث $b \neq 0$.

الكسر $\frac{a}{b}$ غير قابل للاختزال معناه a و b أوليان فيما بينهما.

مثال: الكسر $\frac{18}{25}$ غير قابل للاختزال لأن 18, 25 أوليان فيما بينهما لأن:

$$PGCD(18;25) = 1$$

تمارين السلسلة الأولى

التمرين الأول

احسب العبارتين A و B ثم اختزل الناتج حيث:

$$A = \frac{1}{5} - \frac{3}{10} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \quad / \quad B = \frac{\frac{1}{2} + \frac{7}{4}}{\frac{2}{5} - \frac{12}{4}} \quad / \quad B = \frac{\frac{1}{2} + \frac{7}{4}}{\frac{2}{5} - \frac{12}{4}}$$

التمرين الثاني

(I) أوجد الكتابة العلمية لكل من A ، B ، C حيث:

$$A = 3 \times 10^4 + 2 \times 10^3 - 5 \times 10^{-1}$$

$$B = 3 \times 10^4 \times 2 \times 10^3 + (5 \times 10^{-1})$$

$$C = \frac{4 \times 10^5 - 2 \times 10^3}{5 \times 10^{-1}}$$

(II) دقائق قلب الإنسان هي حوالي 5000 دقيقة في الساعة.

(1) اكتب العدد 5000 على شكل كتابة علمية.

(2) احسب عدد دقائق قلب إنسان لمدة 80 سنة (سنة = 365 يوم).

(3) أعط المدة بكتابة علمية.

التمرين الثالث

أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين a و b في كل حالة:

$$b = 1234 \quad \text{و} \quad a = 7404$$

$$b = 140 \quad \text{و} \quad a = 315$$

التمرين الرابع

أوجد كسرا غير قابل للاختزال لكل من الكسور التالية باستعمال خوارزمية

إقليدس.

$$\frac{-343}{-4263} \quad \text{و} \quad \frac{2484}{1872}$$

التمرين الخامس

بين أن العددين a و b أوليان فيما بينهما في كل مما يلي:

$$b = 1789 \quad \text{و} \quad a = 1968 \quad | \quad b = 1793 \quad \text{و} \quad a = 987$$

التمرين السادس

اكتب كل من A ، B ، C ، D على شكل كسر غير قابل للاختزال حيث:

$$D = 300 \times 10^{-3} - 8 \times 10^2, \quad C = \frac{10-5}{10+5}, \quad B = \frac{3^{48}}{3^{52}}, \quad A = 0,15$$

التمرين السابع

احسب A من أجل $n = 100$ ثم بين أن A كسر غير قابل للاختزال. $A = \frac{6n-2}{14n-5}$

التمرين الثامن

(1) برهن أن كلا من 6 و $n+2$ حيث n عدد طبيعي) قاسم $6n+12$.

(2) برهن أن $5n^2 + 15n^2$ مضاعف لكل من 5 و $n+3$ و n^2

التمرين التاسع

لدى مؤسسة حديد قطع حديدية طول كل قطعة 110cm و عرضها 88cm .

طلب من أحد عمالها أن يقسم كل قطعة إلى مربعات متطابقة بأكبر مساحة ممكن.

(1) احسب طول ضلع كل قطعة مربعة.

(2) ما هو عدد المربعات في كل قطعة ؟

التمرين العاشر

اشترى بائع أزهار 5815 وردة (roses) و 3489 خزامى (tulipes).

أراد أن يشكل أكبر عدد ممكن من باقات متشابهة باستعمال كل الأزهار.

(1) ما هو أكبر عدد ممكن من الباقات التي يستطيع تشكيلها ؟

(2) ما هو عدد الورد في كل باقة ؟

(3) ما هو عدد الخزامى في كل باقة ؟

(4) ما هو ثمن كل باقة إذا باع كل وردة 20DA و كل خزامى 15DA ؟

الحسابات على الجذور

Calculs sur les racines

مربع عدد

لكل عدد a مربع وهو a^2 أي $a^2 = a \times a$.

أمثلة: مربع 6 هو 36 ونكتب $6^2 = 36$

مربع -7,2 هو +51,84 ونكتب $(-7,2)^2 = +51,84$

مربع $-\frac{3}{5}$ هو $+\frac{9}{25}$ ونكتب $(-\frac{3}{5})^2 = +\frac{9}{25}$

الجذر التربيعي لعدد

من أجل كل عدد موجب a يوجد عدد موجب وهو $\sqrt{a}$ حيث $\sqrt{a^2} = a$

مثال:

الجذر التربيعي للعدد الموجب 81 هو العدد الموجب 9 ونكتب $\sqrt{81} = \sqrt{9^2} = 9$

ملاحظة:

إذا كان a مربعاً تاماً فإن $\sqrt{a}$ عدد ناطق.

إذا كان a ليس مربعاً تاماً فإن $\sqrt{a}$ ليس عدداً ناطقاً.

مثال:

$\sqrt{25}$ عدد ناطق لأن 25 مربع تام.

$\sqrt{5}$ ليس عدداً ناطقاً لأن 5 ليس مربعاً تاماً.

العدد الحقيقي

العدد الحقيقي هو عدد إما ناطقاً وإما غير ناطق.

أمثلة:

كل من الأعداد π ، $-0,31$ ، $-\sqrt{7}$ ، $\sqrt{36}$ ، $\sqrt{3}$ ، $-\frac{5}{4}$ ، -2 ، 0 ، 3

هي عبارة عن أعداد ناطقة.

التمرين الحادي عشر

في كل من الحالات الآتية بين أن y قاسم لـ x :

$$y = 10^2 \times 3^2 \times 8^3 \quad / \quad x = 10^2 \times 3^3 \times 8^4 \quad (1)$$

$$y = 2^3 \times 11 \times 7^2 \quad / \quad x = 2^4 \times 11^2 \times 7^4 \times 5 \quad (2)$$

التمرين الثاني عشر

احسب مايلي:

$$B = \frac{7}{3} + \frac{2}{6} \times \frac{1}{5} \quad / \quad A = \frac{1}{\frac{2}{5} + \frac{4}{9}}$$

التمرين الثالث العاشر

أوجد عددين طبيعيين جداً وهما 1617، والقاسم المشترك الأكبر لهما

يساوي 7 (اذكر جميع الحلول)

التمرين الرابع عشر

أجر الحسابات الآتية دون استعمال الآلة الحاسبة:

$$A = 4,2 \times 10^{-3} + 7,8 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-2}$$

$$B = \frac{3 \times 10^{-2}}{1,5 \times 10^{-4}} - 2 \times 10^3$$

حصر عدد غير ناطق:

أمثلة:

$$\begin{array}{l} 5 < \sqrt{29} < 6 \quad \text{أي} \quad \sqrt{25} < \sqrt{29} < \sqrt{36} \\ 3 < \sqrt{15} < 4 \quad \text{أي} \quad \sqrt{9} < \sqrt{15} < \sqrt{16} \end{array}$$

حل المعادلات من الشكل $x^2 = a$

حل المعادلة $x^2 = a$ هو:

إذا كان a موجبا فإن للمعادلة حلين متعاكسين هما $\sqrt{a}$ و $-\sqrt{a}$.

إذا كان a معدوما فإن للمعادلة حل واحد وهو 0.

إذا كان a سالبا فإن المعادلة ليس لها حل.

أمثلة:

حلا المعادلة $x^2 = 64$ هما $\sqrt{64} = 8$ و $-\sqrt{64} = -8$.

حل المعادلة $x^2 = 0$ هو 0.

المعادلة $x^2 = -4$ ليس لها حل.

الحسابات على الجذور

1/ a و b عدنان حقيقيان موجبين حيث $b \neq 0$.

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$$

$$\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a-b} \quad (a \geq b)$$

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$$

2/ جعل مقام نسبة عدد ناطق

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a \times \sqrt{b}}{\sqrt{b} \times \sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{b^2}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{5^2}} = \frac{3\sqrt{5}}{5} \quad \text{مثال:}$$

تمارين المسئلة الثانية

التمرين الاول

انقل ثم أتمم ما يلي:

$$\sqrt{3 \times \dots \times 5} = \sqrt{15} \quad / \quad \sqrt{3 \times \dots} = 6 \quad / \quad \sqrt{121 + \dots} = 12$$

$$\sqrt{1000 - 3 \times \dots} = 25 \quad / \quad \sqrt{1296 + 2304} = \dots$$

التمرين الثاني

من بين الأعداد الآتية عين المربعات التامة

$$b = 2^3 \times 3 \times 6 \times 18 \quad / \quad a = 2^3 \times 3 \times 6$$

$$d = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 75 \quad / \quad c = 5 \times 3 \times 2^2 \times 15$$

التمرين الثالث

هل العدنان A و B متساويين في كل من الحالتين الآتيتين ؟ علل.

$$B = 12\sqrt{10} \quad \text{و} \quad A = 10\sqrt{12}$$

$$B = 2\sqrt{300} \quad \text{و} \quad A = 10\sqrt{12}$$

التمرين الرابع

انقل ثم أتمم ما يلي:

$$\text{إذا كان } 1 \leq a \leq 10 \quad \text{فإن} \quad \dots \leq a^2 \leq \dots$$


التمرين العاشر

بين أن $A \times B = 1$ من أجل: $B = \sqrt{17+12\sqrt{2}}$ و $A = \sqrt{17-12\sqrt{2}}$

التمرين الحادي عشر

لديك الشكل الآتي:

احسب مساحة المثلث ABC



التمرين الثاني عشر

اكتب العبارات الآتية على شكل $a\sqrt{b}$:

$$B = \sqrt{\frac{7}{3}} + 3\sqrt{\frac{28}{27}} - 4\sqrt{\frac{63}{75}} \quad / \quad A = \sqrt{28} - \frac{1}{2}\sqrt{63} - \frac{3}{4}\sqrt{7}$$

التمرين الثالث عشر

A و B عدنان حقيقيان حيث:

$$B = \sqrt{162} - \sqrt{72} + \sqrt{18} \quad / \quad A = \sqrt{98} + \sqrt{32} - \sqrt{8}$$

(1) بسط كلا من A و B .

(2) عين القيمة المبسطة لكل من:

$$\frac{2AB}{A+B} \quad / \quad \sqrt{A \times B} \quad / \quad \frac{B+A}{2}$$

إذا كان $10^2 \leq b \leq 10^3$ فإن $..... \leq b^2 \leq$

إذا كان $4 \leq c \leq 9$ فإن $..... \leq \sqrt{c} \leq$

إذا كان $16 \leq d \leq 18$ فإن $..... \leq \sqrt{d} \leq$

التمرين الخامس

احسب الأعداد الآتية باستعمال قوة للعدد 10

$$/ c = \sqrt{0.0121} \quad / \quad b = \sqrt{81 \times 10^2} \quad / \quad a = \sqrt{250000}$$

$$e = \sqrt{3.6 \times 10^{-3}} \quad / \quad d = \sqrt{0.01}$$

التمرين السادس

بسط الأعداد الآتية

$$C = \frac{\sqrt{490 \times 10^3}}{\sqrt{3 \times 10^2} \times \sqrt{12 \times 10^4}} \quad / \quad B = \frac{\sqrt{2^5 \times 3^4}}{\sqrt{2^3 \times 3^6}} \quad / \quad A = \frac{\sqrt{8 \times 3}}{\sqrt{27 \times 50}}$$

التمرين السابع

مستطيل طوله ضعف عرضه حيث مساحته 16562 cm^2 .

احسب أبعاده.

التمرين الثامن

حل المعادلات الآتية:

$$-2x^2 = 0 \quad / \quad \sqrt{u^2} - 4 = 2 \quad / \quad x\sqrt{2} - 3 = 2x\sqrt{2} + 1 \quad / \quad 2x - \sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

$$b^2 + \sqrt{275} = 5\sqrt{11} + 9 \quad / \quad x^2 - 8 = 8 \quad / \quad -3x^2 + 12 = 6 \quad / \quad \sqrt{b} = \frac{2}{3}$$

التمرين التاسع

$$\text{احسب } A+B-C \text{ حيث: } A = \frac{3}{\sqrt{2}} \quad / \quad B = \frac{-2}{5\sqrt{2}} \quad / \quad C = \frac{1}{\sqrt{2}-1}$$

الحساب الحرفي

Écritures littérales

(1) النشر

النشر هو الانتقال من جداء عاملين أو أكثر إلى مجموع جبري .

مثال 1:

انشر الجداء الآتي حيث x و y عدنان حقيقيان

$$3x(2x - 5y + 7) = +(3x \times 2x) - (3x \times 5y) + (3x \times 7)$$

$$= +6x^2 - 15xy + 21x$$

مثال 2:

انشر ثم بسط الجداء الآتي حيث x و y عدنان حقيقيان

$$(5x + 2)(3x - 4) = 5x(3x - 4) + 2(3x - 4)$$

$$= 15x^2 - 20x + 6x - 8$$

$$= 15x^2 - 14x - 8$$

المتطابقات الشهيرة (الجداءات الشهيرة)

a و b عدنان حقيقيان

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

أمثلة:

انشر الجداءات الآتية حيث x و y عددين حقيقيين

$$(7x + 2)^2 = (7x)^2 + 2 \times 7x \times 2 + 2^2 = 49x^2 + 28x + 4$$

التمرين الرابع عشر

حل المعادلات الآتية حيث a هو المجهول:

$$(5a + 7)^2 = 64 \quad / \quad 4a^2 - 69 = 75 \quad / \quad a^2 + 100 = 0$$

التمرين الخامس عشر

$ABCD$ مربع طول ضلعه $a(\text{cm})$.

إذا طرحنا من طول ضلعه 7cm نحصل على مربع مساحته 289cm^2 .

احسب طول ضلع المربع $ABCD$.

تمارين السلسلة الثالثة

التمرين الأول

انشر ثم بسط العبارات الآتية

$$\begin{aligned} A &= 3x(5-4x) - 3 - 4x(7x-3) / B = (x+y)(3x+2xy-1) \\ C &= (x^2+3)(x^2-9) / D = (x+3)^2 + 2(3x-1)(x+1) \\ E &= 7(x^2-2)(x+2) + x^2(2x-1) / F = \left(\frac{2}{3}x-1\right)\left(\frac{3}{2}x+1\right) + \left(x-\frac{5}{6}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

التمرين الثاني

انشر ما يلي:

$$\begin{aligned} &(\sqrt{2}x-5)^2 / (9x-3)^2 / (3+1.5x)^2 / (x+8)^3 \\ &\left(\frac{5}{4}x+\frac{2}{3}\right)\left(1.25x-\frac{2}{3}\right) / (\sqrt{7}x-2)(\sqrt{7}x+2) / \left(\frac{2}{3}x-1\right)^2 \end{aligned}$$

التمرين الثالث

احسب الأعداد الآتية باستعمال المتطابقات الشهيرة:

$$99 \times 101 / 398^2 / 79^2 / 71^2$$

التمرين الرابع

حلل المجاميع الجبرية الآتية إلى جداء عاملين حيث x و y عددين حقيقيين

$$\begin{aligned} D &= (3x+1)^2 + 2(3x+1) / C = x^2 + x(x-4) / A = 7x^3 + 14x^2 + 21x \\ B &= (3x-1)(x-2) + (3x-1)(2x+5) - (3x-1)(x-4) \\ G &= 49x^2 - 14x + 1 / F = \frac{4}{25}x^2 + \frac{3}{5}x + \frac{9}{16} / E = 16x^2 + 32x + 16 \\ K &= 100x^2 - 7 / J = \frac{25}{4}x^2 - x + \frac{1}{25} / I = (x+1)^2 - 9 / H = 64x^2 - 169 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\sqrt{3}x-1)^2 &= (\sqrt{3}x)^2 - 2 \times \sqrt{3}x \times 1 + 1^2 = 3x^2 - 2\sqrt{3}x + 1 \\ (9x+10)(9x-10) &= (9x)^2 - 10^2 = 81x^2 - 100 \end{aligned}$$

(2) التحليل

التحليل هو الانتقال من مجموع جبري إلى جداء عاملين أو أكثر.

مثال 1:

حلل المجموع الجبري الآتي إلى جداء عاملين حيث x و y عددين حقيقيين

$$\begin{aligned} 16x^2 - 8x + 24 &= 8 \times 2x^2 - 8 \times x + 8 \times 3 \\ &= 8(2x^2 - x + 3) \end{aligned}$$

مثال 2:

حلل المجموع الجبري الآتي إلى جداء عاملين حيث x و y عددين حقيقيين

$$\begin{aligned} (2x-1)(5x+7) - (2x-1)(x-8) &= (2x-1)[(5x+7)-(x-8)] \\ &= (2x-1)[5x+7-x+8] \\ &= (2x-1)(4x+15) \end{aligned}$$

مثال 3:

حلل المجموع الجبري الآتي إلى جداء عاملين حيث x عدد حقيقي

$$\begin{aligned} 36x^2 - 84x + 49 &= (6x)^2 - 2 \times 6x \times 7 + 7^2 \\ &= (6x-7)^2 \end{aligned}$$


التمرين الخامس

لديك المثلث ABC حيث (AM) المتوسط، (AH) الارتفاع، و M نقطة من

$[BH]$ حيث $BM = CM = 3cm$ و $AH = 2cm$ و $MH = x$

(1) عبر عن كل من AB^2 ، AC^2 و AM^2 بدلالة x ثم احسب BC^2 .

(2) بين أن $AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + \frac{1}{2}BC^2$



التمرين السادس

ABC مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي A حيث $AB = a$ و $BC = b$

(AH) الارتفاع المتعلق بالقاعدة $[BC]$ حيث $AH = h$.

(1) بين أن $h^2 = a^2 - \frac{b^2}{4}$

(2) حلل العبارة h^2 .

(3) احسب قيمة h^2 من أجل $a = 9$ و $b = 4$ ثم استنتج الدور إلى $\frac{1}{10}h$.

التمرين السابع

(I) لديك العبارتين A و B حيث $A = (x-1)^2 - (x-2)(x-3) + 5$

$B = (x-10)(x+9) - (2x-20) - (x^2 - 100)$

(1) انشر ثم بسط العبارة A . حلل العبارة B .


(II) الشكل الذي أمامك يمثل مستطيلين $MNPQ$ و $NRSP$ حيث $MN = x$

$MQ = 3$ و $MR = 10$ (الوحدة هي cm).

لتكن A مساحة المستطيل $MNPQ$ و B مساحة المستطيل $NRSP$.

(1) اكتب كلا من A و B بدلالة x .

(2) أوجد x حيث $A = B$.



التمرين الثامن

انشر ثم بسط العبارة A حيث: $A = (7x+2)(9x-5)$

حلل العبارة B حيث $B = 63x^2 - 17x - 10 - \left(\frac{2}{3}x + 4\right)(2 + 7x)$

التمرين التاسع

انشر ثم بسط ما يلي:

$$\begin{aligned} & (\sqrt{10} - \sqrt{11})(\sqrt{10} + \sqrt{11}) / (\sqrt{7} - \sqrt{3})^2 / (\sqrt{5} + 2)^3 \\ & \left(\frac{5}{2}\sqrt{2} - 1,2\right)^2 / (2\sqrt{8} - 1)(2\sqrt{8} + 1) \end{aligned}$$

التمرين العاشر

$ABCD$ مربع طول ضلعه $10cm$.

I, K, J, L نقط من $[AB], [BC], [CD], [AD]$ على الترتيب

حيث $AI = BJ = CK = DL = x(cm)$

(1) عبر عن كل من IB, JC, KD, AL بدلالة x .

(2) برهن أن $IJKL$ مربع.

(3) عبر عن مساحة المربع $IJKL$ بدلالة x .

المعادلات من الدرجة الأولى والثانية لمجهول واحد

Équations du 1^{er} et du 2^{ème} degré à une inconnue

مفهوم المعادلة

المعادلة هي تساوي بين طرفين أدخلنا على أحدهما أو كلاهما عدد مجهول يمثل

بالحرف مثلا x .

مثال 1: $6x - 5 = 9$ **مثال 2:** $7x - 3 = 9x + 1$

حل معادلة

حل معادلة هو إيجاد قيمة المجهول x التي تحقق المساواة

مثال 1: حل المعادلة $6x - 5 = 9$

(أ) نضع المجهول في طرف والمعايير في الطرف الثاني

$$6x = 9 + 5$$

ننقل عدد أو مجهول من طرف إلى آخر

لأننا نغير الإشارة

(ب) نبسط كل طرف

$$6x = 14$$

(ج) نجد قيمة x بقسمة 14 على 6 ونحصل على $x = \frac{14}{6}$

ونقول أن حل المعادلة $6x - 5 = 9$ هو $x = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$

مثال 2: حل المعادلة $7x - 3 = 9x + 1$

$$7x - 9x = 1 + 3$$

$$-2x = 4$$

$$x = -2 \text{ أو } x = \frac{4}{-2}$$

حل المعادلة $7x - 3 = 9x + 1$ هو $x = -2$

التمرين الحادي عشر

انشر ثم بسط العبارات الآتية:

$$(7x + 5)(x - 2) - (8x + 9)(3x + 1)$$

$$\left(10x + \frac{2}{3}\right)^2 - \left(x + \frac{1}{3}\right)(x - 1)$$

$$3x(6x + 1) - \left(7x - \frac{1}{2}\right)^2$$

$$(\sqrt{5}x - 1)^2 - (2\sqrt{5}x + 3)^2$$

التمرين الثاني عشر

حلل العبارات الآتية:

$$(7x - 1)(2x + 3) - (2x + 3)^2$$

$$(10x + 15)(x - 11) + (4x^2 - 9)$$

$$(\sqrt{2}x + 1)^2 - (3\sqrt{2}x - 5)^2$$

التمرين الثالث عشر

احسب مايلي باستعمال المتطابقات الشهيرة:

$$105^2 - 95^2 \quad / \quad 795^2 + 2 \times 795 \times 5 + 25$$

التمرين الرابع عشر

$$A = (x + y)^2 - (x - y)^2$$

(1) حلل العبارة A إلى جداء عاملين.

(2) احسب A من أجل $xy = 8$.

التحقيق: $7 \times (-2) - 3 = 9(-2) + 1$

$$-14 - 3 = -18 + 1$$

$$-17 = -17 \text{ ومنه } -14 - 3 = -18 + 1$$

بصفة عامة :

حل المعادلة $ax = b$ هو $x = \frac{b}{a}$ مع $(a \neq 0)$

حل المعادلة $ax + b = cx + d$ هو $x = \frac{d-b}{a-c}$ مع $(a \neq c)$

الجداء المعلوم

نسمي $a \times b = 0$ جداء معلوم

يكون $a \times b = 0$ إذا كان $a = 0$ أو $b = 0$ أو $a = 0$ و $b = 0$ معا

مثال:

$$\left. \begin{array}{l} 2x+3=0 \text{ أي } x=-\frac{3}{2} \\ \text{أو} \\ 3x+1=0 \text{ أي } x=-\frac{1}{3} \end{array} \right\} (2x+3)(3x+1)=0 \text{ إذا كان}$$

للمعادلة $(2x+3)(3x+1)=0$ حلين هما $x=-\frac{3}{2}$ أو $x=-\frac{1}{3}$

تربيض مسألة

تربيض مسألة هو تحويلها من الأسلوب اللغوي إلى الأسلوب الرياضي .

مثال: تحتوي مكتبة على 1250 كتاب حيث أن عدد الكتب العلمية فيها هو

ضعف عدد الكتب الأدبية، ويزيد عدد الكتب الثقافية عن عدد الكتب الأدبية

بـ 50 كتابا، أوجد عدد كل صنف .

(1) اختيار المجهول نرسم لعدد الكتب الأدبية x

نرسم لعدد الكتب العلمية $2x$

نرسم لعدد الكتب الثقافية $x+50$

(2) كتابة المعادلة $x + 2x + x + 50 = 1250$

(3) حل المعادلة $4x = 1250 - 50$

$$x = \frac{1200}{4} \text{ فإن } x = 300$$

(4) الإجابة عن السؤال.

عدد الكتب الأدبية هو 300

عدد الكتب العلمية هو $2x = 2 \times 300 = 600$

عدد الكتب الثقافية هو $x + 50 = 300 + 50 = 350$

المعادلة من الدرجة الثانية التي تؤول إلى معادلة الجداء المعلوم

مثال: حل المعادلة $4x^2 = 6x$

(أ) نحول المعادلة إلى معادلة صفيرية أي المجاهيل و المتعالميم في طرف واحد

و الصفير في الطرف الثاني

$$4x^2 - 6x = 0$$

(ب) نحلل الطرف الأول إلى جداء عاملين

$$2x \times x - 2x \times 3 = 2x(x-3)$$

(ج) نحل معادلة الجداء المعلوم والتي هي $2x(x-3)=0$

هذا يعني: $2x=0$ أي $x=0$

أو $x-3=0$ أي $x=3$

للمعادلة $4x^2 = 6x$ حلين هما 0 و 3 .

تمارين السلسلة الرابعة

التمرين الأول

حل المعادلات الآتية:

$$4(x+2)-6(3x+2)=x+2x-4 \quad / \quad 10x-(1-2x)=-1$$

$$(0,1x+1)(3x-2)=0 \quad / \quad 9+\frac{7}{3}x=2-\frac{2x}{6}$$

$$\left(4x+\frac{5}{3}\right)\left(\frac{3}{4}x-1\right)=0 \quad / \quad -8x(2x+0,3)=0$$

التمرين الثاني

حل المعادلات الآتية:

$$(7x-2)(x+4)+(x+7)(7x-2)=0 \quad / \quad 3x^2-x=0$$

$$6x^2-(5,8-2x)x^2=0$$

التمرين الثالث

أوجد عدد غير معدوم حيث مربع ضعفه يساوي معاكس مكعبه:

التمرين الرابع

أوجد طول ضلع مربع حيث ثلاثة مرات مساحته تساوي 9147 cm^2

التمرين الخامس

حل المعادلات الآتية:

$$\frac{x}{2}=\frac{3}{x} \quad / \quad x\sqrt{2}-1=2x+\sqrt{2}-3 \quad / \quad 5x+\sqrt{2}=3$$

$$\frac{x+1}{2}-\frac{x+2}{3}=x+\frac{2x-1}{6} \quad / \quad \frac{x}{6}+\frac{1}{2}=1-\frac{2x-1}{12} \quad / \quad \frac{x}{5}-\frac{x^2}{2}=\frac{3}{10}x$$

$$(3x-\sqrt{3})^2=x^2 \quad / \quad x^2-2x+1=3249$$

التمرين السادس

حل المعادلات الآتية:

$$-\frac{1}{4}x^2+5x-25=0 \quad / \quad (7x-1)^2=(x-5)^2 \quad / \quad x-1=0,25x^3$$

$$/(x+3)^2+(x+3)(2x+1)=0 \quad / \quad 4x^2+4x\sqrt{2}+2=0$$

$$4x^2-4x+1-(x-3)^2=0 \quad / \quad (3x+5)(x-4)+20=0$$

التمرين السابع

$$A=4x^2-81+(x-3)(2x+9)$$

(1) انشر ثم بسط العبارة A.

(2) حل العبارة A.

(3) حل المعادلة A=0.

التمرين الثامن

أعني محمد حديقة، ثلث مساحتها أزهار و سد سها نبات اخضر و الباقي

عشيش اخضر مساحته 150 m^2 .

احسب مساحة حديقة عمي محمد بالمتر المربع.

التمرين التاسع

أدينا مربع طول ضلعه $2x+3$ و مستطيل أبعاده $4x$ و $2x$ حيث $(x>0)$

(1) عبر بدلالة x عن مساحة كلا من المربع والمستطيل.


(2) احسب طول ضلع المربع إذا علمت أن مساحة المربع تساوي ضعف

مساحة المستطيل.

التمرين العاشر


قال مصطفى لأصدقائه انه يستطيع صنع مثلث و شبه منحرف بنفس المساحة

وبالأبعاد الآتية الموجودة على الشكلين



- (1) اكتب معادلة تعبر عن تساوي مساحتي المثلث وشبه المنحرف.
- (2) حل هذه المعادلة.
- (3) هل مصطفى على صواب؟

التمرين الحادي عشر
لديك الشكل الآتي



- (1) عبر عن الطول AD بدلالة x.
- (2) عبر عن مساحة المضلع EADCB بدلالة x.
- (3) انشر العبارة $(10 - x)(x - 2)$.
- (4) احسب الطول EF إذا علمت أن مساحة المضلع EADCB هي 20 cm^2 .

التمرين الثاني عشر

حل المعادلات الآتية :


$$(2x+3)(3x+1) = (x-7)(12x+4)$$

$$25x^2 + 16 - 4x - (x-8)(5x-4) = 0$$

$$(\sqrt{3}x-1)^2 + (3x^2-1) = 0$$

$$\left(\frac{3}{4}x+7\right)^2 - \left(2x-\frac{1}{2}\right)^2 = 0$$

التمرين الثالث عشر



(1) عبر عن مساحة المستطيل

ABCD بدلالة x.

(2) أوجد قيمة x حتى يكون

محيط P

المستطيل ABCD يساوي 32

التمرين الرابع عشر

ممر مستطيل الشكل محيطه 38m، إذا نقص من طوله 4m


وزاد عرضه 1m أنقصت مساحته 10 m^2 .

احسب طول وعرض هذا الممر.

التمرين الخامس عشر

ABCD مستطيل طوله 7cm

وعرضه 6cm.



(1) انشر وسط العبارة

$$2(x-4)(x-3)$$

(2) ماهي قيم x التي من

اجلها يكون المثلث

EFD قائما في E ؟

المتراجحات

Inéquations

مفهوم المتراجحة من الدرجة الأولى لمجهول واحد

نسمي عدم تساوي بين طرفين متباينة مثال $4 + 5 > 7$

و إذا أدخلنا على احد طرفي المتباينة أو كلاهما مجهول x نتحصل على

متراجحة.

مثال $4x + 5 > 7$

حل متراجحة من الدرجة الأولى لمجهول واحد

البحث عن قيم المجهول x التي تحقق المتراجحة يسمى حل المتراجحة.

مثال 1 حل المتراجحة $4x + 5 > 7$

المرحلة الأولى نضع المجهول في طرف و المعامل في الطرف الثاني مثل المعادلة

(لا ننس تغيير الإشارة عند الانتقال من طرف إلى آخر) .

$$4x > 7 - 5$$

المرحلة الثانية. نبسط كل طرف

$$4x > 2$$


المرحلة الثالثة 4 عدد موجب إذن $x > \frac{2}{4}$ أو $x > 0,5$

ومنه حل المتراجحة $4x + 5 > 7$ هو كل قيم x الأكبر تماماً من 0,5

التمثيل البياني



ملاحظة التمثيل البياني للحل $x \geq 0,5$ هو



مثال 2 حل المتراجحة $8x - 9 \geq 10x + 1$

$$8x - 10x \geq +1 + 9$$

$$-2x \geq +10$$

قف

العدد -2 سالب ————— نضرب طرفي المتراجحة في العدد -1


و نحول الرمز من $\geq$ إلى $\leq$

$$(-2x) \times (-1) \leq (+10) \times (-1)$$


$$+2x \leq -10 \text{ ومنه } x \leq \frac{-10}{2} \text{ أو } x \leq -5$$

حل المتراجحة $8x - 9 \geq 10x + 1$ هو كل قيم x الأصغر من أو يساوي -5

التمثيل البياني



ملاحظة التمثيل البياني للحل $x \leq 5$ هو



تمارين السلسلة الخامسة


التمرين الأول

ABC مثلث متقايس أضلاع طول ضلعه 5cm .

- (1) احسب A مساحة المثلث ABC .
- (2) إذا علمت أن $1,73 \leq \sqrt{3} \leq 1,74$ ، استنتج حصرًا للمساحة A .

التمرين الثاني

A, B, C, D منتصفات أضلاع المربع كما هو مبين في الشكل الآتي حيث طول ضلعه 6cm .



(1) عبر بدلالة π عن A مساحة الجزء المنقط.

(2) إذا علمت أن $3,14 \leq \pi \leq 3,15$ ، استنتج حصرًا للمساحة A .

التمرين الثالث

حل المتراجحات الآتية ثم مثلها بيانياً:

$$\begin{aligned} 5x + 12 &> 6(3x + 2) & / & \quad 3(2x - 1) > 3x + 2 \\ 2x - 5 &\leq 4(x + 1) + 1 & / & \quad -2(3x + 1) \geq -x - 3 \end{aligned}$$

التمرين الرابع

حل المتراجحات الآتية:

$$\begin{aligned} \frac{3 - 2x}{6} - \frac{x + 1}{4} &< \frac{2x - 1}{12} & / & \quad \frac{x + 1}{2} < \frac{x + 2}{3} \\ \frac{2 - 3x}{5} - \frac{1 - 2x}{15} &\geq 2 & / & \quad \frac{2x + 1}{3} - \frac{x - 1}{2} \leq 1 \end{aligned}$$

التمرين الخامس

$$(1) \text{ حل المتراجحة } 9 - 4y + \frac{1}{2} \geq -9$$

(2) مثل بيانياً حل المتراجحة.

(3) عين القيم الطبيعية أو المدومة لـ x التي هي حلول

$$\text{للمتراجحة } -4y + \frac{1}{2} \geq -9.$$

التمرين السادس

$ABCD$ مستطيل أبعاده $(x + 1)$ و $(x - 3)$.

EFG مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه x .

(1) ماهي قيم x حتى نستطيع أن ننشئ كلا من المستطيل والمثلث؟

(2) ماهي قيم x حتى يكون محيط المستطيل أصغر تماماً من محيط

المثلث؟

التمرين السابع

مؤسسة «Mobilis» الهاتفية تقترح على زبائننا اشتراكاً شهرياً يقدر بـ $1200DA$ و $3DA$ لكل مكالمات هاتفية مدتها دقيقة واحدة.

والأسسة «Djezzy» الهاتفية تقترح على زبائننا اشتراكاً شهرياً يقدر بـ $1150DA$ و $3,5DA$ لكل مكالمات هاتفية مدتها دقيقة واحدة.

(1) عبر بدلالة $x(mn)$ عن فاتورة شهرية لمؤسسة «Mobilis».

(2) عبر بدلالة $x(mn)$ عن فاتورة شهرية لمؤسسة « Djezzy ».

(3) ما هي المدد الهاتفية الشهرية لكي يكون الاختيار الأفضل لمؤسسة « Mobilis » ؟

التمرين الثامن

أراد أمين أن يزرع قطعة أرض مستطيلة الشكل طولها $80m$ وعرضها x ثم يقرره بعد.

يود أمين يكون محيط هذه القطعة أقل من $240m$ و أن تزيد مساحتها عن $200m^2$.

- (1) عبر عن هذه الوضعية بمتراجحتين.
- (2) حل هاتين المتراجحتين ثم أعط القيم الممكنة لعرض القطعة x .

التمرين التاسع

B مجموع جبري حيث $B = (3x+4)^2 - (2x-3)^2$

(1) انشر B ثم بسطه.

(2) حل المتراجحة $B \leq 5x^2 + 30x - 17$.

التمرين العاشر

إذا كان عددا نسبيا فرديا a ، عددا نسبيا زوجيا b و عدد نسبي يقبل القسمة

على 3 حيث $1 < \frac{1}{2}a < 2$ و $10 < 2b < 14$ و $5 \leq c - 2 < 9$

احسب قيم كل من a ، b ، c ثم بين أن $\left(\frac{\sqrt{a} + \sqrt{c}}{\sqrt{b}} \right)^2 = 2 + \sqrt{3}$

التمرين الحادي عشر

حل المتراجحات الآتية ثم مثل حلها بيانيا :

$$-5 \left(x + \frac{1}{2} \right) \geq -6x - \frac{10}{2}$$

$$-\frac{16x}{4} + 3 \leq -7x + \frac{1}{2}$$

$$\frac{x+3}{5} + 1 > x + \frac{x+1}{2}$$

التمرين الثاني عشر

ABC مثلث قائم في A حيث $AB = 16cm$

عين حصرا لطول الضلع $[AC]$ بحيث تكون مساحته تساوي على الأكثر $72cm^2$ وعلى الأقل $48cm^2$.

التمرين الثالث عشر

مستطيل بعده $7cm$ و $16cm$.

ما هو العدد x المعبر عنه بالسنتيمتر الذي يمكن إضافته إلى طوله وعرضه

حيث لا يتجاوز محيطه $86cm$ ؟

التمرين الرابع عشر

مستطيل طوله $12cm$ وعرضه xcm حيث $0 < x \leq 12$.

(1) ما هي قيم x التي من أجلها $P > 36$: P (محيط المستطيل) ؟

(2) ما هي قيم x التي من أجلها $S > 114$: S (مساحة المستطيل) ؟

الدالة القاذفية

$$g(x) = ax + b \text{ أو } g : x \longrightarrow ax + b$$

g دالة قاذفية، x السابقة، $g(x)$ أو $ax + b$ صورة x بالدالة g ، معامل الدالة g .


مثال: g دالة قاذفية معرفة كالاتي: $g(x) = 2x + 3$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right) + 3 = 4, \quad g(-1) = 2 \times (-1) + 3 = 1, \quad g(0) = 2 \times 0 + 3 = 3$$

التمثيل البياني للدالة g هو مستقيم يشمل نقطتين تختلفان عن المبدأ نعين إحداثياتهما

	B	C
x	0	-1
f(x)	3	1

في الجدول المساعد الآتي



الدوال Fonctions

للدالة الخطية

$$f(x) = ax \text{ أو } f : x \longrightarrow ax$$

f دالة خطية، x السابقة، $f(x)$ أو ax صورة x بالدالة f ، معامل الدالة f .


مثال: f دالة خطية معرفة كالاتي: $f(x) = 2x$

$$f(-2) = 2 \times (-2) = -4, \quad f(1) = 2 \times 1 = 2, \quad f(0) = 2 \times 0 = 0$$

التمثيل البياني للدالة f هو مستقيم يشمل مبدأ المعلم و نقطة أخرى ونعين

	O	A
x	0	1
f(x)	0	2

إحداثياتها في الجدول المساعد الآتي



ملاحظة: في الدالة الخطية الصور متناسبة مع السوابق أي $a = \frac{f(x)}{x}$

تمارين المسئلة السادسة

التمرين الأول

لتكن الدالة الخطية f المعرفة كالاتي $f(x) = \frac{4}{5}x$

(1) احسب كلا من $f\left(\frac{10}{4}\right)$ ، $f(-2)$ ، $f(0)$

(2) مثل الدالة f في معلم متعامد ومتجانس.

التمرين الثاني

f دالة خطية حيث $f\left(\frac{3}{8}\right) = -\frac{6}{4}$

اوجد معامل الدالة f ثم عرفها.

التمرين الثالث

g دالة تافيه معرفة كالاتي $g(x) = 2x - 1$

(1) ماهي صور $0, 1, -2$ ، $\frac{3}{2}$ بالدالة g ؟

(2) ماهو العدد الذي صورته 0 ؟

التمرين الرابع

g دالة تافيه معرفة كالاتي $g(x) = -\frac{2}{3}x + 4$

مثل الدالة g في معلم متعامد ومتجانس.

التمرين الخامس

f دالة تكفيه حيث $f(2) = 3$ و $f(-1) = -4$

عرف الدالة f .

حساب معامل الدالة g

$$a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

تطبيقات التناسبية

(1) زيادة x بـ $P\%$ هو حساب y حيث $y = \left(1 + \frac{P}{100}\right)x$

مثال:

ثمن كتاب $250DA$ ، ازداد ثمنه بعد 6 أشهر بـ 30% لكثرة الطلب ،

احسب ثمنه الجديد.

$$\left(1 + \frac{30}{100}\right) \times 250 = \left(\frac{100 + 30}{100}\right) \times 250 = 325DA$$

ثمن الجديد للكتاب هو $325DA$

(2) انخفاض x بـ $P\%$ هو حساب y حيث $y = \left(1 - \frac{P}{100}\right)x$

مثال:

لشخص مبلغ يقدر بـ $13500DA$ ، صرف منه 40% ، كم بقي له ؟

$$\left(1 - \frac{40}{100}\right) \times 13500 = \left(\frac{100 - 40}{100}\right) \times 13500 = 8100DA$$

بقي له $8100DA$

التمرين السادس

ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 2cm .

نضيف إلى كل طول من أضلاعه $x(\text{cm})$.

(1) عبر عن $p(x)$ محيط المثلث $A'B'C'$ بدلالة x .

(2) مثل في معلم متعامد ومتجانس الدالة p .

(3) اقرأ من التمثيل:

(a) قيمة المحيط $p(x)$ من أجل $x = 3$.

(b) قيمة x من أجل محيط يساوي $p_x = 10,5\text{cm}$.

(c) أوجد نتائج السؤال الثالث عن طريق الحساب.

التمرين السابع

ABCD مستطيل أبعاده 3cm و $x(\text{cm})$.

(1) عبر عن $A(x)$ مساحة المستطيل ABCD بدلالة x .

(2) نضيف إلى كلا من ضلعيه 2cm .

(a) عبر عن $A'(x)$ المساحة الجديدة للمستطيل الجديد بدلالة x .


(b) احسب قيمة x حتى تكون مساحة المستطيل الجديد تزيد عن مساحة

المستطيل الأصلي بـ 20cm^2 .

التمرين الثامن

إليك الشكل الآتي حيث:

$$AM = CN = x$$



(1) عبر $A(x)$ مساحة المثلث ABM بدلالة x .

(2) بين أن $A'(x)$ مساحة الرباعي $MBND$ تساوي $48 - 8x$.

(3) احسب قيمة x حتى تكون مساحة المثلث ABM تساوي مساحة

الرباعي $MBND$.

التمرين التاسع

تقترح إدارة قاعة للرياضة حصص تدريبية حيث كل حصة يدفع الزبون

$50DA$.

عدد الحصص	0	1	8	
المبلغ (DA)			300	500

انقل ثم اتمم الجدول الآتي

(1) ليكن x عدد الحصص و y المبلغ المناسب لعدد الحصص، عبر عن y

بدلالة x .

(2) مثل بيانيا الدالة f حيث $f(x) = 50x$.

(3) بسبب قلة الزبائن اقترحت إدارة القاعة صيغة أخرى للدفع وهي

اشتراك سنوي يقدر بـ $200DA$ علي أن يدفع كل زبون نصف المبلغ

الأول لكل حصة تدريبية.

عدد الحصص	0	4	7	
المبلغ (DA)				450

(a) انقل ثم اتمم الجدول الآتي

(b) ليكن x عدد الحصص و y'

المبلغ المناسب لعدد الحصص

عبر عن y' بدلالة x .

التمرين الثالث عشر

- تمن حذاء 1500DA ، أصبح سعره بعد التخفيض 1000DA .
 (1) أعط معامل الدالة الخطية g المفسرة لهذا التخفيض.
 (2) استنتج نسبة التخفيض .

التمرين الرابع عشر

- خفّض تاجر ثمن سلع متجره بـ 20% . ليكن x ثمن السلعة قبل تخفيض ثمنها
 و ليكن y ثمن السلعة بعد التخفيض.
 (1) عبر عن y بدلالة x .
 (2) إذا كان ثمن السروال قبل التخفيض هو 1200DA ، ماهو ثمنه بعد
 التخفيض؟
 (3) سلعة سعرها بعد التخفيض 3000DA ، ماهو ثمنها قبل التخفيض؟

(c) مثل في نفس المعلم الدالة g حيث $g(x) = 25x + 200$.

(d) عين بيانيا عدد الحصص التي من أجلها يكون الاختيار الثاني أفضل
 من الأول.

التمرين الخامس عشر

خفّض تاجر ثمن سلع متجره بـ 20% .

(1) ليكن x ثمن سلعة قبل تخفيض ثمنها، و ليكن y ثمن السلعة بعد
 التخفيض.

عبر بدلالة x عن y .

(2) إذا كان ثمن سروال قبل التخفيض هو 1200DA ، ماهو ثمنه بعد
 التخفيض؟

(3) سلعة سعرها بعد التخفيض 2880DA .

ما هو ثمنها قبل التخفيض؟

التمرين الحادي عشر

(1) عين الدالة التآلفية التي تمثيلها البياني يشمل النقطتين:

$$F\left(4; \frac{1}{2}\right) \text{ و } E(-3,5;2)$$

(2) هل النقطة $G(0;-1)$ تنتمي إلى هذا التمثيل؟

التمرين الثاني عشر

(1) عين الدالة الخطية g حيث $g(-4) = 12$.

(2) احسب $g(0)$ ، $g(+1)$ ، $g\left(-\frac{2}{3}\right)$.

(3) مثل الدالة g في معلم متعامد ومتجانس .

جملّة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

Système de deux équations du 1^{er} degré à deux inconnues

معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين

تكتب معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين x و y على الشكل $ax + by = c$ حيث a, b, c أعداد معلومة.

إن حلول هذه المعادلة غير منتهية.

ملاحظة: المعادلتان المتكافئتان معادلتان لهما نفس مجموعة الحلول.

جملّة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

جملّة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين x و y هي جملّة من الشكل

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

حيث $a, b, c / a', b', c'$ أعداد معلومة.

الحل الجبري لجملّة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

حل جملّة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين x و y هو إيجاد الثنائيات المرتبة (x, y) التي تحقق المعادلتين في آن واحد.

لحل جملّة معادلتين جبريا نتبع إحدى الطريقتين:

(1) طريقة الحل بالجمع:

$$\begin{cases} x + y = 5 \dots\dots\dots (1) \\ 2x - 3y = -4 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

مثال: حل الجملّة :

نضرب طرفي المعادلة (1) في العدد (-2) فنحصل على الجملّة الآتية:

$$\begin{cases} -2x - 2y = -10 \\ 2x - 3y = -4 \\ \hline 0 - 5y = -14 \end{cases}$$

بجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على $-5y = -14$ ومنه $y = \frac{14}{5}$

أو $y = 2,8$

نضرب طرفي المعادلة (1) في العدد 3 فنحصل على الجملّة الآتية:

$$\begin{cases} 3x + 3y = 15 \\ 2x - 3y = -4 \\ \hline 5x + 0 = 11 \end{cases}$$

بجمع المعادلتين طرفا لطرف نحصل على $5x = 11$ ومنه $x = \frac{11}{5}$ أو $x = 2,2$

$$\begin{cases} x + y = 5 \dots\dots\dots (1) \\ 2x - 3y = -4 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

(2) طريقة الحل بالتعويض

حل نفس الجملّة السابقة :

من المعادلة (1) نكتب x بدلالة y فنحصل على المعادلة (3) $x = 5 - y \dots\dots\dots (3)$

نعوض قيمة x في المعادلة (2) فنحصل على $2(5 - y) - 3y = -4$ أي

$$10 - 2y - 3y = -4 \text{ أي } -5y = -10 - 4 \text{ أي } -5y = -14 \text{ ومنه } y = \frac{-14}{-5} = 2,8$$

نعوض قيمة $y = 2,8$ في المعادلة (3) فنحصل على $x = 5 - \frac{14}{5}$ أي

$$x = \frac{25 - 14}{5} \text{ أي } x = \frac{11}{5} \text{ ومنه } x = 2,2$$

$$\begin{cases} x + y = 5 \dots\dots\dots (1) \\ 2x - 3y = -4 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

الحل البياني لجملة معادلتين

$$\begin{cases} ax + by = c \dots\dots (1) \\ a'x + b'y = c' \dots\dots (2) \end{cases}$$

(1) نرسم (d) مستقيم المعادلة (1) و (d') مستقيم المعادلة (2).

(2) احداثيا نقطة تقاطع (d) و (d') هو حل للجملة ونقرؤهما على البيان.

تمارين السلسلة السابعة

التمرين الأول

حل الجمل الآتية :

$$\begin{cases} \frac{2x+y}{4} = \frac{x}{3} + \frac{3}{2} \\ (x-3)^2 - x^2 = 3 + y \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x}{9} = \frac{y}{4} \\ 2x + 3y = 231 \end{cases} \quad \begin{cases} 10x - 13y = 41 \\ 7x - 11y = 23 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{2}x - y = \sqrt{3} \\ \sqrt{6}x + \sqrt{3}y = 5 \end{cases}$$

التمرين الثاني

أوجد عددين x و y حيث مجموعهما 134 و فرقهما 126.

التمرين الثالث

أوجد عددين a و b مجموعهما 40 و فرقهما يساوي ثلثي أكبر العددين.

حيث $a > b$

التمرين الرابع

ثمن قميص و سروال معا 3200DA ، علما أن ثمن السروال يزيد عن ثمن

القميص بـ 1300DA ، أوجد ثمن كلا منهما.

التمرين الخامس


العلامات الآتية مرتبة ترتيبا تصاعديا :

$$x : 4 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15 ; y$$

علما أن معدل هذه السلسلة هو 10 و مداها هو 16 ، أوجد كلا من x و y .

التمرين السادس

إليك الشكل الآتي:



المربع و المثلث المتقايس الأضلاع لهما نفس المحيط.

احسب طول ضلع المثلث و طول ضلع المربع.

التمرين السابع

العدد الإجمالي للسيارات و الدرجات النارية التي شاركت في السباق هو 78.

إذا علمت أن العدد الإجمالي لعجلات السيارات و الدرجات النارية هو 218 ،

أوجد عدد السيارات و عدد الدرجات النارية.

التمرين الثامن

x و y هما قياسا زاويتين بالدرجات، أوجد x و y إذا كان x يزيد عن y بـ 20°

و كانت الزاويتان متكاملتين.

الإحصاء Statistiques

سلسلة إحصائية

البيانات الإحصائية التي تمثل العلامات المحصل عليها من طرف عشرة

تلاميذ :

9 - 15 - 13 - 15 - 7 - 11 - 15 - 19 - 7 - 11

- أعط جدول التكرارات لهذه السلسلة.

- أعط جدول التكرارات النسبية لهذه السلسلة.

- أعط جدول التكرارات المجمعة المتزايدة و المتناقصة لهذه السلسلة.

- أعط جدول التكرارات النسبية المجمعة المتزايدة والتكرارات النسبية المجمعة

المتناقصة لهذه السلسلة.

سوف تلخص كل هذه الجداول في جدول واحد :

العلامات	7	9	11	13	15	19
التكرارات	2	1	2	1	3	1
التكرارات النسبية	$\frac{2}{10} = 0,2$	$\frac{1}{10} = 0,1$	$\frac{2}{10} = 0,2$	$\frac{1}{10} = 0,1$	$\frac{3}{10} = 0,3$	$\frac{1}{10} = 0,1$
التكرارات المجمعة المتزايدة	2	2+1=3	3+2=5	5+1=6	6+3=9	9+1=10
التكرارات المجمعة المتناقصة	10	10-2=8	8-1=7	7-2=5	5-1=4	4-1=3
التكرارات النسبية المجمعة المتزايدة	$\frac{2}{10} = 0,2$	$\frac{3}{10} = 0,3$	$\frac{5}{10} = 0,5$	$\frac{6}{10} = 0,6$	$\frac{9}{10} = 0,9$	$\frac{10}{10} = 1$
التكرارات النسبية المجمعة المتناقصة	$\frac{10}{10} = 1$	$\frac{8}{10} = 0,8$	$\frac{7}{10} = 0,7$	$\frac{5}{10} = 0,5$	$\frac{4}{10} = 0,4$	$\frac{3}{10} = 0,3$

التمرين التاسع

عين الدالة التآلفية f حيث :

$$f(-1) = -3 \quad / \quad f(-4) = 6$$

التمرين العاشر

ليكن المستطيل $ABCD$.

إذا زاد طول المستطيل $ABCD$ بـ 20% ، فإن نصف محيطه يصبح $22,4cm$

وإذا نقص عرضه بـ 20% ، فإن نصف محيطه يصبح $18,4cm$.

احسب بعدي هذا المستطيل.

التمرين الحادي عشر

أوجد كسرا ، إذا أضفنا إلى بسطه 1 وانقصنا من مقامه 1 يكون ناتج الكسر 1

وإذا أضفنا إلى المقام 1 يكون ناتج الكسر مساويا $\frac{1}{2}$.

التمرين الثاني عشر

حل الجملة الآتية :

$$\begin{cases} x - y = -3 \\ x^2 - y^2 = -6 \end{cases}$$

ملاحظة: نسمي كل تكرار نسبي تواترا.

سلاسل إحصائية على شكل فئات

شركة وطنية عدد عمالها 100، إليك الجدول الآتي الذي يمثل أعمار هؤلاء العمال:

أعمار العمال	$20 \leq x < 30$	$30 \leq x < 40$	$40 \leq x < 50$	$50 \leq x \leq 60$
على شكل فئات				
عدد العمال أو التكرار	40	30	20	10
مراكز الفئات	$\frac{20+30}{2} = 25$	$\frac{30+40}{2} = 35$	$\frac{40+50}{2} = 45$	$\frac{50+60}{2} = 55$

حساب الوسط الحسابي $(\bar{X})$

علامات خمسة تلاميذ هي كالاتي: 14 - 10 - 5 - 12 - 7.

$$\bar{X} = \frac{5+7+10+12+14}{5} = \frac{48}{5} = 9,6$$

حساب الوسط الحسابي المتوازن $(\bar{X})$

علامات عشرة تلاميذ هي كالاتي: 9 - 9 - 16 - 10 - 4 - 8 - 15 - 9 - 15 - 10.

$$\bar{X} = \frac{(4 \times 1) + (8 \times 1) + (9 \times 3) + (10 \times 2) + (15 \times 2) + (16 \times 1)}{1+1+3+2+2+1} = 10,5$$

ملاحظة:

- حساب معدل قسم بدون معامل هو حساب الوسط الحسابي لهذا القسم.
- حساب معدل قسم بالمعامل هو حساب الوسط الحسابي المتوازن لهذا القسم.

الوسيط (Med) Medianne

الحالة الأولى: عدد قيم السلسلة عدد فردي:

إليك السلسلة الآتية: 5 - 8 - 10 - 4 - 7.

(1) نرتب هذه السلسلة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا من اليسار إلى اليمين:

$$(2) \quad 4 - 5 - 7 - 8 - 10 \quad \text{الوسيط هو } (Med = 7)$$

الحالة الثانية: عدد قيم السلسلة عدد زوجي:

إليك السلسلة الآتية: 24 - 8 - 10 - 32 - 14 - 20.

(1) نرتب هذه السلسلة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا من اليسار إلى اليمين:

$$(2) \quad 8 - 10 - 14 - 20 - 24 - 32$$

وسيط هذه السلسلة هو كل القيم المحصورة بين 14 و 20.

$$\text{لكن عموما نأخذ وسيطا واحدا وهو } Med = \frac{14+20}{2} = 17$$

المدى (e) Etendue

هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة.

مثال: مدى السلسلة المرتبة الآتية: 7 - 8 - 12 - 14 - 20 هو

$$e = 20 - 7 = 13$$


التمثيل البياني لسلسلة إحصائية يكون:

- إما عن طريق مخطط أعمدة.
- إما عن طريق مخطط مستطيلات.
- و إما عن طريق مخطط دائري.

تمارين السلسلة الثامنة

التمرين الأول

إليك المخطط الدائري الآتي الذي يمثل تقسيم علامات 250 تلميذاً لمتوسطة في الاختبار.



- 90 تلميذاً لديهم علامة n حيث $8 \leq n < 12$ ، احسب النسبة المئوية لهؤلاء التلاميذ.
- علماً أن $\angle AOB = 86,4^\circ$ احسب عدد التلاميذ حيث علاماتهم n محصورة بين 12 و 16 أي $12 \leq n < 16$.
- 20% لديهم علامة n حيث $4 \leq n < 8$ ، احسب قياس الزاوية المناسبة لهذه النسبة.


التمرين الثاني

طلب أستاذ لتلاميذ قسمه وعددهم 30 أن يرسموا زاوية. علماً أن نصف عدد التلاميذ رسموا زاوية قياسها أصغر من 45° ، انقل وانتم الجدول الآتي:

التكرار	التكرار	النسبة	التكرار	قياس الزاوية a
المجموع	المجموع	النسبة	التكرار	قياس الزاوية a
المتناقص	المتزايد	النسبة	التكرار	قياس الزاوية a
			3	$0^\circ \leq a < 30^\circ$
				$30^\circ \leq a < 45^\circ$
		20%		$45^\circ \leq a < 85^\circ$
			2	$85^\circ \leq a < 95^\circ$
		10%		$95^\circ \leq a < 130^\circ$
			3	$130^\circ \leq a < 180^\circ$
				$180^\circ \leq a$

التمرين الثالث

- التمثيل البياني الآتي يبين علامات فرض الرياضيات لقسم الرابعة متوسط.
- نظم هذه المعطيات في جدول تكراري.
 - احسب معدل القسم لهذا الفرض.



التمرين الرابع

لديك الجدول الآتي الذي يمثل علامات العلوم الطبيعية لكل من أحمد و سارة أثناء العام الدراسي.

المعدل	6	5	4	3	2	1	الفروض
.....	a	19	11	18	5	12	أحمد
12,5	y	x	9	4	15	20	سارة

- 1) احسب معدل علامات أحمد إذا علمت أن علامة الفرض السادس هي 13.
- 2) هل بإمكان أحمد أن يتحصل على معدل 15 لو كانت علامة الفرض السادس أفضل من 13؟
- 3) علامة سارة في الفرض السادس زادت + 25% بالنسبة لعلامة الفرض الخامس.

(a) عبر عن y بدلالة x .

(b) احسب كلا من x و y .

(c) قارن بين مدى العلامات لكل من أحمد و سارة.

التمرين الخامس

إليك الجدول الآتي الذي يمثل سلسلة إحصائية:

القيم	6	8	9	10	11	a
التكرارات	3	4	1	2	3	b

- 1) عين قيمة b علما أن وسيط هذه السلسلة هو 9.
- 2) عين قيمة a علما أن الوسط الحسابي المتوازن لهذه السلسلة هو 10.
- 3) ما هو مدى هذه السلسلة؟

التمرين السادس

في منافسة رياضية لألعاب القوى أراد مدرب فريق أن يعين رياضيا من بين

6 رياضيين للمشاركة في سباق 100 متر، ل قام بإجراء خمسة سباقات حيث كانت نتائجها بالثواني كما يلي:

السباقات	1	2	3	4	5
المتسابق A	11,4	12,1	12,5	13,2	11,6
المتسابق B	12,5	11,9	11,4	11,8	12,1
المتسابق C	11,3	11	11	11,9	12,6
المتسابق D	11,4	11,5	10,4	12,7	11,6
المتسابق E	11,2	13,8	11,9	11,6	11,8
المتسابق F	11,6	12,1	11,4	11,6	11,7

- 1) احسب لكل متسابق، الوسط الحسابي ووسيط و مدى سلسلة نتائجه.
- 2) على أحد الرياضيين الستة أن يحقق مايلي لكي يشارك في المنافسة:
- زمن متوسط أقل من 12 ثانية.
- زمن كل من السباقات الخمس لم يتجاوز 12,5 ثانية.
- 3) من بين المتسابقين الخمسة من هو المؤهل للمنافسة؟

التمرين السابع

درجات الحرارة المسجلة ليوم الأحد 15 ديسمبر 2008 كانت كالتالي: (الوحدة $^{\circ}C$)

- وهران $18^{\circ}C$ ، الجزائر $19^{\circ}C$ ، بجاية $15^{\circ}C$ ، عنابة $15^{\circ}C$ ، المديّة $14^{\circ}C$ ، سطيف $14^{\circ}C$ ، بو سعادة $17^{\circ}C$ ، الجلفة $9^{\circ}C$ ، الشرف $15^{\circ}C$ ، تيزي وزو $7^{\circ}C$ ، قالمة $11^{\circ}C$ ، معسكر $15^{\circ}C$ ، باتنة $11^{\circ}C$ ، بشار $11^{\circ}C$ ، بسكرة $14^{\circ}C$ ، تندوف $20^{\circ}C$ ، أدرار $28^{\circ}C$ ، حاسي الرمل $28^{\circ}C$ ، جانتات $28^{\circ}C$ ، إيزي $28^{\circ}C$.
- 1) احسب معدل درجات الحرارة المسجلة.


نظرية طاليس Théorème de TALÈS

نظرية طاليس

(d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A ، B ، C نقطتان من (d)

تختلفان عن A ، M ، N نقطتان من (d') تختلفان عن A ،

إذا كان (BM) و (CN) متوازيين فإن $\frac{AM}{AN} = \frac{AB}{AC} = \frac{MB}{CN}$



النظرية العكسية لنظرية طاليس

(d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A ، B ، C نقطتان من (d) تختلفان

عن A ،

M ، N نقطتان من (d') تختلفان عن A ،

إذا كان $\frac{AM}{AN} = \frac{AB}{AC}$ والنقاط A ، B ، C و M' A له نفس الترتيب.

(2) ماهي القيمة الوسيطة لدرجات الحرارة المسجلة في هذا اليوم؟

(3) ما هو المدى الحراري لهذا اليوم؟

(4) مثل بالأعمدة درجات الحرارة.

(5) ماهو عدد درجات الحرارة الأقل من $17^{\circ}C$ ؟

(6) ماهي نسبة درجات الحرارة الأكبر من $20^{\circ}C$ ؟

التمرين الثامن

أوجد العددين x و y لكي يكون الوسط الحسابي والمدى مساويين للعدد 7

للسلسلة الإحصائية المرتبة كما يلي : x , 5 , 5 , 8 , 9 , 9 , y

التمرين التاسع

تكرارات سلسلة إحصائية مرتبة ترتيبا تصاعديا معطاة في الجدول الآتي :

القيم	10	11	12	13
التكرارات	1	3	3	2

(1) أوجد قيم y لكي تكون 12 هي القيمة الوسيطة لهذه السلسلة.

(2) ليكن $y=2$ أوجد x لتكون القيمة 12 وسطا حسابيا متوازنا لهذه

السلسلة.

التمرين العاشر

المعدلات الفضلية لتلاميذ قسم كانت كالتالي:

المعدل (M)	M(5)	M(10)	M(15)	M(20)
التكرارات المجمعة المتزايدة	6	24	35	40

(1) ما هو عدد تلاميذ هذا القسم ؟


(2) أعد جدول التكرارات لهذا القسم ثم مثله.

تمارين السلسلة التاسعة

التمرين الأول

لدينا في الشكل المقابل مقصص، مهما كانت فتحته فإن المستقيمين (AB) و (DE)

متوازيان حيث $CB = CA = 6cm$ و $DC = EC = 8cm$



عند استعمال هذا المقصص فإن أكبر فتحة بين D و E هي $12cm$.
احسب أكبر فتحة بين B و A .


التمرين الثاني

- مثلث ABC مثلث، M نقطة من (BC) ، F نظيرة A بالنسبة إلى النقطة M .
المستقيم الموازي للمستقيم (AB) والذي يشمل F يقطع (BC) في P .
- برهن أن M منتصف $[BP]$.
- ماهي طبيعة الرباعي $ABFP$ ؟ علل.


التمرين الثالث

في كل حالة من الحالات الآتية، هل المستقيمان (AB) و (CD) متوازيان؟ علل

الحالة الأولى



الحالة الثانية




فإن (CN) و (MB) متوازيان.

تقسيم قطعة مستقيم هندسياً (بالممدور و المسطرة غير المدرجة)

لتقسيم القطعة $[AB]$ إلى 5 قطع لها نفس الطول نتبع المراحل الآتية:

- ننشئ نصف مستقيم (Ax) مبدؤه A ولا يوازي $[AB]$.
 - ننشئ بالممدور على (Ax) 5 نقاط R, Q, P, N, M حيث $AM = MN = NP = PQ = QR$.
 - ننشئ المستقيم الذي يشمل النقطتين B و R .
 - ننشئ المستقيمتين (MM') ، (NN') ، (PP') ، (QQ') التي يوازي كلا منها المستقيم (BR) .
 - ومنه نحصل على تقسيم للقطعة $[AB]$ إلى 5 قطع لها نفس الطول.
- ملاحظة:** هذه الطريقة منبثقة من نظرية طاليس




التمرين الرابع

IJK مثلث حيث $IK = 2,8cm$ ، عين النقطة P على نصف المستقيم $[KI]$ حيث $KP = 4,9cm$ ، عين النقطة L على نصف المستقيم $[JI]$ حيث L لا تنتمي إلى القطعة $[IJ]$ حيث $IL = \frac{3}{4}IJ$. هل المستقيمان (JK) و (PL) متوازيان؟ علل.

التمرين الخامس

إليك الشكل الآتي:
احسب الطول BC .



التمرين السادس

(1) احسب القاسم المشترك


الأكبر للعددين 258 و 602.

(2) اكتب كلا من الكسرين

الآتين على شكل كسر

غير قابل للاختزال $\frac{330}{770}$

$\frac{258}{602}$



(3) في الشكل الآتي المستقيمان (AD) و (BC) متقاطعان في النقطة I ، حيث $IC = 77cm$ ، $ID = 60,2cm$ ، $IB = 33cm$ ، $IA = 25,8cm$. برهن أن المستقيمين (AB) و (CD) متوازيان.

التمرين السابع

(d) و (d') مستقيمان متعامدان في النقطة A .

عين النقطتين M و B من (d) في جهتين مختلفتين بالنسبة إلى A حيث $AM = 4cm$ و $AB = 2,4cm$.

عين النقطتين C و N من (d') حيث $AC = 4,5cm$ و $AN = 7,5cm$ (N تنتمي إلى $[AC]$).

(1) قارن بين النسب $\frac{MN}{BC}$ و $\frac{AN}{AC}$ و $\frac{AM}{AB}$.

(2) هل المستقيمان (MN) و (BC) متوازيان؟ لماذا؟

التمرين الثامن

$ABCD$ متوازي أضلاع. لتكن النقطة F نظيرة C بالنسبة إلى B . المستقيم (DF) يقطع المستقيم (AB) في I .

(1) برهن أن النقطة I منتصف القطعة $[DF]$.

(2) برهن أن الرباعي $AFBD$ متوازي أضلاع.

(3) المستقيمان (AC) و (DF) يتقاطعان في النقطة J . برهن أن $JD = 2IJ$.

التمرين التاسع

أراد أمين أن يحسب قطر القمر، ففي ليلة من ليالي الصيف حيث السماء صافية والقمر مكتمل وواضح وقف أمين على سطح العمارة التي يقطن بها واستعمل حبة عدس مركزها O وقطرها $6mm$ ، فعندما وضعها على بعد $66cm$ من عينيه غطت الحبة كل القمر. علما أن أمين يبعد عن القمر بمسافة $383900km$ ، احسب قطر القمر.


- المستقيم العمودي على (OA) ويشمل B يقطع (OA) في E .
المستقيم العمودي على (OA) ويشمل C يقطع (OA) في F .
(1) بين أن O منتصف $[EF]$.
(2) بين نوع الرباعي $ECFB$.

التمرين الثالث عشر

- $ABCD$ رباعي محدب قطراه يتقاطعان في I .
المستقيم الذي يشمل I ويوازي (BC) يقطع $[AB]$ في M .
المستقيم الذي يشمل I ويوازي (CD) يقطع $[AD]$ في N .
بين أن $(MN) \parallel (BD)$.

التمرين الرابع عشر

- مساحة مثلث ADE هي $54cm^2$.
 B نقطة من $[AD]$ حيث $AB = \frac{1}{3}AD$ و C نقطة من $[AE]$ حيث $AC = \frac{1}{3}AE$.
(1) بين أن $(BC) \parallel (DE)$.
(2) المثلث ABC هو تصغير للمثلث ADE ، ماهو سلم التصغير المستعمل؟
(3) احسب مساحة المثلث ABC .



التمرين الخامس عشر

- (1) انشئ مثلث ABC ، عين النقطة D منتصف $[BC]$ ، ثم عين النقطة P من $[DC]$.
(2) انشئ المستقيم الموازي لـ (AD) ويشمل P ويقطع كلا من (AB) و (AC) في النقطتين M و N على الترتيب.
(3) أثبت أن $\frac{CP}{CD} + \frac{BP}{BD} = 2$.
(4) أوجد كسورا تساوي النسبة $\frac{CP}{CD}$ و كسورا تساوي النسبة $\frac{BP}{BD}$.
(5) استنتج أن $PM + PN = 2AD$.

التمرين الحادي عشر

- $ABCD$ مستطيل حيث $AB = 12cm$ و $AD = 7cm$.
 M نقطة من $[BC]$ حيث $MB = 5cm$.
(1) احسب AM .
(2) المستقيم (AM) يقطع (CD) في N ، احسب كلا من MN و NC .

التمرين الثاني عشر

- ABC مثلث و O منتصف $[BC]$.

النسب المثلثية في مثلث قائم

Les Relations trigonométriques

جيب تمام ، جيب ، ظل (زاوية حادة)

ABC و $AB'C'$ مثلثان قائمان في النقطتين B و B' على الترتيب حيث لهما زاوية حادة مشتركة $\hat{A}$.


• القيمة المشتركة للنسبتين $\frac{AB'}{AC'}$ و $\frac{AB}{AC}$ تسمى جيب تمام الزاوية $\hat{A}$ ،

ونكتب $\cos \hat{A}$

• القيمة المشتركة للنسبتين $\frac{B'C'}{AC'}$ و $\frac{BC}{AC}$ تسمى جيب الزاوية $\hat{A}$ ،

ونكتب $\sin \hat{A}$

• القيمة المشتركة للنسبتين $\frac{B'C'}{AB'}$ و $\frac{BC}{AB}$ تسمى ظل الزاوية $\hat{A}$ ، ونكتب $\tan \hat{A}$



$$\cos \hat{A} = \frac{AB}{AC} = \frac{AB'}{AC'}$$

$$\tan \hat{A} = \frac{BC}{AB} = \frac{B'C'}{AB'}$$


$$\sin \hat{A} = \frac{BC}{AC} = \frac{B'C'}{AC'}$$

خصائص: ABC مثلث قائم في A

$$\bullet \cos \hat{B} = \frac{\text{طول ضلع المجاور للزاوية } \hat{B}}{\text{طول الوتر}} \quad / \quad \cos \hat{B} = \frac{AB}{BC}$$

$$\bullet \sin \hat{B} = \frac{\text{طول ضلع المقابل للزاوية } \hat{B}}{\text{طول الوتر}} \quad / \quad \sin \hat{B} = \frac{AC}{BC}$$

$$\bullet \tan \hat{B} = \frac{\text{طول ضلع المقابل للزاوية } \hat{B}}{\text{طول ضلع المجاور للزاوية } \hat{B}} \quad / \quad \tan \hat{B} = \frac{AC}{AB}$$



ملاحظة:

(1) جيب و جيب تمام زاوية حادة هما عدنان محصوران تماماً بين العددين 0 و 1.

(2) ظل زاوية حادة هو عدد موجب تماماً.

جدول بعض الزوايا الخاصة

قيس الزاوية a	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin a$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos a$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan a$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	غير موجود

تمارين السلمة العاشرة

التمرين الأول

- (1) عين مدور إلى $\frac{1}{1000}$ لكل من $\cos 30^\circ$ ، $\cos 45^\circ$ ، $\cos 75^\circ$ ، $\cos 3^\circ$.
(2) هل عندما يزيد قياس زاوية a يزيد معها $\cos a$ ؟

التمرين الثاني

عين مدور إلى الدرجة للزاوية x في كل مما يلي :
 $\sin x = 0,122$ ، $\cos x = 0,97$ ، $\cos x = 0,545$
 $\tan x = 0,602$ ، $\tan x = 0,707$ ، $\sin x = 0,5$

التمرين الثالث

بدون استعمال الآلة الحاسبة و بدون استعمال المنقلة ، أنشئ زاوية حادة xoy حيث $\tan xoy = 1,5$ ، $\sin xoy = \frac{3}{7}$ ، $\cos xoy = 0,2$.

التمرين الرابع

- ABC مثلث قائم في A .
(1) احسب BC حيث $AC = 9cm$ و $\hat{B} = 32^\circ$.
(2) احسب AC حيث $BC = 12cm$ و $\hat{B} = 68^\circ$.

التمرين الخامس

- انشئ المثلث ABC القائم في B حيث $AC = 10cm$ و $BC = 2,8cm$.
(1) احسب AB ثم احسب مدور إلى الدرجة لكل من الزاويتين $\hat{A}$ و $\hat{C}$.

التمرين السادس

RST مثلث قائم في S حيث $RS = 4cm$ و $ST = 6cm$.

العلاقات المترية

لتكن x قياس زاوية حادة .

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad / \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

استعمال الآلة الحاسبة

أمثلة :

(1) لحساب $\sin 40^\circ$ ، نضغط بدءا من اليسار على $\sin$ ، 4 ، 0 ، ونقرأ : $0,642787609$

(2) لحساب $\tan 40^\circ$ ، نضغط بدءا من اليسار على $\tan$ ، 4 ، 0 ، ونقرأ : $0,839099631$

(3) لحساب قياس $\hat{A}$ علما أن $\sin \hat{A} = 0,5$ ، نضغط بدءا من اليسار على $\sin^{-1}$ ، 0 ، $.$ ، 5 ، $2ndf$ ، 30 ، ونقرأ : 30

أي

$$\hat{A} = 30^\circ$$


لا تنسى أن تبيع الآلة على حسب وحدة الزاوية المطلوبة

(1) احسب مدور إلى الدرجة لكل من أقياس زوايا المثلث RST .

(2) أنشئ الشكل ثم تحقق بالمنقلة من النتائج المحصل عليها في السؤال الأول.

التمرين السابع

احسب المدور إلى الميليمتر لحيط كلا من الأشكال الآتية:



التمرين الثامن

(C) دائرة قطرها $[MN]$ حيث $MN = 6cm$

(1) عين النقطة P على الدائرة (C) حيث $NP = 4cm$.

(2) برهن أن المثلث MNP قائم في P .

(3) احسب مدور إلى الدرجة لقياس الزاوية MNP .

التمرين التاسع

(1) احسب $\sin x$ و $\tan x$ في كل من الحالتين:

$$a) \cos x = 0,6 \quad b) \cos x = \frac{2}{5}$$

(2) احسب $\cos x$ و $\tan x$ علما أن: $\sin x = \frac{3}{4}$.

(3) احسب $\sin x$ و $\tan x$ علما أن $\cos x = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

التمرين العاشر

(1) بدون استعمال المنقلة، أنشئ مثلث ABC قائم في B حيث

$$AB = 6cm \text{ و } \tan \hat{A} = \frac{2}{3}$$

(2) بدون استعمال المنقلة، أنشئ مثلثا ABC متساوي الساقين في A حيث

$$AB = 5,4cm \text{ و } \tan \hat{A} = 3$$

التمرين الحادي عشر

بسط العبارات الآتية:

a) $(\sin a + \cos a)^2 + (\sin a - \cos a)^2$.

b) $1 + \tan^2 a$.

c) $\frac{1}{\cos^2 a} - (1 - \tan^2 a)$

التمرين الثاني عشر

$ABCD$ مستطيل حيث $AB = 10cm$ و $AD = 6cm$ ، E نقطة من $[AB]$ حيث

$AE = 4cm$ و F نقطة من $[BC]$ حيث $BF = 4cm$.

(1)

(a) أنشئ الشكل.

(b) احسب كلا من $\tan \hat{AED}$ و $\tan \hat{BEF}$ ثم استنتج مدور إلى الدرجة لكل

من $\hat{AED}$ و $\hat{BEF}$.

(c) ماهي طبيعة المثلث DEF ؟

(II) ليكن x عدد موجب تماما (الوحدة هي السنتيمتر)، و ليكن

$A'B'CD'$ مستطيل حيث:

$$A'D' = x + 2 \text{ و } A'B' = x + 6$$


E' نقطة من $[A'B']$ حيث $A'E' = x$ و F' نقطة من $[B'C']$ حيث $B'F' = x$

(a) من أجل أي قيمة نحصل على المستطيل $ABCD$.

- (b) عبر عن كلا من $D'E'^2$ و $E'F'^2$ و $D'F'^2$ بدلالة x .
 (c) أوجد x حتى يكون المثلث $D'E'F'$ قائم في E' .

التمرين الثالث عشر

لبناء جسر، أراد مهندس معرفة عرض واد ولهذا رسم الشكل الآتي:




علما أن $\hat{ABD} = 90^\circ$ ، $\hat{BAC} = 22^\circ$ ، $\hat{BAD} = 60^\circ$ ، $AB = 100m$

- 1) احسب طول $[BC]$.
- 2) احسب طول $[BD]$.
- 3) استنتج عرض الواد.

التمرين الرابع عشر

إليك الشكل الآتي :




احسب كلا من: CH ، AH ، AB ، HB ، BC المقرب بالنقصان إلى $\frac{1}{10^2}$

التمرين الخامس عشر

اعتمادا على الشكل الآتي ، احسب α بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة علما أن

$CD = 7cm$ ، $AC = 3cm$ ، $AB = 1cm$



التمرين السادس عشر

ABC مثلث قائم في A حيث : $AB = 6cm$ و $AC = 9cm$

D نقطة من $[AC]$ حيث $AD = 4cm$

احسب $\cos \hat{ABD}$ ، $\tan \hat{ACB}$ ، $\tan \hat{ADB}$

الاشعة و الانسحاب

Vecteurs et translations

مفهوم الشعاع

A و B نقطتان مختلفتان من المستوي.

الانسحاب الذي يحول A إلى B يعرف شعاعا نرمز له بالرمز $\vec{V}$ مثلا ونكتب:

$$\vec{V} = \overrightarrow{AB}$$

الاتجاه من A إلى B هو اتجاه الشعاع $\vec{V}$.


• منحنى المستقيم (AB) هو منحنى الشعاع $\vec{V}$.

• طول القطعة $[AB]$ هو طول الشعاع $\vec{V}$.

تساوي شعاعين

الشعاعان المتساويان هما شعاعان لهما نفس المنحنى ونفس الاتجاه ونفس الطول.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$




خاصية 1:

$A_1 ; B_1 ; C_1 ; D_1$ أربع نقط من المستوي حيث D_1 و C_1 لا تنتميان إلى

المستقيم $(A_1 B_1)$

معناه الرباعي $A_1 B_1 C_1 D_1$ متوازي أضلاع.



خاصية 2:

$A_2 ; B_2 ; C_2 ; D_2$ أربع نقط من المستوي.

$\overrightarrow{A_2 B_2} = \overrightarrow{CD}$ معناه للقطعتين $[A_2 B_2]$ و $[CD]$ نفس المنتصف.



خاصية 3:

A و B نقطتان مختلفتان.

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ معناه M منتصف $[AB]$.



تركيب انسحابين (مجموع شعاعين)


$A ; B ; C$ ثلاث نقط من المستوي.

تركيب الانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$ متبوعا بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BC}$ هو

الانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$.

العلاقة $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ تسمى علاقة "شال"

الحالة الاولى




$$\begin{aligned} \vec{U} &= \overrightarrow{AB} & \vec{V} &= \overrightarrow{BC} \\ \vec{U} + \vec{V} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

تمارين المسئلة الحادية عشر


التمرين الاول

النش صورة المثلث ABC بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{U}$



التمرين الثاني

هل الدائرة (C') صورة الدائرة (C) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{AB}$ ؟ علل ؟



التمرين الثالث

C نقطة من دائرة مركزها O وقطرها $[AB]$.


لتكن A' ; B' ; C' ; O' صور النقط A ; B ; C ; O على الترتيب بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{OC}$.

(1) ما هي طبيعة المثلث ABC ؟ علل ؟


(2) ماذا نقول عن النقطة O' ؟

(3) برهن أن المثلث $A'B'C'$ قائم في C' .


الحالة الثانية



الحالة الثالثة



الحالة الرابعة



الشعاعان المتعاكسان

إذا كانت A و B نقطتان حيث $\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{0}$ فإن $\vec{AB}$ و $\vec{BA}$ شعاعان متعاكسان ونكتب $\vec{AB} = -\vec{BA}$. نسمي $\vec{0}$ الشعاع المعلوم.



التمرين الرابع

كلا من $ABCD$ و $BCEF$ متوازي الأضلاع

(1) ما هي صورة A بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$ متبوعا بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{FE}$ ؟

(2) ما هي صورة F بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{ED}$ متبوعا بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BC}$ ؟

التمرين الخامس

باستعمال علاقة شال ، أكمل الفراغات الآتية:

$$\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{EA} = \overrightarrow{OA} \quad / \quad \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} \quad / \quad \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

التمرين السادس

(1) انقل الشكل الآتي على ورقة ميليمترية ثم عين النقاط G ; F ; E حيث :

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{CB} \quad , \quad \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{BA} \quad , \quad \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BD}$$

(2) أكمل المساويات الآتية:

$$\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{EC}$$

$$\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{EB}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CA}$$

$$\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{FC}$$

$$\overrightarrow{FC} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{FD}$$



التمرين السابع

ABC مثلث متساوي الساقين حيث $AB = AC$.

M منتصف $[BC]$ و D نظيرة A بالنسبة إلى M .

(1) أنشئ الشكل.

(2) برهن أن الرباعي $ABDC$ معين.

(3) أنشئ النقطة E حيث $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$ ، ما هي طبيعة الرباعي $AFCB$ ؟

(4) برهن أن الشعاعين $\overrightarrow{EC}$ و $\overrightarrow{CD}$ متساويان.

التمرين الثامن

A ; B ; K ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة، لتكن L منتصف القطعة $[AB]$.

D نقطة حيث $BLKD$ متوازي أضلاع ، E نقطة حيث $\overrightarrow{LE} = \overrightarrow{LA} + \overrightarrow{LK}$.

برهن أن K منتصف $[ED]$.

التمرين التاسع

ABC مثلث، I ; J ; K منتصفات $[AC]$; $[BC]$; $[AB]$ على الترتيب.

(1) (a) برهن أن $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{KJ}$.

(b) استنتج أن $\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AK} + \overrightarrow{AI}$.

(2) اكتب كلا من $\overrightarrow{BK}$ و $\overrightarrow{CI}$ على شكل مجموع شعاعين.

(3) استنتج أن $\overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{BK} + \overrightarrow{CI} = \overrightarrow{0}$.

التمرين العاشر

$ABCD$ متوازي أضلاع، E نظيرة A بالنسبة إلى D و F نظيرة A بالنسبة إلى B .

(1) برهن أن $EF = 2DB$ ثم استنتج أن (EF) و (BD) متوازيان.

(2) برهن أن C منتصف $[EF]$.

التمرين الحادي عشر

ABC مثلث حيث $AB = 6$ ، $AC = 8$ ، $BC = 10$.

(1) بين أن المثلث ABC قائم.

(2) لتكن M منتصف $[BC]$ ، أنشئ النقطة H صورة A بالإنسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$.

(3) ما نوع الرباعي $AMHB$ ؟ استنتج الطول BH .

المعالم Les Repères

إحداثيات شعاع

M نقطة من المستوى المزود بالمعلم $(O, \vec{i}, \vec{j})$ بحيث $M(x; y)$.

إحداثيات النقطة M بالنسبة إلى هذا المعلم هما إحداثيات الشعاع $\vec{OM}$ ونرمز

لها بالرمز: $\vec{OM}(x; y)$.

أنواع المعالم




معلم متعامد



معلم متجانس $\vec{OI} = \vec{OJ}$



معلم غير متعامد وغير متجانس



معلم متعامد و متجانس

التمرين الثاني عشر

$EFGH$ مربع طول ضلعه 4cm .

(1) أكتب النقطة K صورة النقطة F بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{EG}$

(2) باهتمام نقط الشكل، احسب المجاميع:

$$\vec{EG} + \vec{KG} + \vec{GF} \quad / \quad \vec{EH} + \vec{EF} \quad / \quad \vec{EG} + \vec{GF}$$

التمرين الثالث عشر

D, C, B, A أربع نقط ليست على استقامة واحدة.

انقل وأتمم الفراغات الآتية:

$$\vec{CD} = \dots + \vec{BD} \quad / \quad \vec{AB} = \vec{AD} + \dots$$

$$\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{AD} + \vec{BC}$$

$$\vec{AC} + \vec{BD} = \vec{AD} + \vec{BC}$$

التمرين الرابع عشر

NOM مثلث متساوي الساقين قاعدته $[NO]$.

(1) اكتب النقطة I بحيث $\vec{MO} = \vec{NI}$

(2) بين أن القطعتين $[MI]$ و $[NO]$ متعامدتان.

قراءة إحداثيتي شعاع

تقرأ إحداثيتا شعاع بالازاحتين المتتاليتين اللتين تسمحان بالمرور من مبدأ الشعاع إلى نهايته.


الإزاحة الأولى تكون بالتوازي مع محور الفواصل.

الإزاحة الثانية تكون بالتوازي مع محور الترتيب.

نقرأ الإحداثية الأولى بالإزاحة الأولى (موجب، عندما تنتقل نحو اليمين وسالب، عندما تنتقل نحو اليسار).

نقرأ الإحداثية الثانية بالإزاحة الثانية (موجب، عندما تنتقل نحو الأعلى وسالب، عندما تنتقل نحو الأسفل)

مثال:



$$\overrightarrow{CD}(-2; -5) \quad / \quad \overrightarrow{AB}(+3; +2)$$

تمثيل شعاع بمعرفة إحداثيته

لتمثيل شعاع بمعرفة إحداثيته نعين الإزاحتين الموافقتين لإشارتي الإحداثيتين x و y لشعاع.

مثال: مثل الشعاعين: $\overrightarrow{AB}(+3; +4)$ و $\overrightarrow{CD}(-1; -4)$



الشعاعان المتساويان

$\overrightarrow{U}(x; y)$ و $\overrightarrow{V}(x'; y')$ شعاعان من مستو مزود بمعلم،

$$\overrightarrow{U} = \overrightarrow{V} \quad \text{معناه} \quad x = x' \quad \text{و} \quad y = y'$$

حساب إحداثيتي شعاع

نقطتان من مستو مزود بمعلم، $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$

إحداثيتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما $(x_B - x_A; y_B - y_A)$.

A و B نقطتان من مستو مزود بمعلم حيث $A(x_A; y_A)$ ، $B(x_B; y_B)$.

إحداثيتا M منتصف $[AB]$ هما $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$ و $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$.

حساب المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ومتجانس

في معلم متعامد ومتجانس، إذا كانت $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$

فإن المسافة بين A و B هو طول القطعة $[AB]$ حيث

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

تمارين السلسلة الثانية عشر

التمرين الأول

(1) علم النقطتين $A(-5; 2)$ و $B(3; -4)$ في معلم (O, I, J) ، ثم أنشئ الشعاع $\vec{U}(-1; 5)$ في نفس المعلم.

(2) احسب إحداثيتي النقطتين C و D صورتي B و A على الترتيب بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{U}$.

(3) ما طبيعة الرباعي $ABCD$ ؟ علل؟

التمرين الثاني

$A(-1; -2)$ ، $B(-4; 1)$ ، $C(1; 3)$ ثلاث نقط من معلم (O, I, J) .

(1) برهن أن النقطة $D(4; 0)$ هي صورة A الإنسحاب الذي شعاعه $\vec{BC}$.

(2) ما طبيعة الرباعي $ABCD$ ؟ احسب إحداثيتي M مركز تناظره.

التمرين الثالث

(O, I, J) معلم متعامد ومتجانس وحدته هي السنتيمتر.

(1) علم النقط $A(1; 4)$ ، $B(-1; 8)$ ، $D(9; 8)$.

(2) أوجد إحداثيتي كل من الأشعة $\vec{AB}$ ، $\vec{AD}$ ، $\vec{BD}$.

(3) احسب الأطوال AB ، AD ، BD .

(4) برهن أن المثلث ABD قائم في A .

(5) أنشئ النقطة C حيث $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$ ثم برهن أن

الرباعي $ABCD$ مستطيل.

التمرين الرابع

(O, I, J) معلم متعامد ومتجانس وحدته هي السنتيمتر.

(1) علم النقطة $A(5; -6)$ والنقطة M منتصف $[OA]$ ثم أوجد إحداثياتها.

(2) احسب إحداثيتي الشعاع $\vec{OM}$.

(3) استنتج دون الحساب إحداثيتي الشعاع $\vec{MA}$.

التمرين الخامس

(O, I, J) معلم متعامد ومتجانس وحدته هي السنتيمتر.

- علم النقطة $A(3; -4)$ والنقطة B نظيرة A بالنسبة إلى I ثم عين إحداثياتها.

- احسب إحداثيتي كلا من الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AI}$.

التمرين السادس

(O, I, J) معلم متعامد ومتجانس وحدته هي السنتيمتر.

- $A(-4; 5)$, $B(3; 4)$, $C(-3; -5)$ نقط من هذا المعلم.

- P , N , M منتصفات $[AB]$, $[BC]$, $[AC]$ على الترتيب.

- احسب إحداثيتي كل من الأشعة:

$$\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{PN}, \overrightarrow{BN}, \overrightarrow{NC}, \overrightarrow{MP}, \overrightarrow{AP}, \overrightarrow{PC}, \overrightarrow{MN}$$

- عين متوازيات الأضلاع في الشكل.

التمرين السابع

(O, I, J) معلم متعامد ومتجانس وحدته هي السنتيمتر.

- علم النقط $A(3; 5)$, $B(-1; \frac{5}{2})$, $C(2; -\frac{4}{3})$.

- احسب إحداثيتي النقطة D حيث $ABCD$ متوازي الأضلاع.

- احسب إحداثيتي النقطة E حيث $ABEC$ متوازي الأضلاع.

- احسب إحداثيتي النقطة F حيث $ACBF$ متوازي الأضلاع.

- احسب إحداثيتي كلا من الشعاعين $\overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{FA}$ ما ذا نستنتج؟


- برهن أن النقطة B منتصف القطعة $[EF]$ والنقطة C منتصف القطعة $[DE]$.

التمرين الثامن

(O, I, J) معلم متعامد ومتجانس وحدته هي السنتيمتر حيث A , B , C

ثلاث نقط منه.

- اقرأ إحداثيتي كلا من الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{OC}$ ثم استنتج نوع الرباعي $OABC$.



- أنشئ الرباعي $OA_1B_1C_1$ نظير الرباعي $OABC$ بالنسبة إلى محور الترتيب.

- أنشئ الرباعي $OA_2B_2C_2$ صورة الرباعي $OABC$ بالانسحاب الذي شعاعه $2\overrightarrow{BC}$.

التمرين التاسع

(O, I, J) معلم متعامد ومتجانس حيث $OI = OJ = 1cm$.

- علم النقط $A(2; 6)$, $B(-3; 3)$, $C(2; 0)$, $D(7; 3)$.

- احسب إحداثيتي كل من الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{DC}$, ثم برهن أن الرباعي $ABCD$ متوازي الأضلاع.

- احسب AB و AD (اعط النتيجة مضبوطة)، ماذا نقول عن الرباعي $ABCD$ ؟ علل؟

- أنشئ النقطة M مركز تناظر $ABCD$ ثم احسب إحداثياتها.

- ما هي صورة المثلث AMD بالتناظر المركزي مركزه M ؟

الدوران - الزوايا - المضلعات المنتظمة

Rotations - Angles - Polygones réguliers

صورة شكل بدوران


O نقطة من المستوي و x قياس زاوية وحدتها الدرجة ،
صورة نقطة M تختلف عن O هي النقطة M' بالدوران الذي
مركزه O وزاويته x

حيث $\widehat{MOM'} = x$ باتجاه معين و $OM' = OM$ ،

صورة النقطة O هي النقطة O .

أمثلة:

- صورة M' صورة M بالدوران الذي مركزه O
وزاويته 60° باتجاه عكس عقارب الساعة
الذي يسمى الاتجاه الموجب.



- صورة M' صورة M بالدوران الذي مركزه O وزاويته 40° باتجاه عقارب الساعة الذي يسمى الاتجاه السالب.



التمرين العاشر

($O;OI;OJ$) معلم متعامد ومتجانس للمستوي

(1) علم النقط $A(-1;6)$ ، $B(3;3)$ ، $C(-7;-2)$.

(2) بين أن المثلث ABC قائم .

(3) احسب إحداثيتي E منتصف $[AC]$.

(4) احسب طول المتوسط المتعلق بالضلع $[AC]$ في المثلث ABC .

التمرين الحادي عشر

A ، B ، C ثلاث نقط من المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس للمستوي.

حيث : $A(3;4)$ ، $B(-1;3)$ ، $C(+2;-3)$.

(1) احسب إحداثيتي E حيث : $\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} = \vec{0}$.

(2) احسب إحداثيتي D بحيث E منتصف $[AD]$.

(3) استنتج نوع الرباعي $ABDC$.

التمرين الثاني عشر

A ، B ، C ثلاث نقط من المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس للمستوي.

(1) علم النقط : $A(2;7)$ ، $B(1;0)$ ، $C(-2;4)$.

(C) دائرة مركزها B ونصف قطرها BC .

(2) بين أن (AC) مماس للدائرة (C) في النقطة C .

التمرين الثالث عشر

($O;OI;OJ$) معلم متعامد ومتجانس للمستوي.

(1) علم النقط $A(5;2)$ ، $B(2;6)$ ، $C(-6;0)$.

(2) بين أن المثلث ABC قائم .

(3) احسب إحداثيتي النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ مستطيلاً .

(4) احسب إحداثيتي النقطة I مركز تناظر $ABCD$.

خصائص

A, B, C ثلاث نقاط من المستوي، A', B', C' صورها على الترتيب بالدوران.

الدوران يحافظ على:

- (1) المسافات $A'B' = AB$
- (2) القياس الزوايا $A'B'C' = \angle ABC$
- (3) الاستقامية: إذا كانت A, B, C على استقامية فإن A', B', C' على استقامية كذلك.
- (4) المنتصفات: إذا كانت C منتصف $[AB]$ فإن C' منتصف $[A'B']$
- (5) المساحات: المثلثان ABC و $A'B'C'$ لهما نفس المساحة.

نتائج


الدوران يحول:

- (1) مستقيم إلى مستقيم ونصف مستقيم إلى نصف مستقيم.
- (2) قطعة مستقيم إلى قطعة مستقيم لهما نفس الطول.
- (3) مستقيمين متوازيين إلى مستقيمين متوازيين.
- (4) مستقيمين متعامدين إلى مستقيمين متعامدين.
- (5) دائرة إلى دائرة لهما نفس طول نصف القطر.

الزاوية المحيطية

A, B, C ثلاث نقاط من دائرة (C) مركزها O .

نقول عن الزاوية $\angle ABC$ أنها محيطية تحصر القوس $\widehat{AC}$ المرسوم بالأحمر في الشكل.



الزاوية المركزية

A و B نقطتان من دائرة (C) مركزها O .

نقول عن الزاوية الناتجة $\angle AOB$ أنها زاوية مركزية تحصر القوس $\widehat{AB}$ المرسوم بالأحمر في الشكل.

ونقول عن الزاوية المنعكسة $\angle AOB$ أنها زاوية مركزية تحصر القوس $\widehat{AB}$ المرسوم بالأسود في الشكل.



ملاحظة

- قياس الزاوية الناتجة $\angle AOB$ اصغر تماما من 180° .
- قياس الزاوية المنعكسة $\angle AOB$ اكبر تماما من 180° .

خاصية 1

قياس زاوية محيطية في دائرة هو نصف قياس الزاوية المركزية التي تحصر نفس القوس معها.


مثال:

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOC$$



كل الزوايا المحيطية في دائرة التي تحصر نفس القوس متقايسة.

$$\widehat{EAD} = \widehat{EBD} = \widehat{ECD}$$



المضلعات المنتظمة

نقول عن مضلع أنه منتظم إذا كانت كل زواياه متقايسة و كل أضلاعه لها نفس الطول.

أمثلة:

المثلث المتقايسة الأضلاع هو مضلع منتظم.

المربع هو مضلع منتظم.

خاصية:


كل مضلع منتظم محيط بدائرة تشمل كل رؤوسه.

أمثلة:




المربع ABCD

الدائرة المحيطة به




مثلث متقايس الأضلاع ABC

و الدائرة المحيطة به



السداسي المنتظم ABCDEF

و الدائرة المحيطة به



الخماسي المنتظم ABCDE

و الدائرة المحيطة به

تعاريف السلسلة الثالثة عشر

التمرين الأول

السداسي منتظم مركزه O.

(1) (a) ماهي صورة المثلث ODC بالدوران الذي مركزه O وزاويته 240°

في الاتجاه الموجب ؟

(b) ماهي صورة المثلث ODC بالدوران الذي مركزه O وزاويته 240°

في الاتجاه السالب ؟

(2) (a) ماهي صورة المثلث ODC بالدوران الذي مركزه E وزاويته 60°

في الاتجاه السالب ؟

التمرين الثاني

(1) أنشئ معين ABCD حيث $AC = 4cm$ و $BD = 2cm$ و O مركزه .

(2) أنشئ الرباعي $A'B'C'D'$ صورة المعين ABCD بالدوران الذي مركزه O

و زاويته 90° في الاتجاه الموجب ، ماهي طبيعته ؟

(3) احسب مساحة الرباعي $A'B'C'D'$.

التمرين الثالث

$ABCDE$ خماسي منتظم مركزه O حيث $OA = 10\text{cm}$

(1) احسب قياس الزاوية $\hat{AOB}$ بالدرجات ثم انشئ الخماسي $ABCDE$

(2) ارسم منصف الزاوية $\hat{AOB}$ يقطع $[AB]$ في H

ما هو قياس كلا من الزاويتين $\hat{AOH}$ و $\hat{AHO}$ ؟ علل ؟

(3) بين أن القيمة المضبوطة للطول AH بالسنتيمتر هي $10\sin 36^\circ$

ثم أعط مدورها إلى $\frac{1}{10}$

(4) احسب القيمة المضبوطة لمحيط الخماسي $ABCDE$ بالسنتيمتر ثم

أعط مدورها إلى $\frac{1}{10}$

(5) احسب المساحة المضبوطة للخماسي $ABCDE$ ثم أعط مدورها إلى

المليمتر مربع.

التمرين الرابع

$ABCDEFGH$ مضلع منتظم مركزه O حيث $AB = 2\text{cm}$

(1) بين أن $\hat{ABC} = 144^\circ$

(b) انشئ المضلع $ABCDEFGH$ ومركزه O

(c) احسب محيطه.

(2) ليكن O' منتصف $[AB]$

(a) احسب OO' ومساحة المثلث ABO

(b) احسب مساحة المضلع $ABCDEFGH$

التمرين الخامس

(C) دائرة، $A ; B ; C ; D$ رابع نقط منها حيث $ABCD$ شبه منحرف

قاعدته $[AB]$ و $[CD]$

لتكن I نقطة تقاطع قطري شبه المنحرف $ABCD$

(1) انشئ الشكل.

(2) برهن أن $\hat{ABD} = \hat{ACD} = \hat{CAB} = \hat{CDB}$

(3) ما هي طبيعة كلا من المثلثين DCI و ABI ؟

التمرين السادس

(1) (a) انشئ مثلث AOB متقايس الأضلاع طول ضلعه 5cm

(b) انشئ النقطة K نظيرة B بالنسبة إلى O

(c) انشئ النقطة S نظيرة B بالنسبة إلى (OA)

(2) (a) انشئ النقطة T حيث $\vec{AT} = \vec{AO} + \vec{AB}$

(b) انشئ النقطة E حيث $\vec{AE} = \vec{AO} + \vec{AO}$

(3) ارسم المضلع $BASKET$. ما هي طبيعته ؟

التمرين السابع

(C) دائرة مركزها O

$A ; B ; C ; D ; E$ نقط من الدائرة (C)

حيث $\hat{AOB} = 70^\circ$ و $\hat{BDC} = 30^\circ$

(1) احسب قياس الزاوية $\hat{AEB}$

(2) احسب أقياس الزوايا المثلث BOC

(3) ما هو قياس الزاوية $\hat{ADC}$



التمرين الثامن

(C) دائرة مركزها O

احسب قياس الزاويتين $\hat{AOB}$ و $\hat{ACB}$ علما أن :

$$\hat{CAB} = (x + 2)^\circ \quad \hat{AOB} = (2x + 34)^\circ$$

$$\hat{ABC} = (3x + 6)^\circ$$




الهندسة في الفضاء La Géométrie dans L'Espace

الكرة والجلّة

O نقطة من الفضاء و R عدد موجب تماما معلوما.

- الكرة التي مركزها O ونصف قطرها R هي مجموعة من النقاط A في الفضاء متساوية المسافة عن النقطة O حيث $OA = R$.
- الجلّة التي مركزها O ونصف قطرها R هي مجموعة من النقاط A في الفضاء أصغر من أو يساوي R حيث $OA \leq R$.



تسمى الدوائر الكبرى

خصائص

مساحة كرة نصف قطرها R تساوي $4\pi R^2$

حجم جلّة نصف قطرها R تساوي $\frac{4}{3}\pi R^3$

مقطع جلّة بمستو

مقطع جلّة بمستو P هو دائرة :

التمرين التاسع

$ABCDEF$ سداسي منتظم مركزه O . ما هي صورة المثلث OAB ؟


(1) التناظر المحوري بالنسبة إلى (DA) ؟

(2) التناظر المركزي ذي المركز O ؟

(3) الانسحاب بالشعاع FG ؟

(4) الدوران الذي المركز O

و الزاوية 60° في الاتجاه السالب ؟



التمرين العاشر

لتكن الدائرة التي مركزها O وقطرها $[DB]$.

احسب : $\hat{AOD}$, $\hat{DCA}$, $\hat{ADB}$, $\hat{AOB}$

حيث $\hat{ACB} = 35^\circ$




التمرين الحادي عشر

$\hat{XOY}$ زاوية قياسها 70° .

أنشئ الزاوية $\hat{X'OY'}$ صورة $\hat{XOY}$ بالدوران الذي مركزه O

وزاويته 50° في الاتجاه الموجب . ماذا تلاحظ ؟

- مركزها H ، حيث H نقطة تقاطع المستوي P والمستقيم العمودي على P الذي يشمل O .
- نصف قطرها r حيث $r = \sqrt{R^2 - OH^2}$.





حالات خاصة

- (1) عندما يقطع مستو جلة في مركزها O ، تكون النقطتان O و H متطابقتان والمقطع هو إحدى الدوائر الكبرى.
- (2) عندما يكون $OH = R$ ، الجلة والمستوي يتقاطعان في نقطة واحدة. نقول ان المستوي مماس للجلة.


مقطع مستو بمكعب أو بمتوازي المستطيلات

مقطع مكعب أو متوازي المستطيلات بمستو مواز لأحد الأوجه أو أحد الأحرف هو مستطيل.



مقطع مستو بأسطوانة دوران

- مقطع أسطوانة دوران بمستو مواز لمحورها هو مستطيل.
- مقطع أسطوانة دوران بمستو عمودي على محورها هو دائرة.



مقطع

التكبير والتصغير

- التكبير الذي معاملته k لجسم هو التحويل (بعملية الضرب في k) لكل أضلاع هذا الجسم حيث $k > 1$.
- التصغير الذي معاملته k لجسم هو التحويل (بعملية الضرب في k) لكل أضلاع هذا الجسم حيث $k < 1$.

أمثلة:

- تكبير مستطيل بعده 6cm و 4cm بمعامل 3 هو مستطيل بعده 18cm و 12cm .
- تصغير دائرة نصف قطرها 8cm بمعامل 0.7 هو دائرة نصف قطرها 5.6cm .

ملاحظة :


عند تكبير أو تصغير معاملته k ،
نضرب المساحات في k^2 و الحجوم في k^3

أمثلة :

تصغير مساحة $36cm^2$ بمعامل $0,2$ هي المساحة $136 \times (0,2)^2$ اي $1,44$.
تكبير حجم $27cm^3$ بمعامل 2 هو الحجم 27×2^3 اي 216 .


مقطع هرم أو مخروط دوران بمستوى

- مقطع هرم أو مخروط دوران بمستوى مواز لقاعدتيهما هو تصغير لقاعدتي الهرم أو المخروط الدوران.
- الهرم الصغير أو المخروط الدوران الصغير المحصل عليهما هو تصغير كلا من الهرم و المخروط الدوران .
- نسبة معامل التصغير k تساوي نسبة احد أطوال الهرم الصغير أو المخروط الدوران على احد أطوال الهرم الكبير أو المخروط الدوران الكبير



$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{SA}{SA'} = \frac{O'A'}{OA} = \dots$$

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{SA'}{SA} = \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'O'}{AO} = \dots$$



تمارين السلسلة الرابعة عشر

التمرين الاول

احسب نصف قطر جلة حيث حجمها يساوي $288mdm^3$.

التمرين الثاني

علما أن 1 لتر من الماء يعطينا 1,09 لترا من الثلج (glace) ، ما هو عدد الجلات الثلجة قطرها $3cm$ التي ممكن استخراجها من 1 لتر من الماء ؟

التمرين الثالث

جلة قطرها $8cm$ موضوعة داخل مكعب حرفه $8cm$.

احسب حجم المكان داخل المكعب الغير مستغل من الجلة ؟

التمرين الرابع


كرة مركزها O و نصف قطرها $75mm$ مقطوعة بمستوى .

المقطع الناتج هو دائرة نصف قطرها $60mm$ ، احسب المسافة بين O و المستوي .

التمرين الخامس

إليك الشكل الآتي الذي يمثل متوازي المستطيلات المقطوع بمستو مواز للحرف $[BC]$

حيث $KE = 15cm$ ، $HK = 20cm$ ، $EF = 25cm$



(1) ما هي طبيعة المقطع $EFGH$ ؟

(2) احسب HE . ماذا تستنتج ؟

التمرين السادس

إناء على شكل مخروط دوران أبعاده : $OM = 5cm$ و $OS = 10cm$.


(1) احسب بالسنتيمتر مكعب حجم الإناء (أعط قيمة تقريبية إلى $\frac{1}{10}$) .

(2) نملأ هذا الإناء بالماء حتى النقطة O' حيث $SO' = 5,3cm$.

مع العلم أن المخروط الدوران المشكل من الماء هو تصغير للإناء كله،

(a) ما هو معامل التغير ؟

(b) احسب القيمة التقريبية إلى السنتيمتر مكعب لحجم الماء .



التمرين السابع

وحدة الطول هي السنتيمتر ووحدة الحجم هي السنتيمتر مكعب.


ليكن h ارتفاع الماء الموجود داخل أسطوانة دوران نصف قطرها 8 وارتفاعها 15 كما هو مبين في الشكل (1).

نضع في قاع الأسطوانة جلة نصف قطرها 6، بعد ذلك نلاحظ أن الأسطوانة امتلأت إلى آخرها كما هو مبين في الشكل (2).


(1) احسب بدلالة π حجم الأسطوانة الدوران .

(2) احسب القيمة المضبوطة لحجم الجلة.

(3) استنتج من الأسئلة السابقة الارتفاع h للماء داخل الأسطوانة قبل أن نضع الجلة.



شكل (1)



شكل (2)


التمرين الثامن

في مجمع العلوم توجد قاعة كبيرة للسينما مسماة

« La Géode » على شكل كرة نصف قطرها 18m، موضوعة

على الأرض كما هو مبين في الشكل.

$M\hat{H}O = 90^\circ$ / $M\hat{O}H = 52^\circ$ / $OM = 18m$




ملاحظة: دور كل النتائج إلى الوحدة:

- (1) احسب طول $[OH]$.
- (2) احسب الطول HM .
- (3) احسب الارتفاع الكلي لهذه القاعدة.
- (4) ماهي طبيعة و أبعاد مقطع القاعدة على الأرض؟ ثم احسب مساحة هذا المقطع.

التمرين التاسع

لديك الشكل الآتي المتكون من مخروط دوران قمته S و ارتفاعه 16cm ، قاعدته دائرة مركزها O و نصف قطرها $2,7\text{cm}$.



- (1) احسب حجم المخروط الدوران (النتيجة مقربة إلى السنتيمتر مكعب)
- (2) هذا المخروط موضوع داخل علبة على شكل متوازي المستطيلات. نملأ العلبة بالماء حتى ارتفاع $EFGH$ كما هو مبين في الشكل. الجهة الواقعة خارج العلبة للمخروط الدوران قاعدتها دائرة مركزها O' في المستوي $EFGH$.

(a) احسب $\frac{SO'}{SO}$

- (b) احسب حجم كل من الجهتين الخارجية و الداخلية للمخروط الدوران.

التمرين العاشر


المجسم $ABCDEFGHIJKL$ موشور قائم قاعدته سداسي منتظم، ارتفاعه 3cm .

- (1) احسب حجم هذا الموشور القائم إذا علمت أن مساحة قاعدته هي 4160m^2 .

- (2) كيف يصبح حجمه بعد تصغيره إلى ربع؟

- (3) نقطع هذا المجسم بالمستوي (P) الموازي لقاعدته.

ما هي طبيعة هذا المقطع؟ وما هي مساحته؟



التمرين الحادي عشر

ليكن المربع $ABCD$ ذو المساحة $12m^2$.

ما هي مساحة المربع المصغر $EFGH$ بالمعامل $\frac{1}{2}$ للمربع $ABCD$ ؟

التمرين الثاني عشر

مخروط دوراني نصف قطر قاعدته $51cm$ وارتفاعه $33cm$.

(1) احسب حجمه .

(2) احسب حجم المخروط الدوراني المتحصل عليه بعد تصغير

هذا المخروط إلى الثلث.

التمرين الثالث عشر


جلة قطرها $10cm$ ، كتلتها $300g$.

احسب كتلة جلة مصنوعة من نفس المادة والتي نصف قطرها $30cm$ ؟

التمرين الرابع عشر

ليكن كاس القهوة المقابل على شكل أسطوانة قاعدته عبارة عن قرص طول

قطره $D = 6,2cm$ وارتفاعه $h = 4cm$.



(1) احسب V حجم هذا الكأس ثم دور الناتج إلى $0,1cm^3$.

(2) علما أن كل كأس يملأ بـ 90% من حجمه الكلي ، احسب V' حجم

القهوة الموجودة في كل كأس ثم دور الناتج إلى $0,1cm^3$.

(3) كم من كأس قهوة يمكننا أن نقدمه لمجموعة من الضيوف إذا كان

لنا إبريق به $\frac{1}{2}$ نصف لتر من القهوة (نعتبر $1000cm^3 \rightarrow 1L$) .


الرباعيات

المساحة
 $\frac{(B+b)h}{2}$

شبه المنحرف

المساحة
 $C \times h'$


متوازي الأضلاع



المستطيل

المساحة
 $L \times l$

المربع
المساحة
 C^2




المساحة
 $\frac{D \times d}{2}$

المعين


بعض قوانين الهندسة

المثلثات



المساحة: $\frac{C \times h}{2}$


الدائرة - القرص



محيط الدائرة: $2\pi R$
مساحة القرص: πR^2

الموشور القائم

الحجم: $B \times h$



الاسطوانة الدوران


المساحة الجانبية:

$$2\pi R h$$

الحجم: $\pi R^2 h$



الكرة - الجلة




مساحة الكرة: $4\pi R^2$

حجم الجلة: $\frac{4}{3}\pi R^3$

الهرم

الحجم:


$$\frac{B \times h}{3}$$



المخروط الدوران


المساحة الجانبية: $\pi R g$

الحجم: $\frac{\pi R^2 h}{3}$




متوازي المستطيلات

الحجم: $l \times L \times h$



المكعب

الحجم: C^3



التمرين الأول

لتكن الأعداد A ، B ، C حيث : $A = \sqrt{80}$ ، $B = 2\sqrt{45}$ ، $C = \sqrt{5} + 1$

(1) اكتب $A + B$ على شكل $a\sqrt{b}$ حيث a عدد طبيعي .

(2) بين أن $A \times B$ هو عدد طبيعي .

(3) اكتب $\frac{C^2}{\sqrt{5}}$ على شكل نسبة مقامها عدد فائق .

التمرين الثاني

لتكن العبارة E حيث : $E = 2x - 10 - (x - 5)^2$

(1) انشر ثم بسط العبارة E .

(2) حل العبارة E .

(3) حل المعادلة $(x - 5)(7 - x) = 0$.

التمرين الثالث

$[AB]$ قطعة مستقيم طولها 6cm .

(1) انشئ النقطة C صورة B بالدوران الذي مركزه A وقيس زاويته 90° في

اتجاه عكس عقارب الساعة .

(2) مانوع المثلث ABC ؟ (برر إجابتك)

(3) أوجد الطول BC .

التمرين الرابع

(1) حل الجملة التالية :

$$\begin{cases} x + y = 14 \\ x + 4y = 32 \end{cases}$$

(2) أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 500 و 125 .

(3) ملأ تاجر 4000g من الشاي في علب من صنف 125g و صنف 500g .

إذا علمت أن العدد الكلي للعلب هو 14 ، أوجد العلب لكل صنف .

(لاحظ أن $4000 = 32 \times 125$) .

المسألة:

تم بناء خزان للماء على شكل اسطوانة دورانية نصف قطرها 5m وارتفاعها 4m لتزويد مسبح على شكل متوازي مستطيلات بعدد قاعدته 20m و 6m وارتفاعه 2m .

(1) احسب سعة كل من الخزان و المسبح . (فاخذ $\pi = 3,14$) .

(2) إذا علمت أن الخزان مملوء تماما و المسبح فارغ تماما و تدفق الماء في

المسبح هو $(12\text{m}^3/\text{h})$ أي 12m^3 في الساعة ، احسب كمية الماء

المتدفقة في المسبح و كمية الماء المتبقية في الخزان بعد مرور ثلاث

ساعات .

(3) افترض أن الخزان مملوء (سعته 314m^3) و المسبح فارغ . نسمي

$f(x)$ كمية الماء المتبقية في الخزان و $g(x)$ كمية الماء المتدفقة في

المسبح بالتر المتكعب بعد مرور x ساعة .

- أوجد العبارة $g(x)$ ثم استنتج العبارة $f(x)$ بدلالة x .

(4) نعتبر الدالتين f و g حيث :

$$f(x) = 314 - 12x$$

$$g(x) = 12x$$

(أ) ارسم التمثيل البياني لكل من الدالتين f و g في معلم متعامد

ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.



(يؤخذ : 1cm يمثل 4h على محور الفواصل و 1cm يمثل 50m^3 على محور

التراتب)

(ب) أوجد الوقت المستغرق لملء المسبح .

(ج) حل المعادلة : $f(x) = g(x)$. ماذا يمثل حل هذه المعادلة ؟

حلول التمارين



حل تمارين السلسلة الأولى

حل التمرين الأول

$$A = \frac{1}{5} - \frac{3}{10} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{1}{5} - \frac{3}{60} + \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{1}{5} - \frac{1}{20} + \frac{1}{2}$$

$$A = \frac{13}{20} \text{ ومنه } A = \frac{4-1+10}{20}$$

حل التمرين الثاني

$$A = 3 \times 10 \times 10^3 + 2 \times 10^3 - 5 \times 10^3 \times 10^{-4} \text{ (I)}$$

$$A = (30 + 2 - 0,0005) \times 10^3$$

$$A = 31,9995 \times 10^3 \text{ اي } A = 3,19995 \times 10^4$$

$$C = \frac{4 \times 10^3 \times 10^3 - 2 \times 10^3}{5 \times 10^{-1}} \text{ اي } C = \frac{398 \times 10^3 \times 10^1}{5}$$

$$5000 = 5 \times 10^3 \text{ دقة. (II)}$$

$$5 \times 10^3 \times 24 \times 365 \times 80 = 3504000 \times 10^3$$

$$= 3,504 \times 10^6 \times 10^3$$

ومنه عدد دقات قلب إنسان لمدة 80 سنة هو $3,504 \times 10^9$

$$B = \frac{\frac{1}{2} + \frac{7}{12}}{\frac{6}{5} - \frac{15}{15}} = \frac{\frac{6+1}{12}}{\frac{25-8}{30}}$$

$$B = \frac{12}{17} = \frac{7}{12} \times \frac{5}{17}$$

$$B = \frac{35}{34}$$

$$B = \frac{3 \times 10^4 \times 2 \times 10^3}{5 \times 10^{-1}}$$

$$B = \frac{6 \times 10^7 \times 10^1}{5}$$

$$B = 1,2 \times 10^8$$

$$C = \frac{(400-2) \times 10^3}{5 \times 10^{-1}}$$

$$C = 7,96 \times 10^5 \text{ ومنه } C = 79,6 \times 10^4 \text{ اي } C = \frac{398 \times 10^3 \times 10^1}{5}$$

كما أنه يمكن حل هذا التمرين على الشكل التالي:

حساب دقات قلب الإنسان لمدة يوم واحد أي: 24 ساعة

$$5000 \times 24 = 120\,000 = 12 \times 10^4$$

حساب دقات قلب الإنسان لمدة سنة أي: 365 يوما

$$365 \times 12 \times 10^4 = 438 \times 10^5$$

حساب دقات قلب الإنسان لمدة 80 سنة:

$$438 \times 10^5 \times 80 = 35040 \times 10^5 = 3504 \times 10^6 = 3,504 \times 10^9$$

حل التمرين الثالث

$$PGCD(7404; 1234) = 1234 \text{ إذن } 7404 = 1234 \times 6 + 0$$

$$140 - 35 = 105 / 175 - 140 = 35 / 315 - 140 = 175$$

$$35 - 35 = 0 / 70 - 35 = 35 / 105 - 35 = 70$$

$$PGCD(315; 140) = 35 \text{ ومنه}$$

حل التمرين الرابع

$$PGCD(2448; 1872) = 144 \text{ إذن } 2448 = 1872 \times 1 + 576$$

$$\frac{2448}{1872} = \frac{2448 + 144}{1872 + 144} = \frac{17}{13} \text{ ومنه } 1872 = 576 \times 3 + 144$$

$$576 = 144 \times 4 + 0$$

$$PGCD(4263; 343) = 49 \text{ إذن } 4263 = 343 \times 12 + 147$$

$$\frac{-343}{-4263} = + \frac{343 + 49}{4263 + 49} = \frac{7}{87} \text{ ومنه } 343 = 147 \times 2 + 49$$

$$147 = 49 \times 3 + 0$$

حل التمرين الخامس

$$PGCD(1968; 1789) = 1 \text{ ومنه } 1968 = 1789 \times 1 + 179$$

$$1789 = 179 \times 9 + 178$$

$$1779 = 178 \times 1 + 1$$

$$178 = 1 \times 178 + 0$$

$$1793 = 987 \times 1 + 806$$

$$85 = 11 \times 7 + 8$$

$$11 = 8 \times 1 + 3$$

$$3 = 2 \times 1 + 1$$

$$2 = 1 \times 2 + 0$$

$$987 = 806 \times 1 + 181$$

$$806 = 181 \times 4 + 85$$

$$181 = 85 \times 2 + 11$$

ومنه $PGCD(1793; 987) = 1$ اي 1793 و 987 أوليان فيما بينهما

حل التمرين السادس

$$B = \frac{3^{48}}{3^{52}} = \frac{3^{48}}{3^{48} \times 3^4} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81} \quad / \quad A = 0,15 = \frac{15}{100} = \frac{15+5}{100+5} = \frac{3}{20}$$

$$C = \frac{10-5}{10+5} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3} \quad /$$

$$D = 300 \times 10^{-3} - 8 \times 10^2 = 3 \times 10^2 \times 10^{-3} - 8 \times 10^2$$

$$= 10^2 \times (3 \times 10^{-3} - 8) = 10^2 (0,003 - 8)$$

$$= 10^2 \times (-7,997)$$

$$= -799,7 = -\frac{7997}{10}$$

حل التمرين السابع

$$A = \frac{6 \times 100 - 2}{14 \times 100 - 5} = \frac{598}{1395}$$

$PGCD(598; 1395) = 1$ اي ان 598 و 1395 أوليان فيما بينهما

ومنه الكسر $\frac{598}{1395}$ غير قابل للاختزال.

حل التمرين الثامن

$6n+12 = 6 \times (n+2)$ اي ان $6n+12$ مضاعف لكل من 6 و $n+2$.

ومنه كلا من 6 و $n+2$ قاسم لـ $(6n+12)$.

$5n^3 + 15n^2 = 5 \times n^2 \times (n+3)$ اي ان $5n^3 + 15n^2$ مضاعف لكل من 5 و n^2 و $n+3$.

و n^2 و $n+3$

حل التمرين التاسع

$$110 - 88 = 22 \quad / \quad 88 - 22 = 66 \quad / \quad 66 - 22 = 44 \quad / \quad 44 - 22 = 22$$

$$PGCD(110; 88) = 22 \quad \text{ومنه} \quad 22 - 22 = 0$$

(1) طول كل قطعة مربعة هو $22cm$

(2) مساحة القطعة الحديدية هي $110 \times 88 = 9680cm^2$

$$22 \times 22 = 484cm^2 \quad \text{مساحة المربع هي}$$

$$9680 \div 484 = 20 \quad \text{عدد المربعات التي نحصل عليها من القطع هي}$$

حل التمرين العاشر

$$5815 = 3489 \times 1 + 2326 \quad / \quad 3489 = 2326 \times 1 + 1163 \quad / \quad 2326 = 1163 \times 2 + 0$$

(1) $PGCD(5815; 3489) = 1163$ إذن أكبر عدد ممكن من الباقيات هو 1163.

(2) عدد الورود في كل باقة هو 5. $5815 \div 1163 = 5$

(3) عدد الخزاميات في كل باقة هو 3. $3489 \div 1163 = 3$

(4) ثمن كل باقة هو $20 \times 5 + 15 \times 3 = 100 + 75 = 175DA$

حل التمرين الحادي عشر

$$x = 10^2 \times 10^1 \times 3^2 \times 3^3 \times 8^1 \times 8^3 \quad (1)$$

$$x = 10^2 \times 3^2 \times 8^3 \times 10^1 \times 3^2 \times 8^1$$

$x = y \times 720$ ومنه y قاسم لـ x .

$$x = 2^3 \times 2^1 \times 11^1 \times 11^1 \times 7^2 \times 7^2 \times 5 \quad (2)$$

$$x = 2^3 \times 11^1 \times 7^2 \times 2^1 \times 11^1 \times 7^2 \times 5$$

$x = y \times 5390$ ومنه y قاسم لـ x .

حل التمرين الثاني عشر

$$A = \frac{1}{18+20} = \frac{1}{38} = \frac{45}{45 \times 38}$$

حل تمارين السلسلة الثانية

حل التمرين الأول

$$\sqrt{121+23} = \sqrt{144} = 12 \text{ لأن } \sqrt{121+23} = 12$$

$$\sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6 \text{ لأن } \sqrt{3 \times 12} = 6$$

$$\sqrt{1296 + 2304} = \sqrt{3600} = \sqrt{36 \times 100} = 6 \times 10 = 60$$

$$\sqrt{3 \times 1 \times 5} = \sqrt{15}$$

$$\sqrt{1000 - 3 \times 125} = \sqrt{1000 - 375} = \sqrt{625} = 25 \text{ لأن } \sqrt{1000 - 3 \times 125} = 25$$

حذار الأولوية للضرب

حل التمرين الثاني

المربع التام هو عدد كل قواه زوجية

$$\text{مربع تام} \leftarrow a = 2^3 \times 3 \times 3 \times 2 = (2)^2 \times 3 = 2^4 \times 3^2$$

$$\text{مربع تام} \leftarrow b = 2^2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 3^2 = 2^4 \times 3^4$$

$$\text{مربع تام} \leftarrow c = 5 \times 3 \times 2^2 \times 3 \times 5 = 5^2 \times 3^2 \times 2^2$$

حل التمرين الثالث

• مقارنة العددين $10\sqrt{12}$ و $12\sqrt{10}$ نقارن مربعيهما بما أنهما موجبان.

$$\begin{cases} (10\sqrt{12})^2 = 100 \times 12 = 1200 \\ (12\sqrt{10})^2 = 144 \times 10 = 1440 \end{cases} \text{ ومنه } 10\sqrt{12} \neq 12\sqrt{10}$$

• مقارنة العددين $10\sqrt{12}$ و $2\sqrt{300}$ نبسط كلا منهما .

$$10\sqrt{12} = 2\sqrt{300} \text{ ومنه } \begin{cases} 10\sqrt{12} = 10\sqrt{4 \times 3} = 10 \times 2\sqrt{3} = 20\sqrt{3} \\ 2\sqrt{300} = 2 \times \sqrt{3 \times 100} = 2 \times 10\sqrt{3} = 20\sqrt{3} \end{cases}$$

$$B = \frac{\frac{7}{3} + \frac{2}{9}}{\frac{7}{4} - \frac{2}{8}} = \frac{\frac{70+2}{9}}{\frac{14-9}{8}} = \frac{72}{5} = \frac{72}{30} \times \frac{8}{5} = \frac{288}{75} = \frac{96}{25}$$

حل التمرين الثالث عشر

بتفكيك العدد 1617 نحصل على $1617 = 3 \times 7 \times 7 \times 7$

الحالة الأولى: $(3 \times 7) \times (7 \times 7)$ أي 21×49 ومنه $a = 21$ و $b = 49$

أو $a = 49$ و $b = 21$

الحالة الثانية: $7 \times (7 \times 7 \times 3)$ أي 21×49 ومنه $a = 21$ و $b = 49$

أو $a = 49$ و $b = 21$

حل التمرين الرابع عشر

$$B = \frac{3 \times 10^{-2} \times 10^4}{1,5} - 2 \times 10^2$$

$$A = 4,2 \times 10^{-3} + 15,6 \times 10^{-3}$$

$$B = 2 \times 10^2 - 2 \times 10^2$$

$$A = (4,2 + 15,6) \times 10^{-3}$$

$$B = 0$$

$$A = 19,8 \times 10^{-3} = 0,0198$$

حل التمرين الرابع

إذا كان $1 \leq a \leq 10$ فإن $1^2 \leq a^2 \leq 10^2$ أي $1 \leq a^2 \leq 100$
 إذا كان $10^2 \leq b \leq 10^3$ فإن $10^4 \leq b^2 \leq 10^6$ أي $10000 \leq b^2 \leq 1000000$
 إذا كان $4 \leq c \leq 9$ فإن $\sqrt{4} \leq \sqrt{c} \leq \sqrt{9}$ أي $2 \leq \sqrt{c} \leq 3$
 إذا كان $16 \leq d \leq 18$ فإن $\sqrt{16} \leq \sqrt{d} \leq \sqrt{18}$ أي $4 \leq \sqrt{d} \leq 3\sqrt{2}$

حل التمرين الخامس

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{5^2 \times 10^4} = 5 \times 10^2 = 500 \\ b &= \sqrt{9^2 \times 10^2} = 9 \times 10 = 90 \\ c &= \sqrt{121 \times 10^{-4}} = \sqrt{11^2 \times (10^{-2})^2} = 11 \times 10^{-2} = 0,11 \\ d &= \sqrt{10^{-2}} = \sqrt{(10^{-1})^2} = 10^{-1} = 0,1 \\ e &= \sqrt{36 \times 10^{-1} \times 10^{-3}} = \sqrt{6^2 \times (10^{-2})^2} = 6 \times 10^{-2} = 0,06 \end{aligned}$$

حل التمرين السادس

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{\frac{8 \times 3}{27 \times 50}} = \sqrt{\frac{2^2 \times 2 \times 3}{3^3 \times 3 \times 2 \times 5^2}} = \frac{2}{3 \times 5} = \frac{2}{15} \\ B &= \sqrt{\frac{2^4 \times 2 \times 3^4}{2^2 \times 2 \times 3^6}} = \frac{2^2 \times 3^2}{2 \times 3^3} = \frac{2 \times 2 \times 3^2}{2 \times 3^2 \times 3} = \frac{2}{3} \\ C &= \sqrt{\frac{7^2 \times 10 \times 10^3}{3 \times 10^2 \times 2^2 \times 3 \times 10^4}} = \sqrt{\frac{7^2 \times 10^4}{3^2 \times 2^2 \times 10^6}} = \frac{7 \times 10^2}{3 \times 2 \times 10^2 \times 10} = \frac{7}{60} \end{aligned}$$

حل التمرين السابع

إذا كان عرض المستطيل x فإن طوله $2x$.

$$2x \times x = 16562 \quad \text{أي} \quad 2x^2 = 16562 \quad \text{أي} \quad x^2 = \frac{16562}{2}$$

$$x^2 = 8281 \quad \text{ومنه} \quad x = \sqrt{8281} \quad \text{أي} \quad x = 91$$

وبالتالي عرض المستطيل هو $91m$ وطوله هو

$$91 \times 2 = 182m$$

الحل السائب لا يؤخذ
لأن x طول فهو موجب

حل التمرين الثامن

$$2x = 3\sqrt{3} + \sqrt{3} \quad \text{أي} \quad 2x = 4\sqrt{3} \quad \text{أي} \quad x = \frac{4\sqrt{3}}{2} \quad \text{ومنه} \quad x = 2\sqrt{3}$$

$$-3x^2 = 6 - 12 \quad \text{أي} \quad -3x^2 = -6 \quad \text{أي} \quad x^2 = \frac{-6}{-3} = 2 \quad \text{أي} \quad x^2 = 2$$

$$\text{ومنه} \quad x = +\sqrt{2} \quad \text{أو} \quad x = -\sqrt{2}$$

$$-2x^2 = 0 \quad \text{ومنه} \quad x = 0$$

$$\sqrt{b} = \frac{2}{3} \quad \text{أي} \quad b = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \quad \text{ومنه} \quad b = \frac{4}{9}$$

$$x^2 - 8 = 8 \quad \text{أي} \quad x^2 = 8 + 8 \quad \text{أي} \quad x^2 = 16$$

$$\text{ومنه} \quad x = +4 \quad \text{أو} \quad x = -4$$

$$\sqrt{u^2} - 4 = 2 \quad \text{أي} \quad \sqrt{u^2} = 2 + 4 \quad \text{أي} \quad \sqrt{u^2} = 6$$

$$\text{ومنه} \quad u = +\sqrt{6} \quad \text{أو} \quad u = -\sqrt{6}$$

$$b^2 = 5\sqrt{11} + 9 - \sqrt{5^2 \times 11} \quad \text{أي} \quad b^2 = 5\sqrt{11} + 9 - \sqrt{275}$$

$$\text{أي} \quad b^2 = 5\sqrt{11} - 5\sqrt{11} + 9 \quad \text{أي} \quad b^2 = +9$$

$$\text{ومنه} \quad b = +3 \quad \text{أو} \quad b = -3$$

$$x\sqrt{2} - 2x\sqrt{2} = 3 + 1 \quad \text{أي} \quad x\sqrt{2} - 3 = 2x\sqrt{2} + 1$$

$$x = \frac{-4}{\sqrt{2}} = -2\sqrt{2}$$

حل التمرين التاسع

$$B = \frac{-2 \times \sqrt{2}}{5\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{-2\sqrt{2}}{10} = \frac{-\sqrt{2}}{5} \quad / \quad A = \frac{3 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$C = \frac{1 \times (\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)} = \frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2}^2 - 1^2} = \frac{\sqrt{2} + 1}{2 - 1} = \sqrt{2} + 1$$

$$A + B - C = \frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{5} - (\sqrt{2} + 1) = \frac{15\sqrt{2} - 2\sqrt{2} - 10\sqrt{2} - 10}{10} = \frac{3\sqrt{2} - 10}{10}$$

$$B = \sqrt{\frac{7}{3}} + \frac{6}{3}\sqrt{\frac{7}{3}} - \frac{12}{5}\sqrt{\frac{7}{3}}$$

$$B = \frac{3}{5}\sqrt{\frac{7}{3}} \quad \text{أي } B = \left(1 + 2 - \frac{12}{5}\right)\sqrt{\frac{7}{3}}$$

حل التمرين الثالث عشر

$$A = \sqrt{49 \times 2} + \sqrt{16 \times 2} - \sqrt{4 \times 2} \quad (1)$$

$$A = 7\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$$

$$A = (7 + 4 - 2)\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$$

$$B = \sqrt{81 \times 2} - \sqrt{36 \times 2} + \sqrt{9 \times 2}$$

$$B = 9\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 3\sqrt{2}$$

$$B = (9 - 6 + 3)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

$$\frac{B + A}{2} = \frac{6\sqrt{2} + 9\sqrt{2}}{2} = 7,5\sqrt{2} \quad (2)$$

$$\sqrt{A \times B} = \sqrt{9\sqrt{2} \times 6\sqrt{2}} = \sqrt{54 \times 2} =$$

$$= \sqrt{9 \times 3 \times 2 \times 2} = 6\sqrt{3}$$

$$\frac{2AB}{A+B} = \frac{2 \times (9\sqrt{2} \times 6\sqrt{2})}{7,5\sqrt{2}} = \frac{216}{7,5\sqrt{2}} = \frac{28,8\sqrt{2}}{2} = 14,4\sqrt{2}$$

حل التمرين الرابع عشر

بما أن a طبيعي فهو موجب وبالتالي يمكننا أن نكتب:

$$a = \frac{1}{5} \quad \text{ومنه } 5a = 1 \quad \text{أي } 5a = 8 - 7 \quad \text{أي } 5a + 7 = 8 \quad \text{أي } \sqrt{(5a + 7)^2} = \sqrt{64}$$

$$a^2 = 36 \quad \text{أي } a^2 = \frac{144}{4} \quad \text{أي } 4a^2 = 144 \quad \text{أي } 4a^2 = 75 + 69$$

$$a = -\sqrt{36} = -6 \quad \text{أو } a = +\sqrt{36} = +6 \quad \text{ومنه}$$

$$a^2 + 100 = 0 \quad \text{أي } a^2 = -100 \quad \text{ومنه هذه المعادلة ليس لها حل.}$$

حل التمرين الخامس عشر

$$\sqrt{(a-7)^2} = \sqrt{17^2} \quad \text{أي } (a-7)^2 = 17^2 \quad \text{أي } (a-7)^2 = 289$$

حل التمرين العاشر

نلاحظ أن العبارة من الشكل: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

$$a \times b = \sqrt{(17 - 12\sqrt{2})(17 + 12\sqrt{2})}$$

$$= \sqrt{(17 \times 17) + (17 \times 12\sqrt{2}) - (12 \times 17\sqrt{2}) - (12 \times 12 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2})}$$

$$= \sqrt{289 - 288}$$

$$= \sqrt{1}$$

$$= 1$$

ومنه $a \times b = 1$

$$a \times b = \sqrt{17^2 - (12\sqrt{2})^2} = 17^2 - 144 \times 2 = \sqrt{289 - 288} = 1 \quad \text{أو:}$$

حل التمرين الحادي عشر

$AC^2 = 4 \text{ cm}^2$ أي $AC = \sqrt{4}$ ومنه $AC = 2 \text{ cm}$ لأنه مربع الشكل.

$AB^2 = 2,25 \text{ cm}^2$ أي $AB = \sqrt{2,25}$ ومنه $AB = 1,5$ لأنه مربع.

$$\frac{AC \times AB}{2} = \frac{2 \times 1,5}{2} = 1,5 \text{ cm}^2 \quad \text{هي المساحة المثلث } ABC$$

حل التمرين الثاني عشر

$$A = \sqrt{4 \times 7} - \frac{1}{2}\sqrt{9 \times 7} - \frac{3}{4}\sqrt{7}$$

$$A = 2\sqrt{7} - \frac{3}{2}\sqrt{7} - \frac{3}{4}\sqrt{7}$$

$$A = \left(2 - \frac{3}{2} - \frac{3}{4}\right)\sqrt{7} = \left(\frac{8 - 6 - 3}{4}\right)\sqrt{7}$$

$$A = -\frac{1}{4}\sqrt{7}$$

$$B = \sqrt{\frac{7}{3}} + 3\sqrt{\frac{4 \times 7}{3 \times 9}} - 4\sqrt{\frac{7 \times 9}{25 \times 3}}$$

حل تمارين السلسلة الثالثة

حل التمرين الأول

$$B = x(3x + 2xy - 1) + y(3x + 2xy - 1) / A = 15x - 12x^2 - 3 - 28x^2 + 12x$$

$$B = 3x^2 + 2x^2y - x + 3xy + 2xy^2 - y / A = -40x^2 + 27x - 3$$

$$D = x^2 + 3^2 + 2x \times 3 + 2(3x^2 + 3x - x - 1) / C = x^2(x^2 - 9) + 3(x^2 - 9)$$

$$D = x^2 + 9 + 6x + 6x^2 + 6x - 2x - 2 / C = x^4 - 9x^2 + 3x^2 - 27$$

$$D = 7x^2 + 10x + 7 / C = x^4 - 6x^2 - 27$$

$$E = 7(x^3 + 2x^2 - 2x - 4) + 2x^3 - x^2$$

$$E = 7x^3 + 14x^2 - 14x - 28 + 2x^3 - x^2$$

$$E = 9x^3 + 13x^2 - 14x - 28$$

$$F = \frac{6}{6}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}x - 1 + x^2 + \frac{x}{2} - \frac{5}{6}x - \frac{5}{12}$$

$$F = x^2 + x^2 + \frac{8x - 18x + 6x - 10x}{12} - \frac{12}{12} - \frac{5}{12}$$

$$F = 2x^2 - \frac{7}{6}x - \frac{17}{12}$$

حل التمرين الثاني

$$\left(\frac{2}{3}x - 1\right)^2 = \frac{4}{9}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 / (x + 8)^2 = x^2 + 16x + 64$$

$$(3 + 1.5x)^2 = 9 + 9x + 2.25x^2 / (9x - 3)^2 = 81x^2 - 54x + 9$$

$$(\sqrt{2}x - 5)^2 = 2x^2 - 10\sqrt{2}x + 25 / (\sqrt{7}x - 2)(\sqrt{7}x + 2) = 7x^2 - 4$$

$$\left(\frac{5}{4}x + \frac{2}{3}\right)\left(1.25x - \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{5}{4}x + \frac{2}{3}\right)\left(\frac{5}{4}x - \frac{2}{3}\right) = \frac{25}{16}x^2 - \frac{4}{9}$$

حل التمرين الثالث

$$71^2 = (70 + 1)^2 = 70^2 + 1^2 + 2 \times 70 \times 1 = 4900 + 140 + 1 = 5041$$

$$a = 24 \text{ cm ومنه } a = 17 + 7 \text{ ومنه } (a - 7) = 17$$

أو بطريقة أخرى:

$$(a - 7) \text{ طول ضلع المربع هو:}$$

ومنه فإن مساحة هذا المربع هي: $(a - 7)(a - 7)$ أي الضلع مضروب في الضلع.

بما أن مساحة هذا المربع هي: 289 cm^2 فهذا يكافئ:

$$(a - 7)^2 = 289 \text{ ومنه: } (a - 7)(a - 7) = 289$$

$$\text{نلاحظ أن: } 289 = 17^2 \text{ وبالتالي: } (a - 7)^2 - 17^2 = 0$$

$$(a - 7 - 17)(a - 7 + 17) = 0$$

$$(a - 24)(a + 10) = 0$$

إما: $a = 24 \text{ cm}$ أو $a = -10$ وهي قيمة مرفوضة لأن a يمثل ضلعاً.

$$AC^2 = x^2 - 6x + 13$$

لدينا في المثلث القائم AMH ، $AM^2 = AH^2 + MH^2$ (حسب نظرية فيثاغورث)

$$AM^2 = 2^2 + x^2$$

$$AM^2 = 4 + x^2$$

$$BC^2 = (BM + MC)^2 = (3+3)^2$$

$$BC^2 = 36$$

$$AB^2 + AC^2 = (x^2 + 6x + 13) + (x^2 - 6x + 13) \quad (2)$$

$$AB^2 + AC^2 = 2x^2 + 26 \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$2AM^2 + \frac{1}{2}BC^2 = 2(4 + x^2) + \frac{1}{2}(36) = 8 + 2x^2 + 18$$

$$2AM^2 + \frac{1}{2}BC^2 = 2x^2 + 26 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$AB^2 + AC^2 = 2AM^2 + \frac{1}{2}BC^2 \text{ من (1) و (2) نستنتج ان}$$

حل التمرين السادس


(1) لدينا في المثلث AHC ، $AH^2 + HC^2 = AC^2$ حسب نظرية فيثاغورث

$$h^2 = a^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2 \text{ ومنه } AH^2 = AC^2 - HC^2$$

$$h^2 = a^2 - \frac{b^2}{4} \text{ وبالتالي}$$

$$h^2 = \left(a - \frac{b}{2}\right)\left(a + \frac{b}{2}\right)$$

$$h^2 = \left(9 - \frac{4}{2}\right)\left(9 + \frac{4}{2}\right) = (9-2)(9+2) = 7 \times 11 = 77 \quad (3)$$



$$398^2 = (400-2)^2 = 400^2 + 2^2 - 2 \times 400 \times 2 = 160000 + 4 - 1600 = 158404$$

$$79^2 = (80-1)^2 = 80^2 + 1^2 - 2 \times 80 \times 1 = 6400 + 1 - 160 = 6241$$

$$99 \times 101 = (100-1)(100+1) = 100^2 - 1^2 = 10000 - 1 = 9999$$

حل التمرين الرابع

$$A = 7x \times x^2 + 7x \times 2x + 7x \times 3 = 7x(x^2 + 2x + 3)$$

$$B = (3x-1)(x-2+2x+5-x+4) = (3x-1)(2x+7)$$

$$C = x \times x + x(x-4) = x(x+x-4) = x(2x-4)$$

$$D = (3x+1)(3x+1+2) = (3x+1)(3x+3)$$

$$E = (4x)^2 + 2 \times 4x \times 4 + 4^2 = (4x+4)^2$$

$$F = \left(\frac{2}{5}x\right)^2 + 2 \times \frac{2}{5}x \times \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \left(\frac{2}{5}x + \frac{3}{4}\right)^2$$

$$G = (7x)^2 - 2 \times 7x \times 1 + 1^2 = (7x-1)^2$$

$$H = (8x)^2 - (13^2) = (8x-13)(8x+13)$$

$$I = (x+1)^2 - 3^2 = (x+1-3)(x+1+3) = (x-2)(x+4)$$

$$J = \left(\frac{5}{2}x\right)^2 - 2 \times \frac{5}{2}x \times \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \left(\frac{5}{2}x - \frac{1}{5}\right)^2$$

$$K = (10x)^2 - (\sqrt{7})^2 = (10x - \sqrt{7})(10x + \sqrt{7})$$

حل التمرين الخامس

(1) لدينا في المثلث القائم ABH ، $AB^2 = AH^2 + BH^2$ (حسب نظرية فيثاغورث)

$$AB^2 = 2^2 + (BM + MH)^2 = 4 + (3+x)^2 = 4 + 9 + x^2 + 2 \times 3 \times x$$


$$AB^2 = x^2 + 6x + 13$$

لدينا في المثلث القائم AHC ، $AC^2 = AH^2 + HC^2$ (حسب نظرية فيثاغورث)

$$AC^2 = 2^2 + (CM - MH)^2 = 4 + (3-x)^2 = 4 + 9 + x^2 - 2 \times 3 \times x$$

حل التمرين التاسع

$$\begin{aligned}(\sqrt{5} + 2)^2 &= (\sqrt{5})^2 + 2^2 + 2 \times \sqrt{5} \times 2 = 5 + 4 + 4\sqrt{5} = 9 + 4\sqrt{5} \\(\sqrt{7} - \sqrt{3})^2 &= (\sqrt{7})^2 + (\sqrt{3})^2 - 2\sqrt{7} \times \sqrt{3} = 7 + 3 - 2\sqrt{21} = 10 - 2\sqrt{21} \\(\sqrt{10} - \sqrt{11})(\sqrt{10} + \sqrt{11}) &= (\sqrt{10})^2 - (\sqrt{11})^2 = 10 - 11 = -1 \\(2\sqrt{8} - 1)(2\sqrt{8} + 1) &= (2\sqrt{8})^2 - (1)^2 = 4 \times 8 - 1 = 31 \\(\frac{5}{2}\sqrt{2} - 1,2)^2 &= (\frac{5}{2}\sqrt{2})^2 + (1,2)^2 - 2 \times \frac{5}{2}\sqrt{2} \times 1,2 = \frac{25}{4} \times 2 + 1,44 - 6\sqrt{2} \\6,25 \times 2 + 1,44 - 6\sqrt{2} &= 13,94 - 6\sqrt{2}\end{aligned}$$



حل التمرين العاشر

$$\begin{aligned}IB &= AB - AI = 10 - x \quad (1) \\JC &= BC - BJ = 10 - x \\KD &= CD - KC = 10 - x \\AL &= AD - LD = 10 - x\end{aligned}$$

(2) نستنتج أن كل المثلثات KDL , JCK , IBJ

و AIL قائمة ومتقايسة أي $IJ = JK = KL = LI$ (1)

(2)..... $\hat{JIL} = 90^\circ$ إذن $\hat{BIL} + \hat{LJA} = 90^\circ$ لكن $\hat{BIL} + \hat{JIL} + \hat{LJA} = 180^\circ$

من (1) و (2) نستنتج أن الرباعي $IJKL$ مربع.

(3) مساحة المربع $IJKL$ هي:

$$IJ^2 = IB^2 + BJ^2 = (10 - x)^2 + x^2 = 2x^2 - 20x + 100$$

حل التمرين الحادي عشر

$$(7x + 5)(x - 2) - (8x + 9)(3x + 1) =$$

$$7x^2 - 14x + 10x - 10 - 24x^2 - 8x - 27x - 9 = -17x^2 - 39x - 19$$

$$3x(6x + 1) - \left(7x - \frac{1}{2}\right)^2 =$$

$$18x^2 + 3x - 49x^2 - \frac{1}{4} + 7x = -31x^2 + 10x - \frac{1}{4}$$

$$h = \sqrt{77} = 8,7 \quad \text{ومنه}$$

حل التمرين السابع

$$A = (x^2 + 1 - 2x) - (x^2 - 3x - 2x + 6) + 5 \quad (1)$$

$$A = x^2 + 1 - 2x - x^2 + 3x + 2x - 6 + 5$$

$$A = 3x \quad \text{ومنه} \quad A = 3x + 0$$

$$B = (x - 10)(x + 9) - 2(x - 10) - (x - 10)(x + 10) \quad (2)$$

$$B = (x - 10)(x + 9 - 2 - x - 10)$$

$$B = (-3)(x - 10)$$

$$B = NR \times NP$$

$$A = MN \times MQ = x \times 3 \quad (1 \text{ II})$$

$$B = 3(10 - x)$$

$$A = 3x$$

$$3x + 3x = 30 \quad \text{أي} \quad 3x = 30 - 3x \quad \text{أي} \quad 3x = (10 - x)3 \quad \text{معناه} \quad A = B \quad (2)$$

$$x = 5 \quad \text{ومنه} \quad x = \frac{30}{6} \quad \text{أي} \quad 6x = 30$$

حل التمرين الثامن

(1)

لاحظ أن

$$A = (7x + 2)(9x - 5) = 7x(9x - 5) + 2(9x - 5) = 63x^2 - 35x + 18x - 10$$

$$A = 63x^2 - 17x - 10$$

$$B = \frac{63x^2 - 17x - 10}{\left(\frac{2}{3}x + 4\right)}(2 + 7x) \quad (2)$$

$$B = (7x + 2)(9x - 5) - \left(\frac{2}{3}x + 4\right)(2 + 7x)$$

$$B = (7x + 2)\left(9x - 5 - \frac{2}{3}x - 4\right) = (7x + 2)\left(\frac{27x - 2x}{3} - 9\right)$$

$$B = (7x + 2)\left(\frac{25}{3}x - 9\right)$$

حل تمارين السلسلة الرابعة

حل التمرين الاول

$$x=0 \text{ ومنه } 12x=0 \text{ اي } 12x=-1+1 \text{ اي } 10x-1+2x=-1 \bullet$$

لهذه المعادلة حل واحد هو $x=0$

$$\frac{14x+2x}{6}=-7 \text{ اي } \frac{7}{3}x+\frac{2}{6}x=2-9 \text{ اي } 9+\frac{7}{3}x=2-\frac{2}{6}x \bullet$$

$$x=-\frac{21}{8} \text{ ومنه } x=-7 \times \frac{6}{16} \text{ اي } \frac{16}{6}x=-7$$

$$4x-18x-x-2x=-4+12-8 \text{ اي } 4x+8-18x-12=x+2x-4 \bullet$$

$$x=0 \text{ ومنه } -17x=0$$

$$x=\frac{-1}{0,1} \text{ ومنه } 0,1x+1=0 \text{ هذا يعني: } (0,1x+1)(3x-2)=0 \bullet$$

$$x=-10$$

$$\text{وإما } 3x-2=0 \text{ اي } x=\frac{2}{3} \text{ وبالتالي يمكننا القول بأن لهذه المعادلة حلان}$$

$$\text{هما: } -10 \text{ و } \frac{2}{3}$$

$$\bullet 8x(2x+0,3)=0 \text{ هذا يعني: } -8x=0 \text{ اي } x=0 \text{ او } 2x+0,3=0$$

$$x=-0,15 \text{ ومنه } x=\frac{-0,3}{2}$$

$$\bullet (4x+\frac{5}{3})(\frac{3}{4}x-1)=0 \text{ هذا يعني: } 4x+\frac{5}{3}=0 \text{ اي } 4x+\frac{5}{3}=0 \text{ ومنه } x=-\frac{5}{12}$$

$$x=-\frac{5}{12}$$

$$\bullet \frac{3}{4}x-1=0 \text{ اي } x=1 \times \frac{4}{3} \text{ ومنه } x=\frac{4}{3}$$

حل التمرين الثاني

$$\bullet 3x \times x - x = 0 \text{ اي } 3x^2 - x = 0 \text{ او } 3x-1=0 \text{ ومنه } x=\frac{1}{3}$$

$$\left(10x+\frac{2}{3}\right)^2 - \left(x+\frac{1}{3}\right)(x-1)=$$

$$100x^2 + \frac{4}{9} + \frac{40x}{3} - x^2 + x - \frac{x}{3} + \frac{1}{3} = 99x^2 + \frac{42x}{3} + \frac{7}{9}$$

$$(\sqrt{5}x-1)^2 - (2\sqrt{5}x+3)^2 =$$

$$5x^2 + 1 - 2\sqrt{5}x - 20x^2 - 9 - 12\sqrt{5}x = -15x^2 - 14\sqrt{5}x - 8$$

حل التمرين الثاني عشر

$$(7x-1)(2x+3) - (2x+3)(2x+3) = (2x+3)[7x-1-2x-3]$$

$$= (2x+3)(5x-4)$$

$$5(2x+3)(x-11) + (2x-3)(2x+3) = (2x+3)[5(x-11) + (2x-3)]$$

$$= (2x+3)(5x-55+2x-3) = (2x+3)(7x-58)$$

$$[\sqrt{2}x+1-3\sqrt{2}x+5][\sqrt{2}x+1+3\sqrt{2}x-5]$$

$$= (-2\sqrt{2}x+6)(4\sqrt{2}x-4)$$

حل التمرين الثالث عشر

$$105^2 - 95^2 = (100+5)^2 - (100-5)^2$$

$$= 10000 + 25 + 1000 - 10000 - 25 + 1000 = 2000$$

$$795^2 + 2 \times 795 \times 5 + 25 = (795+5)^2 = 800^2 = 640000$$

حل التمرين الرابع عشر

$$A = (x+y)^2 - (x-y)^2 \quad (1)$$

$$= [(x+y) + (x-y)][(x+y) - (x-y)]$$

$$= (x+y+x-y)(x+y-x+y)$$

$$= (2x)(2y) = 4xy$$

$$A = 4 \times 8 = 32 \quad (2)$$

لهذه المعادلة حلان هما: $x = \frac{1}{3}$ و $x = 0$

$$\begin{cases} x^2 = 0 \text{ هذا يعني } x^2(0,2+2x) = 0 \text{ أي } x^2(6-5,8+2x) = 0 \\ \text{ومنه } x = 0 \\ \text{أو } 0,2+2x = 0 \end{cases}$$

ومنه $x = -0,1$

$$(7x-2)(2x+11) = 0 \text{ أي } (7x-2)[x+4+x+7] = 0$$

$$\text{هذا يعني: } 7x-2=0 \text{ ومنه } x = \frac{2}{7} \text{ أو } 2x+11=0 \text{ ومنه } x = -\frac{11}{2}$$

حل التمرين الثالث

نفرض أن هذا العدد هو x (تذكر أن x غير معدوم حسب المعطيات)

$$x^2(4+x) = 0 \text{ أي } 4x^2 + x^3 = 0 \text{ أي } (2x)^2 = -x^3$$

هذا يعني: $x^2 = 0$ ومنه $x = 0$ لكن هذه القيمة ملغاة لأن $x \neq 0$

$$\text{أو } 4+x=0 \text{ ومنه } x = -4$$

العدد الذي مربع ضعفه يساوي معاكس مكعبه و غير معدوم هو -4

حل التمرين الرابع

نفرض أن طول ضلع هذا

المربع هو a

$$3 \times a^2 = 147 \text{ أي } a^2 = \frac{147}{3} \text{ أي } a^2 = 49 \text{ ومنه } a = +\sqrt{49} = +7$$

أو $a = -\sqrt{49} = -7$ لكن هذه القيمة ملغاة لأن a طول و الطول يكون دائما موجبا.

إذن طول ضلع المربع هو $7cm$.

حل التمرين الخامس

$$5x = 3 - \sqrt{2} \text{ ومنه } x = \frac{3 - \sqrt{2}}{5}$$

$$x\sqrt{2} - 2x = \sqrt{2} + 1 - 3 \text{ أي } x(\sqrt{2} - 2) = \sqrt{2} - 2 \text{ أي } x = \frac{\sqrt{2} - 2}{\sqrt{2} - 2}$$

ومنه $x = 1$

$$x^2 = 6 \text{ ومنه } x = +\sqrt{6} \text{ أو } x = -\sqrt{6}$$

$$\frac{2x+6}{12} = \frac{12-2x+1}{12} \text{ أي } 2x+6 = 12-2x+1 \text{ أي } 2x+2x = 12+1-6$$

$$\text{أي } 4x = 7 \text{ ومنه } x = \frac{7}{4}$$

$$\frac{2x-5x^2}{10} = \frac{3}{10}x \text{ أي } 2x-5x^2 = 3x \text{ أي } -5x^2 + 2x - 3x = 0$$

$$\text{أي } -5x^2 - x = 0 \text{ أي } x(-5x-1) = 0$$

$$\text{إما } x = 0 \text{ وإما } -5x-1=0 \text{ أي } x = -\frac{1}{5}$$

$$\frac{3x+3-2x-4}{6} = \frac{6x+2x-1}{6} \text{ أي } 3x+3-2x-4 = 6x+2x-1$$

$$\text{أي } 3x-2x-6x-2x = -3-1+4 \text{ أي } -7x = 0 \text{ ومنه } x = 0$$

$$(3x-\sqrt{3}-x)(3x-\sqrt{3}+x) = 0 \text{ أي } (3x-\sqrt{3})^2 - x^2 = 0$$

$$\text{أي } (2x-\sqrt{3})(4x-\sqrt{3}) = 0$$

$$\text{هذا يعني: } 2x-\sqrt{3} = 0 \text{ أي } x = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ أو } 4x-\sqrt{3} = 0 \text{ ومنه } x = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$(x-1)^2 = 3249 \text{ أي } (x-1)^2 = 57^2 \text{ أي } (x-1)^2 - 57^2 = 0$$

$$\text{أي } (x-1-57)(x-1+57) = 0 \text{ أي } (x-58)(x+56) = 0$$

$$\text{هذا يعني: } x+56 = 0 \text{ ومنه } x = -56 \text{ أو } x-58 = 0 \text{ ومنه } x = +58$$

حل التمرين السادس

$$0,25x^2 - x + 1 = 0 \text{ أي } (0,5x-1)^2 = 0$$

$$A = (2x-9)(2x+9) + (x-3)(2x+9)$$

$$A = (2x+9)(2x-9+x-3)$$

$$A = (2x+9)(3x-12)$$

$$(2x+9)(3x-12) = 0 \text{ معناه } A = 0 \quad (3)$$

$$\text{إما } 2x+9=0 \text{ أي } x = -\frac{9}{2} \text{ أو } 3x-12=0 \text{ أي } x = \frac{12}{3} = 4$$

حل التمرين الثامن

نفرض أن مساحة عمي محمد هي A :

$$3A + 900 = 6A \text{ أي } \frac{2A + A + 900}{6} = \frac{6A}{6} \text{ أي } \frac{1}{3}A + \frac{1}{6}A + 150 = A$$

$$3A - 6A = -900 \text{ أي } -3A = -900 \text{ أي } A = \frac{-900}{-3}$$

ومنه $A = 300$ وبالتالي مساحة عمي محمد هي $300m^2$

حل التمرين التاسع

$$(1) \text{ مساحة المربع هي } (2x+3)^2 = 4x^2 + 9 + 12x$$

$$\text{مساحة المساحة المستطيل } 2x \times 4x = 8x^2$$

$$(2) \quad 4x^2 + 9 + 12x = 16x^2 \text{ أي } 4x^2 + 9 + 12x = 2 \times 8x^2$$

$$\text{أي } (2x+3)^2 - (4x)^2 = 0 \text{ أي } (2x+3)^2 = (4x)^2$$

$$\text{أي } (-2x+3)(6x+3) = 0 \text{ أي } (2x+3-4x)(2x+3+4x) = 0$$

$$\text{هذا يعني: } -2x+3=0 \text{ أي } x = \frac{-3}{-2} \text{ ومنه } x = +1,5$$

$$\text{أو } 6x+3=0 \text{ أي } x = \frac{-3}{6} \text{ ومنه } x = -0,5 \text{ لكن هذه القيمة ملغاة لأن } x > 0$$

ومنه طول ضلع المربع هو $2 \times 1,5 + 3 = 6$

$$\text{ومنه } 0,5x-1=0 \text{ أي } x = \frac{1}{0,5} \text{ أي } x=2$$

$$\bullet \left(\left(\frac{1}{2}x \right)^2 - 2 \times \frac{1}{2}x \times 5 + 5^2 \right) = 0 \text{ أي } \left(\frac{1}{4}x^2 - 5x + 25 \right) = 0$$

$$\text{أي } \left(\frac{1}{2}x - 5 \right)^2 = 0 \text{ ومنه } \frac{1}{2}x - 5 = 0 \text{ أي } x = 5 \times \frac{2}{1} \text{ أي } x = 10$$

$$\bullet (x+3)(x+3+2x+1) = 0 \text{ أي } (x+3)(x+3) + (x+3)(2x+1) = 0$$

$$\text{أي } (x+3)(3x+4) = 0 \text{ هذا يعني: } x+3=0 \text{ أي } x=-3 \text{ أو } 3x+4=0$$

$$x = -\frac{4}{3}$$

$$\bullet (7x-1-x+5)(7x-1+x-5) = 0 \text{ أي } (7x-1)^2 - (x-5)^2 = 0$$

$$\text{أي } (6x+4)(8x-6) = 0 \text{ هذا يعني: } 8x-6=0 \text{ أي } x = \frac{6}{8} \text{ أو } 6x+4=0$$

$$x = -\frac{4}{6}$$

$$\bullet (2x + \sqrt{2})^2 = 0 \text{ أي } (2x)^2 + 2 \times 2x \times \sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 = 0$$

$$\text{أي } 2x + \sqrt{2} = 0 \text{ ومنه } x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\bullet 3x^2 - 12x + 5x - 20 + 20 = 0 \text{ أي } 3x^2 - 7x = 0 \text{ أي } x(3x-7) = 0$$

$$\text{إما } x=0 \text{ أو } 3x-7=0 \text{ أي } x = \frac{7}{3}$$

$$\bullet (2x-1)^2 - (x-3)^2 = 0 \text{ أي } (2x)^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1^2 - (x-3)^2 = 0$$

$$\text{أي } (x+2)(3x-4) = 0 \text{ أي } (2x-1-x+3)(2x-1+x-3) = 0$$

$$\text{إما } x+2=0 \text{ أي } x=-2 \text{ وإما } 3x-4=0 \text{ أي } x = \frac{4}{3}$$

حل التمرين السابع

$$(1) \quad A = 4x^2 - 81 + 2x^2 + 9x - 6x - 27$$

$$A = 6x^2 + 3x - 108$$

$$(2) \quad A = (2x)^2 - 9^2 + (x-3)(2x+9)$$

حل التمرين العاشر

$$(1) \frac{(x^2+1)(x+1)}{2} = \frac{(2+2x)(3x-4)}{2}$$

$$(2) (x^2+1)(x+1) = 2(1+x)(3x-4)$$

$$(x^2+1)(x+1) - 2(1+x)(3x-4) = 0$$

$$(x+1)(x^2-6x+9) = 0 \text{ أي } (x+1)(x^2+1-6x+8) = 0$$

$$(x+1)(x-3)^2 = 0 \text{ إما } x+1=0 \text{ أي } x=-1 \text{ (ملغاة لأن ارتفاع المثلث معدوم من أجل } x=-1 \text{ لا يوجد مثلث)}$$

$$\text{وإما } x-3=0 \text{ أي } x=3$$

(3) نعم مصطفي على صواب.

حل التمرين الحادي عشر

$$(1) AD = 6 - x$$

$$(2) \text{مساحة المثلث } EAB = \frac{x \times 2x}{2} = x^2$$

$$\text{مساحة المستطيل } ABCD \text{ هي } 2x(6-x) = 12x - 2x^2$$

$$\text{مساحة المضلع } EADCB \text{ هي } x^2 + 12x - 2x^2 = -x^2 + 12x$$

$$(3) (10-x)(x-2) = 10x - 20 - x^2 + 2x$$

$$= -x^2 + 12x - 20$$

$$(4) -x^2 + 12x - 20 = 0 \text{ أي } -x^2 + 12x = 20$$

$$\text{لكن } -x^2 + 12x - 20 = (10-x)(x-2)$$

$$\text{ومنه } (10-x)(x-2) = 0 \text{ هذا يعني } 10-x=0 \text{ أي } x=10 \text{ وهذا غير ممكن لأن } 0 < x < 6$$

$$\text{أو } x-2=0 \text{ أي } x=2$$

ومنه طول $[EF]$ هو 2cm .

حل التمرين الثاني عشر

$$(2x+3)(3x+1) - (x-7) \times 4(3x+1) = 0$$

$$(3x+1)(2x+3-4(x-7)) = 0$$

$$(3x+1)(2x+3-4x+28) = 0$$

$$(3x+1)(-2x+31) = 0$$

$$\text{هذا يعني } 3x+1=0 \text{ أي } x=-\frac{1}{3} \text{ أو } -2x+31=0 \text{ أي } x=\frac{31}{2}$$

$$(5x-4)^2 - (x-8)(5x-4) = 0$$

$$(5x-4)(5x-4-x+8) = 0$$

$$(5x-4)(4x+4) = 0$$

$$\text{هذا يعني } 5x-4=0 \text{ أي } x=\frac{4}{5} \text{ أو } 4x+4=0 \text{ أي } x=-1$$

$$\left[\left(\frac{3}{4}x+7 \right) - \left(2x-\frac{1}{2} \right) \right] \left[\left(\frac{3}{4}x+7 \right) + \left(2x-\frac{1}{2} \right) \right] = 0$$

$$\left[\frac{3}{4}x+7-2x+\frac{1}{2} \right] \left[\frac{3}{4}x+7+2x-\frac{1}{2} \right] = 0$$

$$\left[\frac{3x-8x}{4} + \frac{14+1}{2} \right] \left[\frac{3x+8x}{4} + \frac{14-1}{2} \right] = 0$$

$$\left(-\frac{5x}{4} + \frac{15}{2} \right) \left(\frac{11x}{4} + \frac{13}{2} \right) = 0$$

$$\text{هذا يعني } -\frac{5x}{4} + \frac{15}{2} = 0 \text{ أي } x=6 \text{ أو } \frac{11x}{4} + \frac{13}{2} = 0 \text{ أي } x=-\frac{26}{11}$$

$$(\sqrt{3}x-1)(\sqrt{3}x-1) + (\sqrt{3}x-1)(\sqrt{3}x+1) = 0$$

$$(\sqrt{3}x-1)(\sqrt{3}x-1+\sqrt{3}x+1) = 0$$

$$(\sqrt{3}x-1)(2\sqrt{3}x) = 0$$

$$\text{هذا يعني } 2\sqrt{3}x=0 \text{ أي } x=0 \text{ أو } \sqrt{3}x-1=0 \text{ أي } x=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

حل التمرين الثالث عشر

$$(1) S = AB \times AD \text{ أي } S = (5+x) \times 7 \text{ ومنه } S = 7x+35$$

$$(2) P = (AB+AD) \times 2 \text{ أي } P = (5+x+7) \times 2 \text{ ومنه } P = 2x+24$$

$$(3) P = 32 \text{ أي } 2x + 24 = 32 \text{ ومنه } x = 4$$

حل التمرين الرابع عشر

$$(1) P = (L + \ell) \times 2 \text{ أي } (L + \ell) \times 2 = 38 \text{ أي } L + \ell = \frac{38}{2}$$

$$\text{أي } (1) L + \ell = 19 \dots\dots\dots (1)$$

$$S = L \times \ell \text{ أي } S = (L - 4)(\ell + 1) = S - 10 \text{ أي } L\ell + L - 4\ell - 4 = L\ell - 10$$

$$\text{أي } L - 4\ell = -6 \text{ ومنه } 2L = -6 + 4\ell \dots\dots\dots (2)$$

نعوض قيمة L في المعادلة (1) فنحصل على: $-6 + 4\ell + \ell = 19$

$$5\ell - 6 = 19 \text{ ومنه } 5\ell = 25 \text{ أي } \ell = \frac{25}{5} \text{ وبالتالي: } \ell = 5$$

$$\text{نعوض } \ell \text{ في المعادلة رقم (1): } L + 5 = 19 \text{ ومنه: } L = 19 - 5$$

$$\text{إذن: } L = 14$$

وبالتالي: طول الممر هو $14m$ وعرض الممر هو $5m$.

حل التمرين الخامس عشر

حساب EF^2

بما أن المثلث EBF قائم في B فإن:

$$EF^2 = EB^2 + BF^2 \text{ (حسب نظرية فيثاغورس).}$$

$$EF^2 = 7^2 + 2^2 \text{ أي } EF^2 = 49 + 4 \text{ إذن: } EF^2 = 53$$

حساب ED^2

بما أن المثلث AFD قائم في D فإن:

$$ED^2 = AE^2 + AD^2 \text{ ومنه: } ED^2 = x^2 + 36$$

حساب DF^2

بما أن المثلث DFC قائم في C فإن:

$$DF^2 = DC^2 + FC^2 \text{ ومنه: } DF^2 = (7+x)^2 + 4^2$$

$$\text{ومنه: } DF^2 = 49 + 14 + x^2 + 16$$

$$DF^2 = x^2 + 14x + 65$$

القيم التي يكون من أجلها المثلث EFD قائم في E

$$\text{لدينا: } DF^2 = DE^2 + EF^2$$


$$x^2 + 36 + 53 = x^2 + 14x + 65$$

$$\text{ومنه: } x^2 - x^2 - 14x = -65 + 89$$

$$14x = 24 \text{ وبالتالي: } x = \frac{24}{14} = \frac{12}{7}$$

حل التمرين الثالث


• $2 + 3(6x - 3) \leq 5$ اي $6x - 3 \leq 5$ ومنه $x \leq \frac{5}{3}$
حل هذه المتراجحة هو كل قيم x الأكبر تماماً من $\frac{5}{3}$.



• $12 + 18(5x + 12) \leq 5x - 18$ اي $5x - 18 \leq 12$ اي $5x \leq 30$ ومنه $x \leq 6$
• $0 \leq -13x$ اي $-13x \leq 0$ اي $x \geq 0$ ومنه $x \geq 0$
حل هذه المتراجحة هو كل قيم x الأصغر تماماً من 0.



• $-3 - x \geq -2 - 6x$ اي $-6x + x \geq -3 + 2$ اي $-5x \geq -1$ ومنه $x \leq \frac{1}{5}$
• $1 \leq -5x$ اي $-5x \leq -1$ اي $x \geq \frac{1}{5}$ ومنه $x \geq \frac{1}{5}$
حل هذه المتراجحة هو كل قيم x الأصغر من أو يساوي $\frac{1}{5}$.




• $1 + 4(2x - 5) \leq 2x - 4$ اي $2x - 5 \leq 4$ اي $2x \leq 9$ ومنه $x \leq \frac{9}{2}$
• $10 \leq -2x$ اي $-2x \geq -10$ اي $x \leq 5$ ومنه $x \leq 5$
حل هذه المتراجحة هو كل قيم x الأكبر من أو يساوي 0.



حل تمارين السلسلة الخامسة

حل التمرين الاول



(1)

$$\sin B = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \dots\dots (1)$$

$$\sin B = \frac{AH}{AB} = \frac{AH}{5} \dots\dots (2)$$

من (1) و (2) نستنتج أن $\frac{AH}{5} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ اي $AH = \frac{5\sqrt{3}}{2}$

$$A = \frac{AH \times BC}{2} = \frac{\frac{5\sqrt{3}}{2} \times 5}{2} = \frac{25\sqrt{3}}{4} = 6,25\sqrt{3} \text{ cm}^2 \text{ هي مساحة المثلث } ABC$$

(2) بما أن $1,73 \leq \sqrt{3} \leq 1,74$ فإن $1,73 \times 6,25 \leq 6,25 \times \sqrt{3} \leq 1,74 \times 6,25$

ومنه $10,81 \leq A \leq 10,87$

حل التمرين الثاني


$$A = 36 - 9\pi \text{ اي } A = 6^2 - 3^2\pi$$

بما أن $3,14 \leq \pi \leq 3,15$ فإن $-9 \times 3,15 \geq -9\pi \geq -9 \times 3,14$

اي $-28,35 \geq -9\pi \geq -25,26$ اي $36 - 28,35 \leq 36 - 9\pi \leq 36 - 25,26$

او $7,65 \leq A \leq 7,74$ ومنه $7,74 \geq A \geq 7,65$

حل التمرين السادس



1) لكي نستطيع إنشاء المستطيل ABCD تحقق x ما يلي:

$$x+1 > 0 \text{ أي } x > -1 \text{ و } x-3 > 0 \text{ أي } x > 3$$

لكي نستطيع إنشاء المثلث EFG يجب أن تحقق x ما يلي: $x > 0$.

$$2) [(x+1) + (x-3)] \times 2 < 3x \text{ أي } (2x-2) \times 2 < 3x \text{ أي } 4x-4 < 3x$$

$$\text{أي } 4x-3x < 4 \text{ ومنه } x < 4$$

قيم x حتى يكون محيط المستطيل أصغر تماماً من محيط المثلث هي

محصورة بين:

$$3 \text{ و } 4 \text{ أي } 3 < x < 4 \text{ (لاحظ شرط السؤال الأول).}$$

حل التمرين السابع

$$1) \text{ فاتورة "Mobilis" } \leftarrow 3x + 1200$$

$$2) \text{ فاتورة "Djezzy" } \leftarrow 3,5x + 1150$$

3) لكي نختار "Mobilis" يجب أن تكون فاتورته أقل تكلفة من فاتورة

$$3x + 1200 < 3,5x + 1150 \text{ أي "Djezzy"}$$

$$3x - 3,5x < 1150 - 1200 \text{ أي } -0,5x < -50 \text{ أي } (-1) \times (-0,5x) < (-1) \times (-50)$$

$$\text{أي } 0,5x > 50 \text{ أي } x > \frac{50}{0,5} \text{ ومنه } x > 100$$

وبالتالي المدة الهاتفية الشهرية تكون أكبر تماماً من 100 دقيقة لاختيار

"Mobilis"

بعد توحيد مقامي
الطرفين ممكن
الاستغناء عن المقام

حل التمرين الرابع

$$\frac{3(x+1)}{6} < \frac{2(x+2)}{6} \text{ أي } 3x+3 < 2x+4 \text{ أي } 3x-2x < 4-3$$

ومنه $x < 1$ حل هذه المتراجحة هو كل قيم x الأصغر تماماً من 1.

$$\frac{2(2x+1)}{6} - \frac{3(x-1)}{6} \leq \frac{6}{6} \text{ أي } 4x+2-3x+3 \leq 6 \text{ أي } 4x-3x+5 \leq 6$$

ومنه $x \leq 1$ حل هذه المتراجحة هو كل قيم x الأصغر من أو يساوي 1.

$$\frac{2(3-2x)}{12} - \frac{3(x+1)}{12} < \frac{2x-1}{12} \text{ أي } 6-4x-3x-3 < 2x-1$$

$$\text{أي } (-1) \times (-9x) < (-1) \times (-4) \text{ أي } 9x < 4 \text{ أي } 7x-2x < -1+3-6$$

$$\text{أي } 9x < -9 \text{ ومنه } x < -1 \text{ حل هذه المتراجحة هو كل قيم } x \text{ الأكبر تماماً من } -\frac{4}{9}$$

$$\frac{3(2-3x)}{15} - \frac{(1-2x)}{15} \geq \frac{2 \times 15}{15} \text{ أي } 6-9x-1+2x \geq 30$$

$$\text{أي } -7x \geq 30+1-6 \text{ أي } (-1) \times (-7x) \leq (-1) \times 25 \text{ أي } 7x \leq -25$$

$$\text{ومنه } x \leq -\frac{25}{7} \text{ حل هذه المتراجحة هو كل قيم } x \text{ الأصغر من أو يساوي } -\frac{25}{7}$$


حل التمرين الخامس

$$-4y \geq -9 - \frac{1}{2} \text{ أي } -4y \geq -\frac{19}{2} \text{ أي } 4y \leq \frac{19}{2}$$

$$\text{أي } (-1) \times (-4y) \leq (-1) \times (-9,5) \text{ أي } 4y \leq 9,5 \text{ أي } y \leq \frac{9,5}{4}$$

ومنه $y \leq 2,375$ حل هذه المتراجحة هو كل قيم x الأصغر من أو يساوي

2,375.



3) القيم الطبيعية أو المندومة y هي 0, 1, 2.

حل التمرين الثامن

$$(1) \quad 80x \geq 200 \quad \text{و} \quad (80+x) \times 2 < 240$$

$$(2) \quad 160 + 2x < 240 \quad \text{اي} \quad 2x < 240 - 160 \quad \text{اي} \quad 2x < 80 \quad \text{اي} \quad x < 40 \quad \text{ومنه} \quad x < 40$$

حل المتراجحة $(80+x) \times 2 < 240$ هو كل قيم x الأصغر تماماً من 40 والأكبر من 0.

$$80x \geq 200 \quad \text{اي} \quad x \geq \frac{200}{80} \quad \text{ومنه} \quad x \geq 2,5$$

حل المتراجحة $80x \geq 200$ هو كل قيم x الأكبر من أو يساوي 2,5. وبالتالي القيم الممكنة لعرض القطعة هي كل القيم الأصغر تماماً من 40 متر والأكبر من أو يساوي 2,5 متر اي $2,5 \leq x < 40$.

حل التمرين التاسع

$$(1) \quad B = (9x^2 + 16 + 24x) - (4x^2 + 9 - 12x)$$

$$B = 9x^2 + 16 + 24x - 4x^2 - 9 + 12x$$

$$B = 5x^2 + 36x + 7$$

$$(2) \quad 5x^2 - 5x^2 + 36x - 30x \leq -17 - 7 \quad \text{اي} \quad 5x^2 + 36x + 7 \leq 5x^2 + 30x - 17$$

$$\text{اي} \quad 6x \leq -24 \quad \text{ومنه} \quad x \leq -4$$

حل المتراجحة $B \leq 5x^2 + 30x - 17$ هو كل قيم x الأصغر من أو يساوي -4.

حل التمرين العاشر

$$\bullet \quad 1 < \frac{1}{2}a < 2 \quad \text{اي} \quad 1 \times 2 < \frac{1}{2}a \times 2 < 2 \times 2 \quad \text{اي} \quad 2 < a < 4 \quad \text{ومنه} \quad a = 3$$

$$10 < 2b < 14 \quad \text{اي} \quad 10 \times \frac{1}{2} < 2b \times \frac{1}{2} < 14 \times \frac{1}{2} \quad \text{اي} \quad 5 < b < 7 \quad \text{ومنه} \quad b = 6$$

$$5 \leq c - 2 < 9 \quad \text{اي} \quad 5 + 2 \leq c - 2 + 2 < 9 + 2 \quad \text{اي} \quad 7 \leq c < 11 \quad \text{ومنه} \quad c = 9$$

$$\left(\frac{\sqrt{a} + \sqrt{c}}{\sqrt{b}} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3} + \sqrt{9}}{\sqrt{6}} \right)^2$$

$$= \frac{\sqrt{3^2 + 3^2 + 2 \times 3 \sqrt{3}}}{6}$$

$$= \frac{3 + 9 + 6\sqrt{3}}{6}$$

$$= \frac{12 + 6\sqrt{3}}{6}$$

$$= \frac{6(2 + \sqrt{3})}{6}$$

$$= 2 + \sqrt{3} \quad \text{وهو المطلوب.}$$

حل التمرين الحادي عشر

$$-4x + 3 \leq -7x + 0,5 \quad \text{اي} \quad -4x + 7x \leq -3 + 0,5 \quad \text{اي} \quad 3x \leq -2,5$$

$$\text{ومنه} \quad x \leq -\frac{2,5}{3} \quad \text{أو} \quad x \leq -\frac{5}{6}$$


حل هذه المتراجحة هو كل قيم x الأصغر من أو يساوي $-\frac{5}{6}$.



$$2x + 6 + 10 > 10x + 5x + 5 \quad \text{اي} \quad 2x - 10x > 5 - 16 \quad \text{اي} \quad -8x > -11$$


$$\text{اي} \quad (-1)(-8x) < (-1)(-11) \quad \text{ومنه} \quad 8x < 11 \quad \text{ومنه} \quad x < \frac{11}{8}$$

حل هذه المتراجحة هو كل قيم x الأصغر تماماً من $\frac{11}{8}$.



$$-5x - 2,5 \geq -6x - 5 \quad \text{اي} \quad -5x + 6x \geq -5 + 2,5 \quad \text{اي} \quad x \geq -2,5$$

حل هذه المتراجحة هو كل قيم x الأكبر من أو يساوي -2,5.




حل تمارين السلسلة السادسة

حل التمرين الاول

$$f\left(\frac{10}{4}\right) = \frac{4}{5} \times \frac{10}{4} = 2 \quad / \quad f(-2) = \frac{4}{5} \times (-2) = -\frac{8}{5} \quad / \quad f(0) = \frac{4}{5} \times 0 = 0 \quad (1)$$

(2) الجدول المساعد

	O	B
x	0	$\frac{10}{4}$
f(x)	0	2



حل التمرين الثاني

$$a = \frac{f(x)}{x} \quad \text{ومنه} \quad f(x) = ax$$

$$f(x) = -4x \quad \text{ومنه} \quad a = \frac{-6}{\frac{4}{3}} = -\frac{6}{4} \times \frac{3}{1} = -\frac{9}{2}$$

حل التمرين الثاني عشر

$$S = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{16 \times AC}{2} = 8AC$$

$$(1) \dots\dots\dots AC(9 \text{ ومنه } 8AC(72 \text{ اي } \frac{72}{8})$$

$$(2) \dots\dots\dots AC(6 \text{ ومنه } 8AC(48 \text{ اي } \frac{48}{8})$$

من (1) و(2) نستنتج ان $6 < AC < 9$

حل التمرين الثالث عشر

$$[(16+x) + (7+x)] \times 2 \leq 86$$

$$4x \leq 86 - 46 \text{ اي } 46 + 4x \leq 86 \text{ اي } (23+2x) \times 2 \leq 86$$

$$\text{ومنه } x \leq 10$$

حل التمرين الرابع عشر

$$2x(12) \text{ اي } 24 + 2x(36 - 24) \text{ اي } 24 + 2x(12)$$

$$\text{ومنه } x \geq 6$$

(1) قيم x هي كل القيم الأكبر تماماً من 6 والأصغر من أو يساوي 12.

$$12x(114) \text{ اي } \frac{114}{12} \text{ ومنه } x \geq 9,5$$

(2) قيم x هي كل القيم الأكبر من أو يساوي 0 والأصغر تماماً من 9,5.

حل التمرين الثالث

$$g(x) = 2x - 1 \quad (1)$$

$$g(0) = 2 \times 0 - 1 = -1$$

$$g(1) = 2 \times 1 - 1 = 1$$

$$g(-2) = 2 \times (-2) - 1 = -5$$

$$g\left(\frac{3}{2}\right) = 2 \times \frac{3}{2} - 1 = 2$$

نفرض أن العدد الذي صورته 0 بالدالة g هو m

$$2m - 1 = 0 \quad \text{أي} \quad \begin{cases} g(m) = 2m - 1 \quad (2) \\ g(m) = 0 \end{cases}$$


$$m = \frac{1}{2} \quad \text{ومنه}$$

حل التمرين الرابع

$$g(x) = -\frac{2}{3}x + 4$$

الجدول المساعد

	A	B
x	0	3
f(x)	4	2



حل التمرين الخامس

$$f(x) = ax + b \quad \text{حيث} \quad f(-1) = -4 \quad \text{و} \quad f(2) = 3$$


$$a = \frac{7}{3} \quad \text{ومنه} \quad a = \frac{-4 - 3}{-1 - 2} = \frac{-7}{-3} \quad \text{أي} \quad a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

$$\begin{cases} f(2) = 2a + b \\ f(2) = 3 \end{cases} \quad \text{أي} \quad \begin{cases} 2\left(\frac{7}{3}\right) + b = 3 \\ 2a + b = 3 \end{cases} \quad \text{ومنه}$$

$$b = -\frac{5}{3} \quad \text{ومنه} \quad b = \frac{9 - 14}{3} \quad \text{أي} \quad b = 3 - \frac{14}{3} \quad \text{أي} \quad \frac{14}{3} + b = 3$$

$$f(x) = \frac{7}{3}x - \frac{5}{3} \quad \text{وبالتالي}$$

حل التمرين السادس



$$p(x) = 3x + 6 \quad \text{ومنه} \quad P(x) = 3 \times (2 + x) \quad (1)$$

(2) الجدول المساعد

	A	B
x	0	1
P(x)	6	9

(3) (a) قيمة المحيط من أجل $x = 3$ هي 15.

(b) قيمة x من أجل محيط يساوي 10,5 هي 1,5.

حل التمرين الثامن

(1) مساحة المثلث ABM هي :

$$A(x) = \frac{8 \times x}{2} \text{ أي } A(x) = 4x$$

(2) مساحة الرباعي $MBND$ هي فرق مساحتي شبه المنحرف $ABND$ والمثلث ABM .

مساحة شبه المنحرف $ABND$ هي : $\frac{(AD + BN) \times AB}{2}$

$$\frac{[6 + (6 - x)] \times 8}{2} = (12 - x) \times 4 = 48 - 4x$$

ومنه $A'(x) = 48 - 4x - 4x$ وهو المطلوب.

$$A(x) = A'(x) \text{ معناه } 4x = 48 - 8x \text{ أي } 12x = 48$$

$$\text{أي } x = \frac{48}{12} \text{ ومنه } x = 4$$

حل التمرين التاسع

(1)


عدد الحصص	0	1	$\frac{300}{50} = 6$	8	$\frac{500}{50} = 10$
المبلغ (DA)	0	$1 \times 50 = 50$	300	$8 \times 50 = 400$	500

$$y = 50x \quad (2)$$


$$f(x) = 50x \quad (3)$$

$$p(3) = 3 \times 3 + 6 = 15 \text{ (c)}$$

حل المعادلة $3x + 6 = 10,5$ أي $3x = 10,5 - 6$ ومنه $x = 1,5$



حل التمرين السابع



$$A(x) = 3x \quad (1)$$

$$A'(x) = (3 + 2) \times (2 + x) \quad (2)$$


$$A'(x) = 5(2 + x)$$

$$A'(x) = 5x + 10$$

$$A'(x) - A(x) = 20 \text{ أي } 5x + 10 - 3x = 20 \text{ أي } 2x = 20 - 10$$

$$\text{أي } 2x = 10 \text{ ومنه } x = \frac{10}{2} = 5$$

	A	B
x	0	1
f(x)	0	50



(4)

عدد الحصص	0	4	7	$\frac{450 - 200}{25} = 10$
المبلغ (DA)	$0 \times 25 + 200 = 200$	$4 \times 25 + 200 = 300$	$7 \times 25 + 200 = 375$	450

	C	D
x	0	5
g(x)	200	300

$$Y' = 25x + 200$$

بياناً نلاحظ أنه بداية من الحصة الثامنة يكون تمثيل الدالة g تحت تمثيل الدالة f .

عدد الحصص التي من أجلها يكون الاختيار الثاني أفضل من الاختيار الأول هو 8 حصص فأكثر.

$$50x(25x + 200) \text{ اي } 25x - 50x(-200) \text{ اي } 25x(-200) - 50x(-200) \text{ اي } (-1) \times (-50x) \text{ اي } (-1) \times (-200) \text{ ومنه } x \geq 8$$

حل التمرين العاشر

$$(1) \quad y = \left(1 - \frac{20}{100}\right)x \text{ اي } y = \left(\frac{80}{100}\right)x \text{ ومنه } y = \frac{4}{5}x$$

$$y = \frac{4}{5}x \text{ ومنه}$$

$$(2) \quad \text{إذا كان } x = 1200 \text{ فإن } y = \frac{4}{5} \times 1200 = 960 \text{ ومنه } y = 960$$

أي أن ثمن السروال بعد التخفيض هو 960 DA.

$$(3) \quad \left(1 - \frac{20}{100}\right)x = 2880 \text{ اي } \left(\frac{80}{100}\right)x = 2880$$

$$\text{اي } \frac{4}{5}x = 2880 \text{ ومنه } x = \frac{2880 \times 5}{4} = 3600$$

ومنه ثمن السلعة قبل التخفيض هو 3600 DA.

حل التمرين الحادي عشر

$$(1) \quad F(x) = ax + b$$

$$a = \frac{F(x_2) - F(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{0,5 + 2}{4 + 3,5}$$

$$a = \frac{2,5}{7,5} = \frac{1}{3}$$

$$\text{لدينا } F(-3,5) = -2 \text{ و } F(-3,5) = -3,5 \times \frac{1}{3} + b$$

$$\text{اي } -3,5 \times \frac{1}{3} + b = -2 \text{ ويحل هذه المعادلة نحصل على } b = 1,2$$

$$\text{ومنه } F(x) = \frac{1}{3}x + 1,2$$

$$(2) \quad F(0) = \frac{1}{3} \times 0 + 1,2 = 1,2 \text{ اي أن } F(0) \neq -1$$

ومنه النقطة G لا تنتمي إلى هذا التمثيل.

حل التمرين الثاني عشر

$$g(x) = ax \quad (1)$$

$$a = \frac{g(x)}{x} \text{ أي } a = \frac{12}{-4} = -3 \text{ ومنه } g(x) = -3x$$

$$g\left(-\frac{2}{3}\right) = -3 \times \frac{-2}{3} = +2 \quad (2)$$

$$g(0) = -3 \times 0 = 0 \text{ و } g(+1) = -3 \times 1 = -3$$

	A	B
x	0	1+
g(x)	0	3-



حل التمرين الثالث عشر

$$y = \left(1 - \frac{p}{100}\right)x \quad (1)$$

$$y = ax \text{ أي } a = \frac{y}{x}$$

$$\text{بما أن } x = 1500DA \text{ و } y = 1000DA \text{ فإن } a = \frac{1000}{1500} = \frac{2}{3}$$

$$\text{ومنه معامل الدالة هو } \frac{2}{3}$$

$$(2) \quad 1 - \frac{p}{100} = \frac{2}{3} \text{ أي } 300 - 3p = 200 \text{ أي } -3p = -300 + 200$$

$$\text{أي } -3p = -100 \text{ أي } p = \frac{-100}{-3} \text{ ومنه } p = 33,33\%$$

نسبة التخفيض هي 33,33%

حل التمرين الرابع عشر

$$(1) \quad y = \left(1 - \frac{p}{100}\right)x \text{ أي } y = \left(1 - \frac{20}{100}\right)x \text{ أي } y = (1 - 0,2)x$$

$$\text{ومنه } y = 0,8x$$

$$(2) \quad y = 0,8 \times 1200 = 960 \text{ ومنه ثمن السروال بعد التخفيض هو } 960DA$$

$$(3) \quad 300 = 0,8 \times x \text{ أي } x = \frac{300}{0,8} = 3750 \text{ ومنه ثمن السلعة قبل التخفيض هو } 3750DA$$

حل تمارين السلسلة السابعة

حل التمرين الأول

$$\begin{cases} 70x - 91y = 287 & \text{اي} \times 7 \\ -70x + 110y = -230 & \times (-10) \end{cases} \begin{cases} 10x - 13y = 41 \dots ① \\ 7x - 11y = 23 \dots ② \end{cases}$$

بجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على $19y = 57$ اي $y = \frac{57}{19}$ ومنه $y = 3$

نعوض قيمة $y = 3$ في المعادلة 2 فنحصل على $7x - 11 \times 3 = 23$ اي

$$7x = 23 + 33 \quad \text{اي} \quad 7x = 56 \quad \text{اي} \quad x = \frac{56}{7} \quad \text{ومنه} \quad x = 8$$

لهذه المعادلة حل واحد هي الثنائية (3 ; 8)

$$\begin{cases} \frac{x}{9} = \frac{y}{5} \dots ① \\ 2x + 3y = 231 \dots ② \end{cases} \text{اي} \begin{cases} 5x - 9y = 0 \\ 2x + 3y = 231 \end{cases} \times 5$$

$$\begin{cases} -10x + 18y = 0 \\ 10x + 15y = 1155 \end{cases} \text{بجمع المعادلتين طرفا لطرف نحصل على}$$

$$33y = 1155 \quad \text{اي} \quad y = \frac{1155}{33} \quad \text{ومنه} \quad y = 35$$

نعوض قيمة $y = 35$ في المعادلة 1 فنحصل على $5x - 9 \times 35 = 0$ اي

$$x = \frac{315}{5} \quad \text{ومنه} \quad x = 63$$

لهذه الجملة حل واحد هي الثنائية (35 ; 63)

$$\begin{cases} 6x + 3y = 4x + 18 & \text{اي} \begin{cases} \frac{2x + y}{4} = \frac{x}{3} + \frac{3}{2} \\ (x-3)^2 - x^2 = 3 + y \end{cases} \\ x^2 + 9 - 6x - x^2 = 3 + y \end{cases} \text{اي}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y = 18 \\ -18x - 3y = -18 \end{cases} \text{اي} \times 3 \begin{cases} 2x + 3y = 18 \dots ① \\ -6x - y = -6 \dots ② \end{cases}$$

بجمع المعادلتين طرفا لطرف نحصل على $-16x = 0$ ومنه $x = 0$

نعوض قيمة $x = 0$ في المعادلة 2 فنحصل على $-6 \times 0 - y = -6$ ومنه $y = 6$

$$\begin{cases} \sqrt{6}x - \sqrt{3}y = 3 & \text{اي} \times \sqrt{3} \\ \sqrt{6}x + \sqrt{3}y = 5 & \times 1 \end{cases} \begin{cases} \sqrt{2}x - y = \sqrt{3} \dots ① \\ \sqrt{6}x + \sqrt{3}y = 5 \dots ② \end{cases}$$

بجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على $2\sqrt{6}x = 8$ ومنه $x = \frac{8}{2\sqrt{6}}$

$$\text{اي} \quad x = \frac{4}{\sqrt{6}} \quad \text{او} \quad x = \frac{4\sqrt{6}}{6} \quad \text{او} \quad x = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

بتعويض قيمة x في المعادلة ① نحصل على:

$$\sqrt{2} \left(\frac{2\sqrt{6}}{3} \right) - y = \sqrt{3} \quad \text{ومنه} \quad \frac{2\sqrt{12}}{3} - y = \sqrt{3} \quad \text{اي} \quad y = \frac{4\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3}$$

$$\text{ومنه} \quad y = \frac{4\sqrt{3}}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{3} \quad \text{وبالتالي} \quad y = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

اي أن مجموعة حلول هذه الجملة هي الثنائية $\left(\frac{2\sqrt{6}}{3}; \frac{3\sqrt{3}}{3} \right)$

حل التمرين الثاني

$$\begin{cases} x + y = 134 \dots ① \\ x - y = 126 \dots ② \end{cases}$$

بجمع المعادلتين 1 و 2 طرف لطرف نحصل على $2x = 260$ ومنه $x = \frac{260}{2}$

$$\text{اي} \quad x = 130$$

نعوض قيمة x في المعادلة 2 نحصل على $130 - y = 126$ ومنه $-y = 126 - 130$

$$\text{اي} \quad -y = -4 \quad \text{اي} \quad y = 4$$

حل التمرين الثالث

نفرض أن $a > b$

$$\begin{cases} a + b = 40 \dots ① \\ a - 3b = 0 \dots ② \end{cases} \text{اي} \begin{cases} a + b = 40 \\ 3a - 3b = 2a \end{cases} \text{اي} \begin{cases} a + b = 40 \\ a - b = \frac{2}{3}a \end{cases}$$

من الشكل نستنتج أن $x + y = 7$ المعادلة (2)

بحل جملة المعادلتين $\begin{cases} 3x - 4y = 0 \\ x + y = 7 \end{cases}$ نحصل على طول كلا من المربع والمثلث.

نضرب طرفي المعادلة (2) في العدد -3 فنحصل على $\begin{cases} 3x - 4y = 0 \\ -3x - 3y = -21 \end{cases}$

بجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على $-7y = -21$ أي $y = 3$ أو $y = \frac{-21}{-7}$

نعوض قيمة $y = 3$ في المعادلة (2) فنحصل على $x + 3 = 7$ أي $x = 4$

ومنه طول ضلع المربع هو 4cm و طول ضلع المثلث هو 3cm

حل التمرين السابع

ليكن عدد السيارات هو x و عدد الدرجات هو y

تذكير: السيارة لها 4 عجلات

أما الدراجة لها عجلتين

$$\begin{cases} x + y = 78 \dots\dots\dots (1) \\ 4x + 2y = 218 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

نضرب طرفي المعادلة (1) في العدد -4 فنحصل على $\begin{cases} -4x - 4y = -312 \\ 4x + 2y = 218 \end{cases}$

بجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على $-2y = -94$ أي $y = 47$ أو $y = \frac{-94}{-2}$

نعوض قيمة $y = 47$ في المعادلة (1) فنحصل على $x + 47 = 78$ أي $x = 31$

ومنه عدد السيارات هو 31 و عدد الدرجات هو 47

حل التمرين الثامن

بجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على $x - y = 20^0 \dots\dots\dots (1)$

أي $x + y = 180^0 \dots\dots\dots (2)$

فنحصل على $\begin{cases} -a - b = -40 \\ a - 3b = 0 \end{cases}$ بجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على $-4b = -40$ ومنه $b = \frac{-40}{-4} = 10$ أي $b = 10$

بتعويض قيمة $b = 10$ في المعادلة 1 نحصل على $a + 10 = 40$ ومنه $a = 30$

حل التمرين الرابع

نفرض أن x هو ثمن القميص و y هو ثمن السروال.

$$\begin{cases} x + y = 3200 \dots\dots\dots (1) \\ x - y = -1300 \dots\dots\dots (2) \end{cases} \text{ أي } \begin{cases} x + y = 3200 \dots\dots\dots (1) \\ y = x + 1300 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

بجمع المعادلتين طرفا لطرف نحصل على

$$2x = 1900 \text{ ومنه } x = \frac{1900}{2} = 950 \text{ أي } x = 950$$

نعوض قيمة $x = 950$ في المعادلة 1 فنحصل على $950 + y = 3200$ ومنه

$$y = 3200 - 950 \text{ أي } y = 2250$$

ومنه ثمن القميص هو 950DA و ثمن السروال هو 2250DA

حل التمرين الخامس

$$\frac{x + 4 + 6 + 7 + 10 + 11 + 13 + 14 + 15 + y}{10} = 10$$

أي $80 + x + y = 100$ ومنه $x + y = 20$ المعادلة الأولى

$y - x = 16$ أي $-x + y = 16$ المعادلة الثانية

بحل جملة المعادلتين $\begin{cases} x + y = 20 \\ -x + y = 16 \end{cases}$ نجد العلامتين x و y

$$\text{أي: } x = 2 \text{ و } y = 18$$

حل التمرين السادس

$$P_2 = 3x \quad / \quad P_1 = 4y$$

معناه $P_1 = P_2$ أي $3x = 4y$ المعادلة (1)

و بتعويض قيمة x في المعادلة (2) نحصل على $100 + y = 180$ أي $y = 80$

حل التمرين التاسع

$$f: x \rightarrow ax + b \text{ أي } f(x) = ax + b \text{ أو } y = ax + b$$

$$\begin{cases} -1a + b = -3 \dots (1) \\ -4a + b = 6 \dots (2) \end{cases}$$

لتعين الدالة f يجب إيجاد المجهولين a و b حيث :

$$\begin{cases} 4a - 4b = 12 \\ -4a + b = 6 \end{cases}$$

بضرب طرفي المعادلة (1) في العدد (-4) نحصل على الجملة الآتية :

$$-16a + 16b = -48$$

وبجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على المعادلة :

$$-12a + 17b = -42$$

وبجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على المعادلة :

$$-12a + 17b = -42$$

وبجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على المعادلة :

$$-12a + 17b = -42$$

وبجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على المعادلة :

$$-12a + 17b = -42$$

وبجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على المعادلة :

$$-12a + 17b = -42$$

وبجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على المعادلة :


$$-12a + 17b = -42$$

وبجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على المعادلة :

$$-12a + 17b = -42$$

وبجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على المعادلة :

$$-12a + 17b = -42$$



حل التمرين العاشر

ليكن x طول المستطيل

و y عرض المستطيل

لأيجاد بعدى هذا المستطيل

يجب حل الجملة الآتية

$$\begin{cases} \left(x + \frac{20}{100}x\right) + y = 22,4 \\ x + \left(y - \frac{20}{100}y\right) = 18,4 \end{cases}$$

و بتبسيط هذه الجملة نحصل على الجملة :

$$\begin{cases} 1,2x + y = 22,4 \dots (1) \\ x + 0,8y = 18,4 \dots (2) \end{cases}$$

بضرب طرفي المعادلة (2) في العدد (-1,2) ونحصل على

$$-1,2x - 0,96y = -22,08$$

وبجمع المعادلتين طرفا لطرف

نحصل على المعادلة $0,04y = 0,32$ ومنه $y = \frac{0,32}{0,04}$ أي $y = 8$

نعوض قيمة $y = 8$ في المعادلة (1) ونحصل على المعادلة $1,2x + 8 = 22,4$

وبحل هذه المعادلة نحصل على $x = 12$

ومنه طول المستطيل هو 12cm وعرضه هو 8cm

حل التمرين الحادي عشر

ليكن الكسر المطلوب إيجاده هو $\frac{a}{b}$

$$\frac{a+1}{b-1} = 1 \text{ أي } a+1 = b-1 \text{ ومنه نحصل على المعادلة الأولى } a-b = -2$$

$$\frac{a}{b+1} = \frac{1}{2} \text{ أي } 2a = b+1 \text{ ومنه نحصل على المعادلة الثانية } 2a-b = 1$$

$$\begin{cases} a-b = -2 \\ 2a-b = 1 \end{cases}$$

و لأيجاد كلا من a و b نحل الجملة الآتية :

$$\begin{cases} -2a + 2b = 4 \\ 2a - b = 1 \end{cases}$$

بجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على

$$b = 5$$

نعوض قيمة $b = 5$ في المعادلة الأولى فنحصل على $a-5 = -2$ ومنه $a = 3$

وبالتالي يكون الكسر هو $\frac{3}{5}$

حل التمرين الثاني عشر

$$\begin{cases} x-y = -3 \\ (x-y)(x+y) = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x-y = -3 \dots (1) \\ -3(x+y) = -6 \dots (2) \end{cases}$$

تصبح الجملة كما يلي :

$$\begin{cases} x-y = -3 \\ -3(x+y) = -6 \end{cases}$$

حل تمارين السلسلة الشاملة

حل التمرين الاول

(1) النسبة المئوية للتلاميذ الذين علاماتهم n حيث $8 \leq n < 12$ هي $36\% = \frac{90 \times 100}{250}$

360°	250
86,4	x

(2) عدد التلاميذ حيث علاماتهم n حيث $12 \leq n < 16$ هو 60.

$$360x = 250 \times 86,4 \text{ اي } x = \frac{250 \times 86,4}{360} \text{ ومنه } x = 60$$

(3) قياس الزاوية المناسبة للذين علاماتهم n حيث $4 \leq n < 8$ هي: 72°

100%	360°
20%	y

$$100y = 360 \times 20 \text{ اي } y = \frac{360 \times 20}{100} \text{ ومنه } y = 72^\circ$$

حل التمرين الثاني

التكرار	التكرار	النسبة المئوية	التكرار	قياس الزاوية a
المجموع	المتزايد	المجموع	المتناقص	
30	3	$\frac{3 \times 100}{30} = 10\%$	3	$0^\circ \leq a < 30^\circ$
27	15	$\frac{12 \times 100}{30} = 40\%$	15	$30^\circ \leq a < 45^\circ$
15	21	20%	21	$45^\circ \leq a < 85^\circ$
9	23	$\frac{2 \times 100}{30} = 6,6\%$	23	$85^\circ \leq a < 95^\circ$
7	26	10%	26	$95^\circ \leq a < 130^\circ$
4	29	$\frac{3 \times 100}{30} = 10\%$	29	$130^\circ \leq a < 180^\circ$
1	30	$\frac{1 \times 100}{30} = 3,3\%$	30	$180^\circ \leq a$

$$\begin{cases} 3x - 3y = -9 \\ -3x - 3y = -6 \end{cases} \text{ بضرب طريقة المعادلة (1) في العدد 3 نحصل على}$$

$$نجمع المعادلتين طرف لطرف ونحصل على $-6y = -15$ ومنه $y = 2,5$$$

$$\text{نعوض قيمة } y = 2,5 \text{ في المعادلة (1) فنحصل على } x - 2,5 = -3$$

$$\text{ومنه } x = -0,5$$

$$\text{وبالتالي الثنائية المرتبة } (-0,5; 2,5) \text{ هي حل للجملة}$$

حل التمرين الثالث

العلامات	8	9	11	12	13	14	16
التكرار	3	5	2	3	2	7	2

$$\bar{X} = \frac{(8 \times 3) + (9 \times 5) + (11 \times 2) + (12 \times 3) + (13 \times 2) + (14 \times 7) + (16 \times 2)}{3 + 5 + 2 + 3 + 2 + 7 + 2}$$

$$\bar{X} = \frac{283}{24} = 11,79$$

حل التمرين الرابع

(1) إذا كان $a = 13$ فإن

$$\bar{X} = \frac{12 + 5 + 18 + 11 + 19 + 13}{6} = \frac{78}{6} = 13$$

ومنه معدل علامات أحمد هو 13.

(2) أكبر علامة ممكن أن يتحصل عليها أحمد في الفرض السادس هي $a = 20$

وإذا حسبنا معدله بالعلامة 20 نتحصل على المعدل الآتي:

$$\bar{X} = \frac{12 + 5 + 18 + 11 + 19 + 20}{6} = \frac{85}{6} = 14,16$$

ومنه ليس بإمكان أحمد أن يتحصل على معدل 15.

$$y = \left(1 + \frac{25}{100}\right)x \quad (a) \quad (3)$$

$$125x - 100y = 0 \text{ أي } 100y = 125x \text{ أي } \frac{100y}{100} = \left(\frac{125}{100}\right)x \quad (b)$$

$$5x - 4y = 0 \dots\dots\dots (1 \text{ أو } 2)$$

$$\frac{48 + x + y}{6} = \frac{12,5 \times 6}{6} \text{ أي } \frac{20 + 15 + 4 + 9 + x + y}{6} = 12,5$$

$$x + y = 27 \dots\dots\dots (2)$$

لإيجاد قيمتي x و y نحل جملة المعادلتين: (1) $5x - 4y = 0$

$$x + y = 27 \dots\dots\dots (2)$$

نضرب طرفي المعادلة (2) في العدد 5 - فنحصل على الجملة

$$\begin{cases} 5x - 4y = 0 \\ -5x - 5y = -135 \end{cases}$$

وبجمع المعادلتين طرفاً لطرف نحصل على $-9y = -135$ ومنه $y = 15$

نعوض قيمة y في المعادلة (2) فنحصل على المعادلة:

$$x + 15 = 27 \text{ ومنه } x = 12$$

(4) مدى علامات أحمد هو $e = 19 - 5 = 14$

مدى علامات سارة هو $e' = 20 - 4 = 16$ ومنه $e < e'$

حل التمرين الخامس

(1) a في السلسلة الإحصائية نلاحظ أن العدد 9 قبله 7 قيم وإذا كان هو

الوسيط يجب:

أن تكون بعده 7 قيم لكن لدينا 5 قيم بعده فقط ومنه $b + 5 = 7$ أي $b = 2$.

$$\bar{X} = \frac{(3 \times 6) + (4 \times 8) + (1 \times 9) + (2 \times 10) + (3 \times 11) + (2 \times a)}{15}$$

$$\frac{112 + 2a}{15} = 10 \text{ ومنه } \bar{X} = 10 \text{ لكن } \bar{X} = \frac{112 + 2a}{15}$$

$$\text{أي } 112 + 2a = 150 \text{ أي } 2a = 150 - 112 \text{ أي } 2a = 38 \text{ ومنه } a = 19$$

(2) مدى هذه السلسلة هو $e = 19 - 6 = 13$

حل التمرين السادس

المدى	الوسيط	الوسط الحسابي	المتسابقون
A	12,5	12,16	
B	11,4	11,94	
C	11	11,56	
D	10,4	12,42	
E	11,9	12,06	
F	11,4	12,4	

المتسابقان B و C لهما زمن متوسط اقل من 12 ثانية لكن كل سباقات المتسابق B لم يتجاوز زمنها 12,5 ثانية وبالتالي فالمتسابق B هو المؤهل للمنافسة.

حل التمرين السابع

(1)

درجات الحرارة (C^0)	9	11	14	15	17	18	19	20	28
التكرار	1	3	3	4	2	1	1	1	4

معدل درجات الحرارة هو 17,35

$$\bar{X} = \frac{9 + (3 \times 11) + (3 \times 14) + (4 \times 15) + (2 \times 17) + 18 + 19 + 20 + (4 \times 28)}{20}$$

$$\bar{X} = 17,35$$


(2) القيمة الوسيطة لدرجات الحرارة في هذا اليوم هي

$$16^0 C \text{ Med} = \frac{15 + 17}{2} = \frac{32}{2} = 16$$

(3) المدى الحراري لهذا اليوم هو $19^0 C$

$$e = 28 - 9 = 19 \quad (4)$$

التكرار



درجات الحرارة

(5) عدد درجات الحرارة الأقل من $17^0 C$ هو 11

(6) نسبة درجات الحرارة الأكبر من $20^0 C$ هي $\frac{4}{20}$ أي 0,2.

حل التمرين الثامن

$$x + y + 36 = 49 \text{ أي } \frac{x + 5 \times 2 + 8 + 9 \times 2 + y}{7} = 7$$

ومنه $x + y = 13$ (معادلة الوسط الحسابي)

$-x + y = 7$ (معادلة المدى)

$$\begin{cases} x + y = 13 \\ -x + y = 7 \end{cases} \text{ لأيجاد } x \text{ و } y \text{ نحل جملة المعادلتين :}$$

بجمع المعادلتين طرف لطرف نحصل على $2y = 20$ ومنه $y = 10$

بتعويض قيمة $y = 10$ في المعادلة الأولى نحصل على $x + 10 = 13$ ومنه $x = 3$

حل التمرين التاسع

(1) قيم y لكي تكون 12 هي القيمة الوسيطة لهذه السلسلة هي : 2 أو 4.

$$\frac{2x + 2 \times 13 + 3 \times 12 + 3 \times 11 + 1 \times 10}{2 + 2 + 3 + 3 + 1} = 12 \quad (2)$$

$$\text{أي } \frac{2x + 105}{11} = 12 \text{ أي } 2x + 105 = 132 \text{ ومنه } x = 13,5$$

حل التمرين العاشر

(1) عدد تلاميذ هذا القسم هو 40.

(2)

المعدل (M)	$M(5)$	$M(10)$	$M(15)$	$M(20)$
التكرارات المجمعة	6	24	35	40
المتزايدة	6	24	35	40
التكرارات	6	$24 - 6 = 18$	$35 - 24 = 11$	$40 - 35 = 5$

حل تمارين السلسلة التاسعة

حل التمرين الاول

بما أن $(AB) \parallel (DE)$ و C تنتمي إلى كل من $[BD]$ و $[AE]$ وحسب


$$\text{نظرية طاليس فإن } \frac{CE}{CA} = \frac{CD}{CB} = \frac{ED}{AB}$$

بالتطبيق العددي نحصل على $\frac{8}{6} = \frac{12}{AB}$ ومنه $\frac{8}{6} = \frac{12}{AB}$ أي

$$8 \times AB = 6 \times 12 \text{ أي } AB = \frac{6 \times 12}{8} \text{ ومنه } AB = 9 \text{ cm}$$

إذن أكبر فتحة بين A و B هي 9 cm .

حل التمرين الثاني




(1) بما أن $(AB) \parallel (PF)$ و M تنتمي إلى كل من $[BP]$ و $[AF]$ وحسب

$$\text{نظرية طاليس فإن } \frac{MA}{MF} = \frac{MB}{MP} = \frac{AB}{PF}$$

لدينا $\frac{MA}{MF} = 1$ لأن M منتصف $[AF]$ أي $MA = MF$ إذن $\frac{MB}{MP} = 1$

التمثيل:



ومنه $MB = MP$ أي M منتصف $[BP]$.

(2) لدينا في الرباعي $ABFP$ ، M منتصف كلا من $[AF]$ و $[BP]$ أي قطراه قطراه متناصفان معناه أن هذا الرباعي $ABFP$ متوازي الأضلاع

حل التمرين الثالث

الحالة الأولى: لدينا $\frac{OD}{OB} = \frac{3,75}{9} = 0,416$ و $\frac{OC}{OA} = \frac{5}{12} = 0,416$


ومنه $\frac{OD}{OB} = \frac{OC}{OA}$ وبما أن D تنتمي إلى $[OB]$ و C تنتمي إلى $[OA]$

و حسب النظرية العكسية لنظرية طاليس فإن $(CD) \parallel (AB)$.

الحالة الثانية: لدينا $\frac{OB}{OC} = \frac{2}{2} = 1$ لكن $\frac{OA}{OD} = \frac{2,1}{1,8} = 1,16$

أي $\frac{OA}{OC} \neq \frac{OB}{OD}$ وبالتالي (AB) لا يوازي (CD) .

حل التمرين الرابع



ومنه $IP = 4,9 - 2,8 = 2,1$ و $\frac{IK}{IP} = \frac{2,8}{2,1} = 1,33$

أي $IL = \frac{3}{4}IJ$ و $\frac{IJ}{IL} = \frac{4}{3} = 1,33$ ومنه

ومنه نستنتج أن $\frac{IK}{IP} = \frac{IJ}{IL}$ وبما أن I تنتمي إلى كل من $[PK]$ و $[JL]$

فإن حسب النظرية العكسية لنظرية طاليس فإن $(PL) \parallel (JK)$.

حل التمرين الخامس

بما أن $(AC) \perp (AE)$ و $(AE) \perp (EF)$ فإن $(EF) \parallel (AC)$.

و B تنتمي إلى كلا من $[AE]$ و $[CF]$ و حسب نظرية طاليس فإن $\frac{BC}{BF} = \frac{BA}{BE}$

ومنه $\frac{BC}{6} = \frac{12,8}{4,8}$ أي $BC = \frac{12,8 \times 6}{4,8}$ أي $BC = 16cm$

حل التمرين السادس

(I) $602 = 258 \times 2 + 86$

$258 = 86 \times 3 + 0$

ومنه $PGCD(258; 602) = 86$

$\frac{330}{770} = \frac{330 + 110}{770 + 110} = \frac{3}{7}$


$\frac{258}{602} = \frac{258 + 86}{602 + 86} = \frac{3}{7}$

..... (II) $\frac{IA}{ID} = \frac{25,8}{60,2} = \frac{25,8 \times 10}{60,2 \times 10} = \frac{258}{602} = \frac{3}{7}$

..... (2) $\frac{IB}{IC} = \frac{33}{77} = \frac{33 \times 10}{77 \times 10} = \frac{330}{770} = \frac{3}{7}$

من (1) و (2) نستنتج أن $\frac{IA}{ID} = \frac{IB}{IC}$ و حسب النظرية العكسية لنظرية

طاليس فإن $(CD) \parallel (AB)$.



(حسب نظرية فيثاغورس المطبقة على المثلث

(AMN

$$MN^2 = AM^2 + AN^2$$

$$MN^2 = 4^2 + 7,5^2$$

$$MN = \sqrt{72,25}$$

$$MN = 8,5 \text{ ومنه}$$

(حسب نظرية فيثاغورس المطبقة على المثلث ABC

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$BC^2 = 2,4^2 + 4,5^2$$

$$BC = \sqrt{26,01}$$


$$BC = 5,1 \text{ ومنه}$$

$$\frac{MN}{BC} = \frac{8,5}{5,1} = 1,66 / \frac{AN}{AC} = \frac{7,5}{4,5} = 1,66 / \frac{AM}{AB} = \frac{4}{2,4} = 1,66$$

نلاحظ أن $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ لكن A تنتمي إلى [MB] و A لا تنتمي إلى [NC]

وبالتالي (MN) لا يوازي (BC).

(1) لدينا في المثلث FDC ، B تنتمي إلى [FC] و I تنتمي إلى [FD] .
B منتصف [FC] و (BI) يوازي (CD) إذن حتماً I منتصف [FD] .



(خاصية مستقيم المنتصفين المدرسة في السنة الثالثة متوسط)

(2) لدينا في الرباعي AFBD ، I منتصف [FD] من السؤال الأول..... (1)

(2).... $\frac{IB}{AB} = \frac{1}{2}$ لكن $CD = AB$ ومنه $\frac{IB}{CD} = \frac{1}{2}$ اي I منتصف [AB] .

من (1) و (2) نستنتج أن القطرين [AB] و [FD] متناصفان ومنه الرباعي AFBD متوازي الأضلاع.

(3) (AI) // (CD) و J تنتمي إلى [AC] و J تنتمي إلى [DF] وحسب

$$\text{نظرية طاليس فإن } \frac{JI}{JD} = \frac{JA}{JC} = \frac{AI}{CD}$$

$$\text{لكن } \frac{AI}{CD} = \frac{1}{2} \text{ إذن } \frac{JI}{JD} = \frac{1}{2} \text{ ومنه } JD = 2 \times JI$$

حل التمرين التاسع

المسافة بين عيني أمين وقطر حبة العدس،

المسافة بين عيني أمين وقطر القمر.

قطر القمر

$$338900\text{km} = 3389 \times 10^5 \text{ mm} \quad / \quad AF = 66\text{cm} = 660\text{mm}$$

$$\frac{AF}{AO} = \frac{AB}{AD} = \frac{BF}{DO} \quad \text{حسب نظرية طاليس لدينا}$$

$$3 \times 3389 \times 10^5 = 660 \times DO \quad \text{ومنه} \quad \frac{660}{3389 \times 10^5} = \frac{AB}{AD} = \frac{3}{DO} \quad \text{أي}$$

$$DO = 15,4045 \times 10^5 \quad \text{أي} \quad DO = \frac{3 \times 3389 \times 10^5}{660}$$

$$DE = 15,4045 \times 10^5 \times 2 \quad \text{ومنه} \quad DE = 2 \times DO$$

$$DE = 3080,9\text{km} \quad \text{أو} \quad DE = 30,809 \times 10^5 \text{ mm}$$

وبالتالي طول قطر القمر يساوي بالتقريب 3080,9km.

حل التمرين العاشر



$$(1) \quad \text{لدينا } CD = BD \quad \text{لان } D \text{ منتصف } [BC] \quad \text{اذن} \quad \frac{CP}{CD} + \frac{BP}{BD} = \frac{CP}{CD} + \frac{BP}{CD} = \frac{BC}{CD}$$

$$\frac{CP}{CD} + \frac{BP}{BD} = 2 \quad \text{ومنه} \quad \frac{BC}{CD} = 2 \quad \text{أي} \quad BC = 2CD \quad \text{لكن}$$

(2) الحالة الاولى

$$\frac{CP}{CD} = \frac{DP}{BD} = \frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{6}{12} = \dots\dots$$

الحالة الثانية

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2 \quad \text{لان} \quad \frac{BP}{BD} = \frac{3}{2} \quad / \quad \frac{CP}{CD} = \frac{1}{2}$$

الحالة الثالثة

$$\frac{1}{4} + \frac{7}{4} = 2 \quad \text{لان} \quad \frac{BP}{BD} = \frac{7}{4} \quad / \quad \frac{CP}{CD} = \frac{1}{4}$$

(3) لدينا في المثلث BMP، $BMP \sim ADP$ و حسب نظرية طاليس فإن

$$\frac{BP}{BD} = \frac{BM}{BA} = \frac{PM}{AD} \quad \text{أو} \quad (1) \quad \frac{BD}{BP} = \frac{BA}{BM} = \frac{AD}{PM}$$


لدينا في المثلث CAD، $CAD \sim PND$ و حسب نظرية طاليس فإن

$$\frac{CP}{CD} = \frac{CN}{CA} = \frac{PN}{AD} \quad \dots\dots (2)$$


$$\frac{PM}{AD} + \frac{PN}{AD} = 2 \quad \text{من السؤال الأول فإن} \quad \frac{CP}{CD} + \frac{BP}{BD} = 2$$

$$\text{أي} \quad \frac{PM + PN}{AD} = 2 \quad \text{ومنه} \quad PM + PN = 2AD$$

حل التمرين الحادي عشر



حل التمرين الثالث عشر



لدينا في المثلث ABC :

M تنتمي إلى $[AB]$ و I تنتمي إلى $[AC]$ و $(MI) \parallel (BC)$

فحسب نظرية طاليس : (1) $\frac{AM}{AB} = \frac{AI}{AC}$

لدينا في المثلث ACD :


N تنتمي إلى $[AD]$ و I تنتمي إلى $[AC]$ و $(NI) \parallel (CD)$

فحسب نظرية طاليس : (2) $\frac{AN}{AD} = \frac{AI}{AC}$

من (1) و (2) نستنتج أن $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AD}$ وحسب النظرية العكسية

لنظرية طاليس فإن $(MN) \parallel (BD)$.

حل التمرين الرابع عشر



(1) حسب نظرية فيثاغورث لدينا : $AM^2 = AB^2 + BM^2$

$$AM^2 = 12^2 + 5^2$$

$AM^2 = 169$ أي $AM = \sqrt{169}$ ومنه $AM = 13cm$

(2) حسب نظرية طاليس لدينا : $\frac{MN}{MA} = \frac{MC}{MB} = \frac{NC}{AB}$

أي $\frac{MN}{13} = \frac{2}{5}$ ومنه $MN = \frac{2 \times 13}{5}$ أي $MN = 5,2cm$

أي $\frac{MC}{MB} = \frac{NC}{AB}$ أي $\frac{2}{5} = \frac{NC}{12}$ ومنه $NC = \frac{12 \times 2}{5}$ أي $NC = 4,8cm$

حل التمرين الثاني عشر



(1) $(EB) \perp (OA)$ و $(CF) \perp (OA)$ هذا يعني أن $(EB) \parallel (CF)$.

ومنه وحسب نظرية طاليس فإن : $\frac{OE}{OF} = \frac{OC}{OB}$

لكن $\frac{OC}{OB} = 1$ إذن $\frac{OE}{OF} = 1$ هذا يعني أن $OE = OF$ أي O منتصف $[EF]$.

(2) الرباعي $ECFB$ متوازي الأضلاع لأن قطريه $[EF]$ و $[BC]$ متناصفان.

حل تمارين السلسلة العاشرة

حل التمرين الأول

$\cos 75^\circ = 0,258$, $\cos 45^\circ = 0,707$, $\cos 30^\circ = 0,866$, $\cos 3^\circ = 0,998$
لدينا $3^\circ < 30^\circ < 45^\circ < 75^\circ$ لكن $\cos 3^\circ > \cos 30^\circ > \cos 45^\circ > \cos 75^\circ$
وبالتالي كلما زاد قياس الزاوية α كلما نقصت قيمة $\cos \alpha$.

حل التمرين الثاني

$x = 14^\circ$ أي $\cos x = 0,97$	$x = 57^\circ$ أي $\cos x = 0,545$
$x = 30^\circ$ أي $\sin x = 0,5$	$x = 7^\circ$ أي $\sin x = 0,122$
$x = 31^\circ$ أي $\tan x = 0,602$	$x = 35^\circ$ أي $\tan x = 0,707$

حل التمرين الثالث


$$\cos x \hat{O} y = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} \text{ أي } \cos x \hat{O} y = 0,2$$

نعلم أن طول الضلع المجاور

$$\cos x \hat{O} y = \frac{\text{طول الضلع المجاور}}{\text{طول الوتر}} \text{ أي أن } 1 \text{ هو طول الضلع المجاور}$$

طول الوتر 5 هو طول الوتر

ومنه ننشئ مثلث قائم في A حيث $OA = 1$ و $OB = 5$ ونحصل على الزاوية $x \hat{O} y$.



$$(1) \dots\dots\dots \frac{AB}{AD} = \frac{1}{3} \text{ أي } AB = \frac{1}{3} AD$$

$$(2) \dots\dots\dots \frac{AC}{AE} = \frac{1}{3} \text{ أي } AC = \frac{1}{3} AE$$

من (1) و (2) نستنتج أن: $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$ وحسب النظرية العكسية لنظرية طاليس فإن: $(BC) \parallel (DE)$.

$$(2) \text{ سلم التصغير هو النسبة } \frac{AB}{AD} \text{ أي } \frac{1}{3}.$$

(3) لتكن S مساحة المثلث ABC ، S' مساحة المثلث ADE ، k سلم التصغير.

$$S = k^2 \times S' \text{ أي } S = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 54 \text{ ومنه } S = 6 \text{ cm}^2$$



حل التمرين الرابع
 $\sin \hat{B} = \sin 32^\circ = 0,52$ و $\sin \hat{B} = \frac{AC}{BC} = \frac{9}{BC}$

ومنه $\frac{9}{BC} = 0,52$

أي $BC = \frac{9}{0,52}$


أي $BC = 17 \text{ cm}$

$\sin \hat{B} = \sin 68^\circ = 0,92$ و $\sin \hat{B} = \frac{AC}{BC} = \frac{AC}{12}$

ومنه $\frac{AC}{12} = 0,92$

أي $AC = 0,92 \times 12$

أي $AC = 11 \text{ cm}$



حل التمرين الخامس

(1) حسب نظرية فيثاغورث لدينا:

$AB^2 = AC^2 - BC^2$ أي $AC^2 = BC^2 + AB^2$

$AB = 9,6 \text{ cm}$ أي $AB = \sqrt{92,6}$ ومنه $AB^2 = 92,6$ أي $AB^2 = 10^2 - 2,8^2$

(2) $\hat{A} = \sin^{-1} 0,28 = 16^\circ$ ومنه $\sin \hat{A} = 0,28$ أي $\sin \hat{A} = \frac{BC}{AC} = \frac{2,8}{10}$

الطريقة 1: $\tan \hat{C} = \frac{AB}{BC} = \frac{9,6}{2,8}$ أي $\tan \hat{C} = 3,42$

ومنه بما أن: $\tan 74^\circ \approx 3,42$ فإن: $\hat{C} = 74^\circ$

الطريقة 2: $\cos \hat{C} = \frac{2,8}{10}$ أي

بما أن: $\cos 74^\circ \approx 0,28$

إذن: $\hat{C} = 74^\circ$




$\sin x\hat{o}y = \frac{3}{7}$

نعلم أن طول الضلع المقابل

$\sin x\hat{o}y = \frac{\text{طول الضلع المقابل}}{\text{طول الوتر}}$ أي أن 3 هو طول الضلع المقابل

طول الوتر 7 هو طول الوتر

ومنه ننشئ مثلث قائم في A حيث $AB = 3$ و $OB = 7$ ونحصل على الزاوية $x\hat{o}y$




$\tan x\hat{o}y = 1,5 = \frac{3}{2}$

نعلم أن طول الضلع المقابل

$\sin x\hat{o}y = \frac{\text{طول الضلع المقابل}}{\text{طول الوتر}}$ أي أن 3 هو طول الضلع المقابل

طول الضلع المجاور 2 هو طول الضلع المجاور

ومنه ننشئ مثلث قائم في A حيث $OA = 2$ و $AB = 3$ ونحصل على الزاوية $x\hat{o}y$



حل التمرين السادس

$$\tan \hat{SRT} = \frac{ST}{RS} = \frac{6}{4} = 1,5, \quad \hat{RST} = 90^\circ \quad (1)$$

بما أن: $\tan 56^\circ \approx 1,5$ فإن: $\hat{SRT} = 56^\circ$


$$\hat{STR} = 180^\circ - (90^\circ + 56^\circ) = 34^\circ \quad \text{الطريقة 1:}$$

$$\text{الطريقة 2: } \tan \hat{STR} = \frac{4}{6} = 0,66 \quad \text{بما أن: } \tan 74^\circ \approx 0,66 \quad \text{إذن: } \hat{STR} = 34^\circ$$

$$\hat{STR} = \tan^{-1} 0,66 = 34^\circ$$

$$\text{ومنه } \hat{STR} = 34^\circ, \quad \hat{SRT} = 56^\circ, \quad \hat{RST} = 90^\circ$$

(2) إنشاء الشكل



حل التمرين السابع

• محيط المربع IJKL هو 200mm

$$P_1 = IJ \times 4 = 5 \times 4 = 20\text{cm} = 200\text{mm}$$

• محيط المستطيل ABCD هو 234mm

$$\left\{ \begin{array}{l} \tan \hat{BDC} = \frac{BC}{CD} = \frac{BC}{8} \\ \tan \hat{BDC} = \tan 25^\circ = 0,46 \end{array} \right. \quad \text{أي } \frac{BC}{8} = 0,46 \quad \text{أي } BC = 8 \times 0,46$$

$$\text{ومنه } BC = 3,68\text{cm}$$

$$P_2 = (CD + BC) \times 2 = (8 + 3,68) \times 2 = 23,36\text{cm} = 233,6\text{mm} = 234\text{mm}$$

• محيط شبه المنحرف PQNM هو 228mm

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin \hat{PMN} = \frac{QN}{PM} = \frac{4}{PM} \\ \sin \hat{PMN} = \sin 70^\circ = 0,93 \end{array} \right. \quad \text{أي } \frac{4}{8PM} = 0,93 \quad \text{أي } PM = \frac{4}{0,93}$$

$$\text{ومنه } PM = 4,30\text{cm}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tan \hat{PMR} = \frac{PR}{MR} = \frac{4}{MR} \\ \tan \hat{PMR} = \tan 70^\circ = 2,74 \end{array} \right. \quad \text{أي } \frac{4}{MR} = 2,74 \quad \text{أي } MR = \frac{4}{2,74}$$

$$\text{ومنه } MR = 1,45\text{cm}$$

$$P_3 = 5 + 4 + (5 + 1,45) + 4,30 \quad \text{أي } P_3 = PQ + QN + NM + PM$$

$$\text{ومنه } P_3 = 22,75\text{cm} = 227,5\text{mm} = 228\text{mm}$$


• محيط متوازي الأضلاع EFGH هو 200mm

EFGH متوازي الأضلاع وله ضلعين متتاليين متقايسين أي EFGH

$$\text{معين ومنه كل أضلاعه متقايسة أي } P_4 = 5 \times 4 = 20\text{cm} = 200\text{mm}$$

حل التمرين الثامن

(1)



بما أن المثلث MNP المرسوم داخل الدائرة © أحد أضلاعه [MN]

وبالتالي MNP مثلث قائم في P (نظرية درست في الثالثة متوسط)

$$\cos \hat{MNP} = \frac{NP}{MN} = \frac{4}{6} = 0,66 \quad \text{وبما أن: } \cos 49^\circ \approx 0,66 \quad \text{إذن:}$$

$$\hat{MNP} = \cos^{-1} 0,66 = 49^\circ$$

حل التمرين التاسع

$$\cos x = 0,6 \quad (1)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \text{أي } \sin^2 x + 0,6^2 = 1 \quad \text{أي } \sin^2 x = 1 - 0,6^2$$

ومنه $AH = 8,1\text{cm}$ أي $AH = 2,7 \times 3$


طريقة الإنشاء

ننشئ $BC = 5,4\text{cm}$ ثم نصف

مستقيم (Hx) عمودي على (BC)

وأخيرا نعين النقطة A

على (Hx) حيث $HA = 8,1\text{cm}$



حل التمرين الحادي عشر

$$(Sina + Cosa)^2 + (Sina - Cosa)^2 = \quad (1)$$


$$\underbrace{\sin^2 a + \cos^2 a + 2\sin a \cos a}_{1} + \underbrace{\sin^2 a + \cos^2 a - 2\sin a \cos a}_{1} =$$

$$1 + 1 = 2$$

$$1 + \tan^2 a = 1 + \frac{\sin^2 a}{\cos^2 a} = \frac{\cos^2 a + \sin^2 a}{\cos^2 a} = \frac{1}{\cos^2 a} \quad (2)$$

$$\frac{1}{\cos^2 a} - (1 - \tan^2 a) = 1 + \tan^2 a - 1 + \tan^2 a = 2 \tan^2 a \quad (3)$$

حل التمرين الثاني عشر



ومنه $\sin x = \sqrt{0,64}$ أي $\sin x = 0,8$

ومنه $\tan x = 1,3$ أي $\tan x = \frac{0,8}{0,6}$

$$\cos x = \frac{2}{5} \quad (b)$$

ومنه $\hat{x} = \cos^{-1} \frac{2}{5} = 66,42^\circ$ أي $\sin x = 0,91$

ومنه $\tan 66,42^\circ = 2,29$ أي $\tan x = 2,29$

$$\sin x = \frac{3}{4} \quad (2)$$

أي $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ أي $\left(\frac{3}{4}\right)^2 + \cos^2 x = 1$

ومنه $\cos x = \sqrt{0,4375}$ أي $\cos^2 x = 0,4375$


$$\cos x = \frac{2\sqrt{5}}{5} \quad (3)$$

ومنه $\hat{x} = \cos^{-1} \frac{2\sqrt{5}}{5} = 26,56^\circ$ أي $\sin x = 0,44$

حل التمرين العاشر

$$\tan \hat{A} = \frac{BC}{AB} = \frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6} \quad (1)$$

ومنه: $BC = 4\text{cm}$



$$\tan \hat{B} = \frac{AH}{BH} = \frac{AH}{5,4} = 3 \quad (2)$$

$$3x^2 - x^2 + 4x - 12x + 40 - 40 = 0$$

$2x^2 - 8x = 0$ أي $2x(x-4) = 0$ إما $x = 0$ حل مرفوض وإما $x = 4$ مقبول.

حل التمرين الثالث عشر

$$\left\{ \begin{array}{l} \tan \hat{BAC} = \frac{BC}{AB} = \frac{BC}{100} \\ \tan \hat{BAC} = \tan 22^\circ = 0,40 \end{array} \right. \quad (1)$$

ومنه $BC = 40m$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tan \hat{BAD} = \frac{BD}{AB} = \frac{BD}{100} \\ \tan \hat{BAD} = \tan 60^\circ = 1,73 \end{array} \right. \quad (2)$$

ومنه $BD = 173m$

(3) عرض الوادي هو $BD - BC = 173 - 40 = 133m$

حل التمرين الرابع عشر

$$\frac{CH}{6} = 0,34 \quad \left\{ \begin{array}{l} \cos \hat{C} = \cos 70^\circ = 0,34 \\ \cos \hat{C} = \frac{CH}{CA} = \frac{CH}{6} \end{array} \right.$$

ومنه $CH = 2,04cm$

(حسب نظرية فيثاغورث) $AH^2 + CH^2 = AC^2$

$AH^2 = AC^2 - CH^2$ أي $AH^2 = 6^2 - 2,04^2$ ومنه $AH = 5,64cm$

$$\frac{5,64}{AB} = 0,5 \quad \left\{ \begin{array}{l} \sin \hat{B} = \sin 30^\circ = 0,5 \\ \sin \hat{B} = \frac{AH}{AB} = \frac{5,64}{AB} \end{array} \right.$$

ومنه $AB = 2,82cm$

$$\frac{5,64}{HB} = 0,57 \quad \left\{ \begin{array}{l} \tan \hat{B} = \tan 30^\circ = 0,57 \\ \tan \hat{B} = \frac{AH}{HB} = \frac{5,64}{HB} \end{array} \right.$$

ومنه $HB = 5,64 \times 0,57$

$HB = 3,21cm$

$BC = CH + HB$ أي $BC = 2,04 + 3,21$ ومنه $BC = 5,25cm$


$$\tan \hat{AED} = \frac{AD}{AE} = \frac{6}{4} = 1,5 \quad \text{ومنه} \quad \hat{AED} = \tan^{-1} 1,5 = 56^\circ \quad (b)$$

$$\tan \hat{BEF} = \frac{BF}{EB} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad \text{ومنه} \quad \hat{BEF} = \tan^{-1} \frac{2}{3} = 34^\circ$$

$$\hat{DEF} = 90^\circ \quad \text{أي} \quad \hat{DEF} = 180^\circ - (56^\circ + 34^\circ) = 180^\circ - 90^\circ \quad (c)$$

ومنه المثلث DEF قائم في A .

(II)



$$A'E' = B'F' = x \quad A'D' = x+2 \quad A'B' = x+6 \quad (a)$$

$AB = x+6$ أي $x+6 = 10$ ومنه $x = 4$

$AD = x+2$ أي $x+2 = 6$ ومنه $x = 4$

(b)

$$D'E'^2 = A'E'^2 + A'D'^2 = x^2 + (x+2)^2 = x^2 + x^2 + 4 + 4x = 2x^2 + 4x + 4$$

$$E'F'^2 = E'B'^2 + B'F'^2 = (x+6-x)^2 + x^2 = 36 + x^2$$

$$D'F'^2 = D'C'^2 + F'C'^2 = (x+6)^2 + (x+2-x)^2 = x^2 + 36 + 12x + 4 =$$

$$x^2 + 12x + 40$$


(c) لكي يكون المثلث $D'E'F'$ قائم في E' يجب أن تتحقق العلاقة :

$$D'E'^2 + E'F'^2 = D'F'^2$$

$$2x^2 + 4x + 4x + 36 + x^2 = x^2 + 12x + 40$$

حل تمارين السلسلة الحادية عشر


حل التمرين الأول



حل التمرين الثاني

لا الدائرة (C') ليست صورة الدائرة (C) لان :
 نصف قطر الدائرة (C) هو OA ونصف قطر الدائرة (C') هو OB
 لكن $OA \neq OB$ ونحن نعلم ان الانسحاب يحافظ على التقايس.

حل التمرين الثالث



حل التمرين الخامس عشر


$$\alpha = \hat{BDC} - \hat{ADC}$$

$$\hat{BDC} = \tan^{-1} 0,57 = 30^\circ \text{ ومنه } \tan \hat{BDC} = \frac{BC}{CD} = \frac{4}{7} = 0,57$$

$$\tan^{-1} 0,42 = 23^\circ \text{ ومنه } \tan \hat{ADC} = \frac{AC}{CD} = \frac{3}{7} = 0,42$$

$$\alpha = 30^\circ - 23^\circ = 7^\circ \text{ وبالتالي:}$$

حل التمرين السادس عشر



$$\tan \hat{ADB} = \frac{AB}{AD} = \frac{6}{4} = 1,5$$

$$\tan \hat{ACB} = \frac{AB}{AC} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

$$BD^2 = AD^2 + AB^2 \text{ (حسب نظرية فيثاغورث)}$$

$$BD = \sqrt{52} = 7,2 \text{ cm ومنه } BD^2 = 52 \text{ اي } BD^2 = 6^2 + 4^2$$

$$\cos \hat{ABD} = \frac{AD}{BD} = \frac{4}{7,2} = \frac{5}{6} \text{ وبالتالي:}$$


(1) المثلث ABC قائم في C لأن أحد أضلاعه $[AB]$ قطر للدائرة (C) .

(2) O' و C متطابقتان و O' منتصف $[OC']$.

(3) بما أن الإنسحاب يحفظ على المسافات و على التقايس و على الأطوال

فإن المثلثين ABC و $A'B'C'$ متقايسان، ومنه المثلث $A'B'C'$ قائم في C' .

حل التمرين الرابع



(1) صورة A بالإنسحاب الذي شعاعه AB متبوعا بالإنسحاب الذي شعاعه FE هي النقطة C .


(2) صورة E بالإنسحاب الذي شعاعه ED متبوعا بالإنسحاب الذي شعاعه CB هي النقطة A .

حل التمرين الخامس

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AE} &= \overrightarrow{CE} \\ \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} &= \overrightarrow{BE}\end{aligned}$$

حل التمرين السادس

(1)



(2)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{EC} &= \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{EB} \\ \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{AG} &= \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{EB} \\ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CE} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} \\ \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CF} &= \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CA} \\ \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FC} &= \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FB} \\ \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{BD} &= \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{FE}\end{aligned}$$



(2) $ABDC$ متوازي الأضلاع لأن قطريه $[AD]$ و $[BC]$ متناصفان.

وبما أن $AB = AC$ لأن المثلث ABC متساوي الساقين فإن

الرباعي $ABDC$ معين.

(3) بما أن $\overline{BC} = \overline{AE}$ فإن الرباعي متوازي أضلاع.

(4) $\overline{EC} = \overline{AB}$ لأن $AECB$ متوازي أضلاع..... (1)

(2) $\overline{AB} = \overline{CD}$ لأن $ABDC$ متوازي أضلاع.....


من (1) و (2) نستنتج أن $\overline{EC} = \overline{CD}$

حل التمرين الثامن


بما أن $BLKD$ متوازي أضلاع فإن $\overline{BL} = \overline{DK}$.

$\overline{LE} = \overline{LA} + \overline{LK}$ معناه أن الرباعي $LAEK$ متوازي أضلاع ومنه $\overline{LA} = \overline{KE}$.

بما أن $BL = LA$ لأن L منتصف $[AB]$ فإن $DK = KE$ أي K منتصف $[ED]$.



حل التمرين التاسع



$$\left\{ \begin{array}{l} (a) \text{ (1) } K \text{ منتصف } [AC] \\ J \text{ منتصف } [BC] \end{array} \right. \text{ حسب نظرية طاليس } \frac{CK}{CA} = \frac{CJ}{CB} = \frac{KJ}{AB} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{KJ}{AB} = \frac{1}{2} \text{ معناه } AB = 2KJ \text{ ومنه } \frac{AB}{2} = KJ \text{ أي } \frac{AB}{2} = \frac{2KJ}{2}$$

$$\text{لكن } \frac{AB}{2} = AI \text{ ومنه } AI = KJ$$

$$\text{بما أن } (KJ) \parallel (AI) \text{ فإن } \overline{AI} = \overline{KJ}$$

$$(b) \overline{AJ} = \overline{AK} + \overline{KJ} \text{ لكن } \overline{KJ} = \overline{AI} \text{ ومنه } \overline{AJ} = \overline{AK} + \overline{AI}$$

$$(2) \overline{BK} = \overline{BA} + \overline{AK} \text{ و } \overline{CI} = \overline{CA} + \overline{AI}$$

$$\overline{AJ} + \overline{BK} + \overline{CI} = \overline{AK} + \overline{AI} + \overline{BA} + \overline{AK} + \overline{CA} + \overline{AI}$$

$$= 2\overline{AK} + 2\overline{AI} + \overline{BA} + \overline{CA}$$

$$= 2\overline{AK} + \overline{CA} + 2\overline{AI} + \overline{BA}$$

حل التمرين الحادي عشر


$$AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 100 \quad (1)$$

$$BC^2 = 10^2 = 100$$

ومنه: $AB^2 + AC^2 = BC^2$ أي أن المثلث ABC قائم في A حسب النظرية العكسية لنظرية فيثاغورث.

(2) نوع الرباعي $AMHB$ متوازي الأضلاع لأن $\overline{AB} = \overline{MH}$

$$BH = 5\text{cm} \text{ ومنه } BH = AM = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 10$$



حل التمرين الثاني عشر

$$\overline{EG} + \overline{GF} = \overline{EF}$$

$$\overline{EH} + \overline{EF} = \overline{EH} + \overline{HG} = \overline{EG}$$

$$\overline{EG} + \overline{GF} + \overline{KG} = \overline{EF} + \overline{KG} = \vec{0}$$

$$\overline{EF}$$


لأن $\overline{KG}$ و $\overline{EF}$ شعاعان متعاكسان.

حل التمرين الثالث عشر

$$\overline{AB} = \overline{AD} + \overline{DB} \quad (1)$$

$$\overline{CD} = \overline{CB} + \overline{BD}$$

$$\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{DB} + \overline{CB} + \overline{BD}$$



$$\begin{aligned} &= \overline{AC} + \overline{CA} + \overline{AB} + \overline{BA} \\ &= \vec{0} + \vec{0} \\ &= \vec{0} \end{aligned}$$

حل التمرين العاشر



(1) لدينا $AD = BC$ و $AD = ED$ إذن $ED = BC$ (1)

(2)..... $(BC) \parallel (ED)$ و $(ED) \parallel (AD)$ و $(BC) \parallel (AD)$

من (1) و (2) نستنتج أن الرباعي $EDBC$ متوازي أضلاع ومنه $EC = DB$ (3)

لدينا $AB = BF$ و $AB = DC$ إذن $DC = BF$ (4)

(5)..... $(DC) \parallel (BF)$ و $(BF) \parallel (AB)$ و $(DC) \parallel (AB)$

من (4) و (5) نستنتج أن الرباعي $BFCD$ متوازي أضلاع ومنه $CF = DB$ (6)

بجمع المساوتين (3) و (6) طرفاً لطرف نحصل على $EC + CF = DB + DB$

$$\text{أي } EF = 2DB$$

لدينا $\frac{AB}{AF} = \frac{AD}{AE} = \frac{DB}{EF} = \frac{1}{2}$ و B تنتمي إلى $[AF]$ و D تنتمي إلى $[AE]$

إذن حسب النظرية العكسية لنظرية طاليس فإن $(BD) \parallel (EF)$.

(2) لدينا في المثلث EAF ، $(AF) \parallel (CD)$ إذن حسب نظرية طاليس $\frac{ED}{EA} = \frac{EC}{EF}$


$$\text{لكن } \frac{ED}{EA} = \frac{1}{2} \text{ ومنه } \frac{EC}{EF} = \frac{1}{2} \text{ أي } EF = 2EC$$

$$EF = 2EC \text{ معناه } C \text{ منتصف } [EF].$$

حل التمرين الأول

$D(m;n)$, $C(a,b)$, $\vec{U}(-1;5)$, $B(3;-4)$, $A(-5;2)$

(1)



$$a = +2 \text{ ومنه } a - 3 = -1$$

$$\vec{BC}(a - 3; b + 4) = \vec{U}(-1; 5) \quad (2)$$

$$b = 1 \text{ ومنه } b + 4 = 5$$

$$C(+2; +1) \text{ ومنه}$$

$$= \vec{AD} + \vec{CB} + \vec{DB} + \vec{BD}$$

$$= \vec{AD} + \vec{CB} + \vec{0}$$

$$= \vec{AD} + \vec{CB}$$

$$\vec{AC} + \vec{BD} = (\vec{AD} + \vec{DC}) + (\vec{BC} + \vec{CD}) \quad (2)$$

$$= \vec{AD} + \vec{BC} + \vec{DC} + \vec{CD}$$

$$= \vec{AD} + \vec{BC} + \vec{0}$$

$$= \vec{AD} + \vec{BC}$$


حل التمرين الرابع عشر

بما أن $\vec{MO} = \vec{NI}$ فإن الرباعي MOIN متوازي أضلاع.

لكن $MO = NI$ و $MO = MN$ إذن $MO = MN = NI = MO$

ومنه الرباعي MOIN معين أو مربع

وبالتالي القطرين [MI] و [NO] متعامدين.



(2) بما أن $\overline{AD} = \overline{BC}$ فإن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

M منتصف كلا من $[AC]$ و $[BD]$.

$$M(0;0,5), M\left(\frac{-1-1}{2}; \frac{-2+3}{2}\right), M\left(\frac{x_A+x_C}{2}; \frac{y_A+y_C}{2}\right)$$

حل التمرين الثالث


$$\overline{AB}(-2;4), \overline{AB}(-1-1;8-4) \quad (2)$$

$$\overline{AD}(8;4), \overline{AD}(9-1;8-4)$$

$$\overline{BD}(10;0), \overline{BD}(9+1;8-8)$$

$$AD = \sqrt{8^2 + 4^2} = \sqrt{80} \quad / \quad AB = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} \quad (3)$$

$$BD = \sqrt{10^2 + 0^2} = \sqrt{100} = 10$$




$$\left. \begin{array}{l} a = -6 \text{ ومنه } m+5 = -1 \\ b = 7 \text{ ومنه } n-2 = 5 \end{array} \right\} \text{أي } \overline{AD}(m+5; n-2) = \overline{U}(-1;5)$$

ومنه $D(-6;7)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \overline{AD}(-1;5) \text{ أي } \overline{AD}(-6+5;7-2) \quad (3) \\ \overline{BC}(-1;5) \text{ أي } \overline{BC}(2-3;1+4) \end{array} \right.$$

$ABCD$ متوازي الأضلاع.

حل التمرين الثاني



(1) نبرهن أن $\overline{AD} = \overline{BC}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \overline{AD}(5;2) \text{ أي } \overline{AD}(4+1;0+2) \\ \overline{BC}(5;2) \text{ أي } \overline{BC}(1+4;3-1) \end{array} \right.$$

ومنه $\overline{AD} = \overline{BC}$ أي أن D هي صورة A

بالإنسحاب الذي شعاعه $\overline{BC}$

حل التمرين الخامس

$$\overline{AI}(-2;4) , \quad \overline{AI}(1-3;0+4) , \quad I(1;0) \quad (2)$$

بما أن B نظيرة A بالنسبة إلى I فإن $\overline{AB} = 2\overline{AI}$

ومن ثم $\overline{AB}(2 \times (-2); 2 \times 4)$ أي $\overline{AB}(-4;8)$

(3) لكي نستنتج إحداثيتي النقطة B ننشئ الشعاع $\overline{AB}$ بمعرفة إحداثياته

ومن ثم $B(-1;4)$



$$\text{ومن ثم } AD^2 + AB^2 = BD^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} AD^2 + AB^2 = \sqrt{80^2} + \sqrt{20^2} = 80 + 20 = 100 \\ BD^2 = 10^2 = 100 \end{array} \right. \quad (4)$$

وحسب النظرية العكسية

لنظرية فيثاغورث فإن المثلث

ABD قائم في A

(5) لدينا $\overline{AB} + \overline{AD} = \overline{AC}$ و $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$ حسب علاقة شال

ومن ثم $\overline{AB} + \overline{AD} = \overline{AB} + \overline{BC}$ أي $\overline{AD} = \overline{BC}$ وبالتالي الرباعي

$ABCD$ متوازي أضلاع وبما أن BAD قائمة فهو مستطيل


حل التمرين الرابع

(1) بقراءة بيانية نستنتج أن $M(2,5;-3)$


(2) إحداثيتا الشعاع $\overline{OM}$ هما إحداثيتا النقطة M لأن مبدأ الشعاع $\overline{OM}$

هو مبدأ المعلم ومن ثم $\overline{OM}(2,5;-3)$

(3) بما أن M منتصف $[OA]$ فإن $\overline{OM} = \overline{MA}$ وبالتالي $\overline{MA}(2,5;-3)$



(1)



$$C(-3; -5) \quad / \quad B(3; 4) \quad / \quad A(-4; 5)$$

$$M(-0.5; 4.5) \quad , \quad M\left(\frac{-4+3}{2}; \frac{5+4}{2}\right) \quad (2)$$

$$N(0; -0.5) \quad , \quad N\left(\frac{3-3}{2}; \frac{4-5}{2}\right)$$

$$P(-3.5; 0) \quad , \quad P\left(\frac{-4-3}{2}; \frac{5-5}{2}\right)$$

$$\overline{AM}(3.5; -0.5) \quad , \quad \overline{AM}(-0.5+4; 4.5-5) \quad \bullet$$

$$\overline{MB}(3.5; -0.5) \quad \text{ومنه} \quad \overline{AM} = \overline{MB}$$

$$\overline{BN}(-3; -4.5) \quad , \quad \overline{BN}(0-3; -0.5-4) \quad \bullet$$

$$\overline{MB}(-3; -4.5) \quad \text{ومنه} \quad \overline{BN} = \overline{NC}$$

$$\overline{AP}(+0.5; -5) \quad , \quad \overline{AP}(-3.5+4; 0-5) \quad \bullet$$

$$\overline{PC}(0.5; -5) \quad \text{ومنه} \quad \overline{AP} = \overline{PC}$$

$$\overline{PN}(3.5; -0.5) \quad , \quad \overline{PN}(0+3.5; -0-0) \quad \bullet$$

$$\overline{MP}(-3; -4.5) \quad , \quad \overline{MP}(-3.5+0.5; 0-4.5) \quad \bullet$$

$$\overline{MN}(0.5; -5) \quad , \quad \overline{MN}(0+0.5; -0.5-4.5) \quad \bullet$$


(3) متوازيات أضلاع الشكل هي:

$AMNP$ لأن $\overline{AM} = \overline{PN}$ من السؤال الثاني


$MBNP$ لأن $\overline{MB} = \overline{PN}$ من السؤال الثاني

$PMNC$ لأن $\overline{MN} = \overline{PC}$ من السؤال الثاني

حل التمرين السابع



حل التمرين الثامن



$$\overrightarrow{OC}(+4;+3) / \overrightarrow{AB}(+4;+3) \quad (1)$$

بما أن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OC}$ فإن الرباعي $OABC$ متوازي أضلاع.

حل التمرين التاسع

$$\overrightarrow{AB}(-5;-3) / \overrightarrow{AB}(-3-2;3-6) \quad (2)$$

$$\overrightarrow{DC}(-5;-3) / \overrightarrow{DC}(2-7;0-3)$$

بما أن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ فإن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

$$AB = \sqrt{(-5)^2 + (-3)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34} \quad (3)$$

$$AD = \sqrt{(7-2)^2 + (3-6)^2} = \sqrt{25+9} = \sqrt{34}$$

$$D(x;y) \quad C\left(2;-\frac{6}{4}\right) \quad B(-1;2,5) \quad A(3;5)$$

$$\overrightarrow{AB}(-4;-2,5) / \overrightarrow{AB}(-1-3;2,5-5) \quad (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} x=6 \text{ أي } 2-x=-4 \\ y=1 \text{ أي } -\frac{6}{4}-y=-2,5 \end{array} \right\} \text{ إذا كان } \overrightarrow{AB}(-4;-2,5) = \overrightarrow{DC}\left(2-x;-\frac{6}{4}-y\right)$$

ومنه $D(6;1)$

$$E(x;y) \quad (3)$$

$$\left. \begin{array}{l} x=-2 \text{ أي } x-2=-4 \\ y=-4 \text{ أي } y+\frac{6}{4}=-2,5 \end{array} \right\} \text{ إذا كان } \overrightarrow{AB}(-4;-2,5) = \overrightarrow{CE}\left(x-2;y+\frac{6}{4}\right)$$

ومنه $E(-2;-4)$

$$AC(-1;-6,5) / AC\left(2-3;-\frac{6}{4}-5\right) / F(x;y) \quad (4)$$

$$\left. \begin{array}{l} x=0 \text{ أي } -1-x=-1 \\ y=9 \text{ أي } 2,5-y=-6,5 \end{array} \right\} \text{ إذا كان } \overrightarrow{AC}(-1;-6,5) = \overrightarrow{FB}(-1-x;2,5-y)$$

ومنه $F(0;9)$

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{FA}(3;-4) \text{ أي } \overrightarrow{FA}(3-0;5-9) \\ \overrightarrow{AD}(3;-4) \text{ أي } \overrightarrow{AD}(6-3;1-5) \end{array} \right\} \text{ نستنتج أن } \overrightarrow{FA} = \overrightarrow{AD} \text{ ومنه } A \text{ منتصف } [FD]$$

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{FA}(+1;6,5) \text{ أي } \overrightarrow{EB}(-1+2;2,5+4) \\ \overrightarrow{BF}(1;6,5) \text{ أي } \overrightarrow{BF}(0+1;9-2,5) \end{array} \right\} \text{ نستنتج أن } \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{BF} \text{ ومنه } B \text{ منتصف } [EF]$$

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{EC}(4;+2,5) \text{ أي } \overrightarrow{EC}\left(2+2;-\frac{6}{4}+4\right) \\ \overrightarrow{CD}(4;2,5) \text{ أي } \overrightarrow{CD}\left(6-2;1+\frac{6}{4}\right) \end{array} \right\} \text{ نستنتج أن } \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{CD} \text{ ومنه } C \text{ منتصف } [ED]$$

$$AB = \sqrt{(3+1)^2 + (3-6)^2} = 5 / AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \quad (2)$$

$$AC = \sqrt{(-7+1)^2 + (-2-6)^2} = 10 / AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2}$$

$$/ BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$$

$$BC = \sqrt{(-7-3)^2 + (-2-3)^2} = \sqrt{125}$$

$$AB^2 + AC^2 = 5^2 + 10^2 = 125 \dots (1)$$

$$BC^2 = (\sqrt{125})^2 = 125 \dots (2)$$

من (1) و (2) نستنتج ان $AB^2 + AC^2 = BC^2$ وحسب النظرية العكسية لنظرية

فيثاغورث فإن : المثلث ABC قائم في A .

$$E(-4;2) / E\left(\frac{-1-7}{2}; \frac{6-2}{2}\right) / E\left(\frac{x_A + x_C}{2}; \frac{y_A + y_C}{2}\right) \quad (3)$$


(4)

$$/ EB = \sqrt{(x_B - x_E)^2 + (y_B - y_E)^2}$$

$$EB = \sqrt{(3+4)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

حل التمرين الحادي عشر

(1)




إذا كان $\vec{EB} + \vec{EC} = \vec{0}$ معناه أن الشعاعين $\vec{EB}$ و $\vec{EC}$ متعاكسان وبالتالي E منتصف $[BC]$.

بما أن $AB = AD$ فإن الرباعي $ABCD$ هو معين.

(4) مركز تناظر متوازي الأضلاع هو نقطة تقاطع قطريه أي M منتصف كلا من $[AC]$ و $[BD]$.


$$M(2;3) / M\left(\frac{2+2}{2}; \frac{6+0}{2}\right) / M\left(\frac{x_A + x_C}{2}; \frac{y_A + y_C}{2}\right)$$

(5) صورة المثلث AMD بالتناظر المركزي M الذي مركزه هو المثلث BMC .



حل التمرين العاشر

(1)



$$AC = \sqrt{(-2-2)^2 + (4-7)^2} / AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2}$$

ومنه : $AC = 5$

$$BC = \sqrt{(-2-1)^2 + (4-0)^2} / BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$$

$BC = 5$

$$AB = \sqrt{(1-2)^2 + (7-0)^2} / AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$AB = \sqrt{50}$

$$AC^2 + BC^2 = 5^2 + 5^2 = 50 \dots (1)$$


$$AB^2 = (\sqrt{50})^2 = 50 \dots (2)$$

من (1) و (2) نستنتج أن : $AC^2 + BC^2 = AB^2$

و حسب النظرية العكسية لنظرية فيثاغورث فإن المثلث ABC قائم في C
ومنه (AC) مماس للدائرة (C) في النقطة C .

حل التمرين الثالث عشر

(1)



$$AB = \sqrt{(2-5)^2 + (6-2)^2} = 5 / AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \quad (2)$$

$$BC = \sqrt{(-6-2)^2 + (0-6)^2} = 10 / BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$$

$$E(0,5;0) / E\left(\frac{-1+2}{2}; \frac{3-3}{2}\right) / E\left(\frac{x_B + x_C}{2}; \frac{y_B + y_C}{2}\right)$$

$\overline{AE} = \overline{ED}$ معناد $[AD]$ منتصف E (2)
 $\& D(x_D; y_D)$

$$\overline{AE}(-2,5;-4) / \overline{AE}(0,5-3;0-4) / \overline{AE}(x_B - x_A; y_B - y_A)$$

$x_D - 0,5 = -2,5$ إذا كان $\overline{AE} = \overline{ED} / \overline{ED}(x_D - 0,5; y_D - 0)$

$$x_D = -2 \text{ أي}$$


$$y_D = -4 \text{ و}$$

ومنه : $D(-2;-4)$

(3) E منتصف كلا من $[AD]$ و $[BC]$ أي أن قطري الرباعي $ABDC$ متناصفان ومنه $ABDC$ متوازي أضلاع.


حل التمرين الثاني عشر

(1)



(2) لكي نبين أن (AC) مماس للدائرة (C) في النقطة C يجب أن نبرهن أن
 (AC) عمودي على (BC) لذلك نبرهن أن المثلث ABC قائم في C .

حل التمرين الاول



(a) صورة المثلث ODC بالدوران الذي مركزه O وزاويته 240° في الاتجاه

الموجب هو المثلث OEF .

(b) صورة المثلث ODC بالدوران الذي مركزه O وزاويته 240° في الاتجاه

السالب هو المثلث AOB .

(2) صورة المثلث ODC بالدوران الذي مركزه E وزاويته 60° في الاتجاه

السالب هو المثلث $DD'C$.

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2}$$

$$AC = \sqrt{(-6-5)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{125}$$

$$AB^2 + BC^2 = 5^2 + 10^2 = 125 \dots (1)$$

$$AC^2 = (\sqrt{125})^2 = 125 \dots (2)$$

من (1) و (2) نستنتج أن $AB^2 + BC^2 = AC^2$ وحسب النظرية العكسية

لنظرية فيثاغورث فإن المثلث ABC قائم في B .

(3) يكون الرباعي $ABCD$ مستطيلا إذا كان $\overline{BA} = \overline{CD}$

$$\overline{CD}(x_D + 6; y_D - 0) \quad / \quad \overline{BA}(3; -4) \quad / \quad \overline{BA}(5 - 2; 2 - 6)$$

$$\overline{BA} = \overline{CD} \quad \text{إذا كان} \quad x_D + 6 = 3 \quad \text{ومنه} \quad x_D = -3$$

$$\text{و} \quad y_D - 0 = -4 \quad \text{ومنه} \quad y_D = -4$$

وبالتالي : $D(-3; -4)$

(4) I مركز تناظر $ABCD$ ، نقطة تقاطع القطرين $[AC]$ و $[BD]$ ، أي

I منتصف كلا منهما.


I منتصف $[AC]$

$$I(-0,5;1) \quad / \quad I\left(\frac{5-6}{2}; \frac{2-0}{2}\right) \quad / \quad I\left(\frac{x_A + x_C}{2}; \frac{y_A + y_C}{2}\right)$$

حل التمرين الثاني

(1) طبيعة الرباعي $A'B'C'D'$ هو معين.

(2) مساحة الرباعي $A'B'C'D'$ هي $4 \text{ cm}^2 = \frac{4 \times 2}{2}$



حل التمرين الثالث


(1) $\angle AOB = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$

(2) $\angle AHO = 90^\circ$ لأن OH هو المنتصف في المثلث المتقايس الأضلاع وهو محور وعمود ومتوسط.

$\angle AOH = \frac{72^\circ}{2} = 36^\circ$

(3) $\sin \angle AOH = \sin 36^\circ$ و

$\sin \angle AOH = \frac{AH}{OA} = \frac{AH}{10}$



طول OA في الشكل غير حقيقي

ومنه $\frac{AH}{10} = \sin 36^\circ$ أي $AH = 10 \sin 36^\circ \text{ cm}$ طول $AH = 10 \times 0,5 = 5 \text{ cm}$

(4) $P = 100 \sin 36^\circ$ أي $P = 10 \sin 36^\circ \times 2 \times 5$

ومنه $P = 50 \text{ cm}$


(5) مساحة الخماسي ABCDE هي مجموع مساحات المثلثات الخمسة.

$OH^2 = OA^2 - AH^2$ أي $OH^2 = 10 - \sin 36^\circ$ ومنه $OH = \sqrt{10 - \sin 36^\circ}$

أي $S = \frac{OH}{AB} \times 5$ أي $S = \frac{\sqrt{10 - \sin 36^\circ}}{20 \sin 36^\circ} \times 5$

هذه النتيجة تجدها باستعمال الآلة الحاسبة. $S = 1,09 \text{ cm}^2 = 109 \text{ mm}^2$

حل التمرين الرابع




(1) $\angle ABC = \angle ABO \times 2$ مع العلم أن المثلث ABO متساوي الساقين.

ومنه $\angle ABC = 144^\circ$

(c) محيط المضلع ABCDFEGHIJ هو $2 \times 10 = 20 \text{ cm}$

(2) أي $\tan \angle BOO' = \tan 18^\circ = \frac{O'B}{OO'}$ ومنه $0,3 = \frac{1}{OO'}$



حل التمرين السادس

نلاحظ أن المضلع BASKET الناتج

من الإنشاء متكون من مثلثات كل


منها متقايس الأضلاع ومتقايسة

بمقارنتها ومنه:

$$AB = BT = TE = EK = KS = SA$$

أي أن هذا المضلع سداسي منتظم.

حل التمرين السابع



$$(1) \quad \angle AEB = \frac{1}{2} \angle AOB \quad (\text{خاصية الزاوية المحيطية والمركزية اللتان تحصران}$$

نفس القوس).

$$\angle AEB = \frac{1}{2} \times 70^\circ = 35^\circ$$

$$(2) \quad \angle BOC \quad \text{زاوية مركزية تحصر القوس } \widehat{BC} \quad \text{إذن } \angle BOC = 2\angle CDB$$

$$\angle BOC = 2 \times 30^\circ = 60^\circ \quad \text{ومنه } \angle OBC = \angle OCB = (180^\circ - 60^\circ) \div 2 = 120^\circ \div 2 = 60^\circ$$

$$OO' = \frac{1}{0,3} = 3,3 \text{ cm}$$


$$\text{مساحة المثلث } ABO \text{ هي } \frac{AB \times OO'}{2} = \frac{2 \times 3,3}{2} = 3,3 \text{ cm}^2$$

(b) مساحة المضلع ABCDFEGHIJ هي مساحة المثلث $10 \times AOB$

$$3,3 \times 10 = 33 \text{ cm}^2$$

حل التمرين الخامس

(1)



$$(2) \quad \begin{cases} \widehat{AD} \text{ زاوية محيطية تحصر القوس } \widehat{AD} \\ \widehat{AD} \text{ زاوية محيطية تحصر القوس } \widehat{AD} \end{cases} \quad \text{إذن } \angle ABD = \angle ACD$$

$$\begin{cases} \widehat{BC} \text{ زاوية محيطية تحصر القوس } \widehat{BC} \\ \widehat{BC} \text{ زاوية محيطية تحصر القوس } \widehat{BC} \end{cases} \quad \text{إذن } \angle CAB = \angle CDB$$

لكن $\angle ACD = \angle CAB$ لأنهما زاويتين متبادلتين داخلية $(AB) \parallel (CD)$ و (AC)

قاطع لهما

$$\text{ومنه } \angle ABD = \angle ACD = \angle CAB = \angle CDB$$


$$\begin{cases} \hat{ADB} = \hat{ACB} \text{ إذن } \hat{ADB} \text{ زاوية محيطية تحصر القوس } \widehat{AB} \\ \hat{ACB} \text{ زاوية محيطية تحصر القوس } \widehat{AB} \text{ أي } \hat{ADB} = 35^\circ \end{cases}$$

$$\hat{DCA} = \hat{DCB} - \hat{ACB} \quad (3)$$

$$\hat{DCA} = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$$

$$\begin{cases} \hat{AOD} = 2\hat{DCA} \text{ إذن } \hat{AOD} \text{ زاوية محيطية تحصر القوس } \widehat{AD} \\ \hat{AOD} = 2 \times 55^\circ = 110^\circ \text{ أي } \hat{AOD} \text{ زاوية مركزية تحصر القوس } \widehat{AD} \end{cases}$$

حل التمرين الحادي عشر



ومنه المثلث OBC متقايس الأضلاع .

$$\begin{cases} \hat{ADB} = \hat{AEB} = 35^\circ \text{ إذن } \hat{ADB} \text{ زاوية محيطية تحصر القوس } \widehat{AB} \\ \hat{AEB} \text{ زاوية محيطية تحصر القوس } \widehat{AB} \\ \hat{ADC} = \hat{ADB} + \hat{BDC} = 35^\circ + 30^\circ = 65^\circ \end{cases}$$

حل التمرين الثامن

$$\hat{ACB} + \hat{CAB} + \hat{ABC} = 180^\circ$$

$$\hat{ACB} = \frac{1}{2} \hat{AOB} \text{ (خاصة الزاويتين المركزية والمحيطية)}$$

$$\hat{ACB} = \frac{1}{2}(2x + 34)^\circ = (x + 17)^\circ$$

$$\hat{CAB} = (x + 2)^\circ \text{ (من المعطيات)}$$

$$\hat{ABC} = (3x + 6)^\circ \text{ (من المعطيات)}$$

$$\text{ومنه } (x + 17)^\circ + (x + 2)^\circ + (3x + 6)^\circ = 180^\circ$$

$$x = 31 \text{ أي } 5x + 25 = 180$$

$$\text{وبالتالي : } \hat{ACB} = 31 + 17 = 48^\circ \text{ و } \hat{AOB} = 2\hat{ACB} = 2 \times 48 = 96^\circ$$

حل التمرين التاسع

(1) صورة المثلث OAB بالتناظر المحوري بالنسبة إلى (DA) هو المثلث OAF .

(2) صورة المثلث OAB بالتناظر المركزي الذي المركز O هو المثلث ODE .

(3) صورة المثلث OAB بالانسحاب الذي شعاعه FE هو المثلث COD .

(4) صورة المثلث OAB بالدوران الذي المركز O والزاوية 60° في الاتجاه

السالب هو المثلث OAF

حل التمرين العاشر

$$\begin{cases} \hat{AOB} = 2\hat{ACB} \text{ إذن } \hat{AOB} \text{ زاوية مركزية تحصر القوس } \widehat{AB} \\ \hat{ACB} \text{ زاوية محيطية تحصر القوس } \widehat{AB} \text{ أي } \hat{AOB} = 2 \times 35^\circ = 70^\circ \end{cases}$$

حل تمارين السلسلة الرابعة عشر

حل التمرين الأول

نعلم أن $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ حيث $V = 288\pi$

إذن $\frac{4}{3}\pi R^3 = 288\pi$ ومنه $4\pi R^3 = 288 \times 3\pi$

أي $R^3 = \frac{288 \times 3\pi}{4\pi}$ ومنه $R^3 = 216$ أي $R = 6dm$ (نستعمل الآلة الحاسبة

و نضغط على الزر $(\sqrt[3]{216})$

حل التمرين الثاني

$1,09L = 1090cm^3$

حجم الجلة هو $\frac{4\pi R^3}{3} = \frac{4 \times 3,14 \times 1,5^3}{3} = 42,39cm^3$

عدد الثلجات التي نستخرجها من 1 لتر من الماء هو $1090 \div 42,39 = 25$


حل التمرين الثالث

(1) حجم المكعب هو $C^3 = 8^3 = 8 \times 8 \times 8 = 512cm^3$

(2) حجم الجلة هو $\frac{4\pi R^3}{3} = \frac{4 \times 3,14 \times 4^3}{3} = 268cm^3$

(3) حجم المكان داخل المكعب الغير مستغل من الجلة هو

$512 - 268 = 244cm^3$



حل التمرين الرابع

المسافة بين O والمستوي هي الطول OO' .

$OO' = \sqrt{R^2 - r^2}$

$OO' = \sqrt{75^2 - 60^2}$

$OO' = 45mm$ أي $OO' = \sqrt{2025}$

حل التمرين الخامس

(1) طبيعة المقطع EFGH هو مستطيل.

(2) لدينا في المثلث HKE القائم في K حسب نظرية فيثاغورث

$HE^2 = 20^2 + 15^2$ أي $HE^2 = HK^2 + KE^2$

ومنه $HE^2 = 625$ أي $HE = \sqrt{625} = 25cm$

نلاحظ أن $HE = EF = 25cm$ ومنه نستنتج أن EFGH مربع.

حل التمرين السادس

(1) حجم الإناء هو $V = \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{3,14 \times 5^2 \times 10}{3} = 262,6cm^3$

(2) (a) معامل التصغير هو $k = \frac{SO'}{SO} = \frac{5,3}{10} = 0,53$

(b) حجم الماء هو $V' = V \times k^3 = 262,6 \times (0,53)^3 = 39cm^3$

حل التمرين السابع

(1) حجم الأسطوانة هو $V = \pi R^2 \times h = \pi \times 8^2 \times 15 = 960\pi$

(2) القيمة المضبوطة لحجم الجلة هو :

$V_1 = \frac{4\pi R^3}{3} = \frac{4\pi \times 6^3}{3} = 288\pi$

(3) حجم الماء الإضافي أو المتدفق بعد وضع الجلة يساوي حجم الجلة.

حجم الماء المتدفق هو $V_2 = 960\pi - 288\pi = 672\pi$

ارتفاع الماء هو :

$h\pi R^2 = 672\pi$ أي $h = \frac{672}{8^2}$ ومنه $h = 10,5cm$

حل التمرين الثامن

(1) أي $\frac{OH}{18} = 0,61$ ومنه $\begin{cases} \cos M\hat{O}H = \frac{OH}{OM} = \frac{OH}{18} \\ \cos M\hat{O}H = \cos 52^\circ = 0,61 \end{cases}$

$OH = 11m$, $OH = 18 \times 0,61$

$$(2) \quad OH^2 + HM^2 = OM^2 \quad \text{أي} \quad HM^2 = OM^2 - OH^2$$

$$HM^2 = 18^2 - 11^2$$

$$\text{ومنه } HM^2 = 203 \quad \text{أي} \quad HM = \sqrt{203} \quad \text{ومنه } HM = 14m$$

(3) الارتفاع الكلي لهذه القاعدة هو : $29m$

$$OH + OM = 11 + 18 = 29m$$

(4) طبية مقطوع القاعدة على الأرض هو قرص نصف قطره HM أي $14m$

مساحة هذا المقطع هي : $615m^2$

$$S = \pi R^2 = 3,14 \times 14^2 = 615m^2$$

حل التمرين التاسع

(1) حجم المخروط الدوران هو :

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3} \quad \text{أي} \quad V = \frac{3,14 \times 2,7^2 \times 16}{3} \quad \text{ومنه } V = 122cm^3$$

$$(2) \quad SO' = SO - OO' \quad \text{أي} \quad SO' = 16 - 8 \quad \text{ومنه } SO' = 8cm$$

$$k = \frac{SO'}{SO} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} = 0,5$$

(b) حجم الجهة الخارجية هو :

$$V_1 = V \times k^3 \quad \text{أي} \quad V_1 = 122 \times (0,5)^3 \quad \text{ومنه } V_1 = 15,25cm^3$$

حجم الجهة الداخلية هو :

$$V_2 = V - V_1 \quad \text{أي} \quad V_2 = 122 - 15,25 \quad \text{ومنه } V_2 = 106,75cm^3$$

حل التمرين العاشر

(1) حجم الموشور القائم هو :

$$V = S_n \times h \quad \text{أي} \quad V = 4160 \times 3 \quad \text{ومنه } V = 12480m^3$$

(2) يصبح حجمه بعد تصغيره إلى ربع :

$$V' = V \times \left(\frac{1}{4}\right)^3 \quad \text{أي} \quad V' = 12480 \times \frac{1}{64} \quad \text{ومنه } V' = 195m^3$$

(3) طبية هذا المقطع هو نفس طبية القاعدة أي منتظم ومساحته هي $4160m^2$

حل التمرين الحادي عشر

$$\text{إذا كانت } S = 12 \text{ بالمعامل } \frac{1}{2} \text{ فإن } S' = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 12$$

$$S' = \frac{1}{4} \times 12 \quad \text{أي} \quad S' = \frac{12}{4} \quad \text{ومنه } S' = 3m^2$$

وبالتالي مساحة المربع $EFGH$ هي $3m^2$

حل التمرين الثاني عشر

$$(1) \quad V = \pi \times R^2 \times H$$

$$V = 3,14 \times 5,1^2 \times 3,3$$

$$V = 269515,62cm^3$$

$$(2) \quad V' = \left(\frac{1}{3}\right)^3 \times V$$

$$V' = \frac{1}{27} \times 269515,62$$

$$V' = 9982,06cm^3$$

حل التمرين الثالث عشر

نصف قطر الجلة الأولى هو $10 + 2 = 5cm$

300g	5cm
x	30cm

$$x = \frac{300 \times 30}{5}$$

$$x = \frac{9000}{5} \quad \text{ومنه } x = 1800g$$

حل التمرين الرابع عشر


$$(1) \quad V = \pi R^2 \times h \quad \text{أي} \quad V = 3,14 \times 3,1^2 \times 4 \quad \text{ومنه } V = 128,8cm^3$$

$$(2) \quad V' = \frac{V \times 90}{100} \quad \text{أي} \quad V' = \frac{128,8 \times 90}{100} \quad \text{ومنه } V' = 116cm^3$$

$$(3) \quad \frac{1}{2}L = \frac{1000}{2}cm^3 = 500cm^3$$

$$500cm^3 + 116cm^3 = 616cm^3 \quad \text{ومنه يمكننا أن نقدم 4 كؤوس قهوة}$$

حل التمرين الثالث



(1)

(2) المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين (من تعريف الدوران).

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 \quad (3)$$

$$BC^2 = 72$$

$$BC = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \text{ cm}$$

حل التمرين الرابع

$$\begin{cases} x=8 & \text{معناه} \\ y=6 & \text{و} \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=14 \\ x+4y=32 \end{cases} \quad (1)$$

(2) بما إن $500 = 125 \times 4$ فإن $\text{PGCD}(500; 125) = 125$

هي مكافئة للجمل:

(3) تريبض وكتابة الجملة التي

$$\begin{cases} x+y=14 \\ x+4y=32 \end{cases} \quad \begin{cases} x+y=14 \\ 125x+500y=4000 \end{cases}$$

استنتاج الحل هو $\begin{cases} x=8 \\ y=6 \end{cases}$ ومنه عدد العلب من الصنف 125g هو 8
عدد العلب من الصنف 500g هو 6

حل موضوع شهادة التعليم المتوسط 2009

حل التمرين الأول

$$A \times B = 4\sqrt{5} \times 6\sqrt{5} \quad (2) \quad A + B = \sqrt{16 \times 5} + 2\sqrt{9 \times 5} \quad (1)$$

$$A \times B = 24 \times 5$$

$$A \times B = 120$$

$$A + B = 4\sqrt{5} + 6\sqrt{5}$$

$$A + B = 10\sqrt{5}$$

$$\frac{C^2}{\sqrt{5}} = \frac{(\sqrt{5}+1)^2}{\sqrt{5}} \quad (3)$$

$$\frac{C^2}{\sqrt{5}} = \frac{6+2\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{(6+2\sqrt{5})\sqrt{5}}{\sqrt{5}\sqrt{5}}$$

$$\frac{C^2}{\sqrt{5}} = \frac{10+6\sqrt{5}}{5}$$

حل التمرين الثاني

$$E = 2x - 10 - (x^2 - 10x + 25) \quad (1)$$

$$E = 2x - 10 - x^2 + 10x - 25$$

$$E = -x^2 + 12x - 35$$

$$E = 2(x-5) - (x-5)(x-5) \quad (2)$$

$$E = (x-5)(2-x+5)$$

$$E = (x-5)(7-x)$$

$$(x-5)(7-x) = 0 \quad (3)$$

$$7-x=0 \text{ أو } x-5=0$$

$$x=7 \text{ أو } x=5$$

حل المسألة

(1) سعة الخزان : $V_1 = 3,14 \times 5^2 \times 4$ أي $V_1 = 314 m^3$

سعة المسبح : $V_2 = 20 \times 6 \times 2$ أي $V_2 = 240 m^3$

(2) بعد مرور 3 ساعات كمية الماء المتدفقة في المسبح هي :


$$Q_1 = 36 m^3 \text{ أي } Q_1 = 12 \times 3$$

كمية الماء المتبقية في الخزان هي :

$$Q_2 = 278 m^3 \text{ أي } Q_2 = 314 - 36$$

(3) $f(x) = 314 - 12x$ و $g(x) = 12x$

(4) إنشاء التمثيل البياني لكل من f و g :



ب) $240 = 12x$ أي $x = 20$ ومنه الوقت المستغرق لملء المسبح هو 20 ساعة .

ج) $f(x) = g(x)$ معناه $12x = 314 - 12x$ أي $x = \frac{314}{24}$

ومنه $x = 13 \frac{1}{5} \text{ min}$ تمثل المدة الزمنية التي تكون فيها كمية الماء

المتدفقة في المسبح تساوي كمية الماء المتبقية في الخزان.