

- ٠ تُشَمَّن كل الحلول الصحيحة غير الواردة في هذا التصحيح النموذجي.
- ٠ في حالة ما إذا اختصر التلميذ حله دون إهمال الخطوات الأساسية، تُعطى له علامة السؤال كاملة.

التمرين الأول : (٢ ن)

١ ن $A = [2 + (-2)^4 \div 8] \times (-1)^{-11} = (2 + 16 \div 8) \times (-1) = (2 + 2) \times (-1) = 4 \times (-1) = \boxed{-4}$. (١) حساب A .

١ ن $B = \frac{3 \times 10^4 \times 10^{-2} \times 5}{(10^3)^{-2}} = 3 \times 5 \times \frac{10^{4+(-2)}}{10^{3 \times (-2)}} = 15 \times \frac{10^2}{10^{-6}} = 1,5 \times 10^1 \times 10^{2-(-6)} = 1,5 \times 10^1 \times 10^{2+6} = 1,5 \times 10^1 \times 10^8 = 1,5 \times 10^{1+8} = \boxed{1,5 \times 10^9}$. (٢) الكتابة العلمية للعدد B .

التمرين الثاني : (٣ ن)

١,٥ ن $E = (2x - 5)(x - 1) - (x^2 - 7x + 6)$
 $= 2x^2 - 2x - 5x + 5 - x^2 + 7x - 6$
 $= 2x^2 - 7x + 5 - x^2 + 7x - 6$
 $= \boxed{x^2 - 1}$

×	x	-1
2x	$2x^2$	-2x
-5	$-5x$	+5


(١) نشر و تبسيط العبارة E .

(٢) التحقق من صحة النشر من أجل $x = 1$

بعد النشر	قبل النشر
$E(1) = 1^2 - 1$ $= 1 - 1$ $= \boxed{0}$	$E(1) = (2 \times 1 - 5)(1 - 1) - (1^2 - 7 \times 1 + 6)$ $= (2 - 5) \times 0 - (1 - 7 + 6)$ $= 0 - 0$ $= \boxed{0}$

إذن النشر صحيح من أجل $x = 1$.

التمرين الثالث : (٣,٥ ن)
رسم الشكل.



و بما أن D منتصف $[AB]$ فإن $DB = AD$. لدينا إذن : $AD = EC$ و $DB = EC$ وبالتالي فالرباعي $ADCE$ متوازي الأضلاع . و بما أن إحدى زواياه قائمة ($\widehat{ADC} = 90^\circ$) فإنه مستطيل . مساحته تساوي :

$$\mathcal{A}_{ADCE} = AD \times CD = 3\text{ cm} \times 4\text{ cm} = \boxed{12\text{ cm}^2}$$

التمرين الرابع : (٣,٥ ن)

١ ن (١) المثلث MRS قائم في M لأن ضلعه $[RS]$ قطر للدائرة المحيطة به .

(٢) المثلث MRS قائم في M إذن $\cos M = \frac{MS}{SR} = \frac{MS}{4}$ أي $\cos M = \frac{MS}{4}$ منه $MS = 4 \times \cos(53^\circ) \approx 4 \times 0,602 = 2,408$. إذن $MS = 2,4\text{ cm}$. (٠,٢٥ ن)

(٣) لدينا : $TR^2 = 25$ و $TS^2 + SR^2 = TR^2$ أي $TS^2 + SR^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ و حسب النظرية العكسية لنظرية فيثاغورس ، المثلث RST قائم في S . المستقيم (TS) يعادل المستقيم القطري (SR) في الدائرة (\mathcal{F}) إذن (TS) هو المماس للدائرة (\mathcal{F}) في النقطة S . (٠,٥ ن)

ن1	$1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{9}{20} \right) = 1 - \left(\frac{5}{20} + \frac{9}{20} \right) = 1 - \frac{14}{20} = \frac{20}{20} - \frac{14}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$	(1) ★ الكسر الذي يمثل عدد أشجار الإجاص هو :
	$.n = \frac{30 \times 10}{3} = 100$	إذا كان n عدد أشجار العم أحمد فإن $\frac{30}{n} = \frac{3}{10}$ منه
ن0,5		إذن للعم أحمد 100 شجرة.
ن0,75	$\mathcal{V}_1 = \frac{\mathcal{B}_1 \times h_1}{3} = \frac{2^2 \times 1,5}{3} = \frac{4 \times 1,5}{3} = [2 \text{ m}^3]$	(2) (ا) حجم الجزء السفلي للخزان (حجم الهرم) هو :
ن0,25		(ب) ★ بما ان $(MN) \parallel (EH)$ و $(AE) \perp (MN)$ فـ $(AE) \perp (EH)$.
ن1	\star في المثلث AEH ، لدينا : $\frac{AM}{AE} = \frac{AN}{AH} = \frac{MN}{EH}$ و $M \in (AE)$ بـ $MN \parallel EH$ ، فحسب خاصية طالس :	$.AM = \frac{5 \times 1,5}{2} = [3,75 \text{ m}]$ منه $\frac{AM}{5} = \frac{AN}{AH} = \frac{1,5}{2}$
ن0,25		$.ME = AE - AM = 5 - 3,75 = [1,25 \text{ m}]$ منه
ن0,75	$\mathcal{V}_2 = \mathcal{B}_2 \times h_2 = 2^2 \times 1,25 = 4 \times 1,25 = [5 \text{ m}^3]$	\star حجم الماء في الجزء العلوي للخزان (الموشور القائم) هو :
ن0,25	$\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 = 2 + 5 = [7 \text{ m}^3]$	(ج) ★ كمية الماء المتوفـرة في الخزان هي :
ن0,25	$100 \times 200 \text{ L} = 20000 \text{ L} = 20 \text{ m}^3$	\star كمية الماء اللازمة لـ سقي كل الأشجار هي :
ن0,25		\star كمية الماء المتوفـرة في الخزان لا تكفي لـ سقي كل الأشجار لأن $20 < 20$.
ن0,75	$\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2 = 2 + 2^2 \times x = 2 + 4x$	(3) (ا) حجم الماء في الخزان هو
ن1	$.x = 18 \div 4 = 4,5$ أي $\mathcal{V} = 20 \text{ m}^3$ منه $2 + 4x = 20$ منه $4x = 20 - 2 = 18$ منه $4x = 18 \div 4 = 4,5$	(ب) أصغر قيمة لـ x تتحقق $\mathcal{V} = 20 \text{ m}^3$ إـذن أصغر قيمة لـ x حتى تكون كمية الماء في الخزان كافية لـ سقي كل الأشجار هي .

الانسجام : معقولية النتائج، الوحدات، ...
تقديم الورقة : عدم الشطـب، مـقروئـية الخطـ، بـروز النـتائـج النـهـائيـة.