


النهايات

ابراهيم

الكافاءات المستهدفة



الكافاءات المستهدفة من خلال هذا المحور هي :

حساب نهاية منتهية أو غير منتهية عند حدود

حساب نهاية بإستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على
النهايات أو المقارنة و تركيب دالتين

دراسة السلوك التقاربي لدالة

ثانوية عبد الحميد بن باديس - ييل - غليزان

« الوحدة التحلمية: النهايات »

« ميدان التعلم: التحليل »

« موضوع الوحدة: نهاية منتهية أو غير منتهية لدالة »

« الأستاذ: بخدة أمين »

« المستوى: السنة 3 مع -3 تر -3 ريا »

« المدة: 1 ساعه »

« المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية، »

« الكفاءات المستهدفة: نهاية منتهية أو غير منتهية لدالة ، و تفسير الهندسي لها »

« المراجع: الكتاب المدرسي ، الأنترنت »


المرأة	عناصر الدرس	الراجل
<p>١٠ د</p>	<p>نهاية منتهية عند مالانهاية</p> <p>تعريف: f دالة معرفة على $[x_0, +\infty]$ و l عدد حقيقي القول ان نهاية f عند $+\infty$ هي l يعني أن كل مجال مفتوح شامل للسعد I يشمل كل قيم $f(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي ونكتب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$</p> <p>ملاحظة: نحصل على نفس تعريف و نتيجة مماثلتين عند $-\infty$</p> <p>مثال:</p> $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ <p>المستقيم المقارب الأفقي</p> <p>نتيجة:</p> <p>نقول أن المستقيم ذا المعادلة $y = l$ مستقيم مقارب أفقي للمنحنى (C_f) الممثل للدالة f عند $-\infty$ أو عند $+\infty$</p>	<p>مرحلة الإنطلاق</p> <p>١٠ د</p>



١٠



١٠

**تطبيق**

لتكن الدالة f المعرفة على المجال $[2; +\infty)$ بـ:


$$f(x) = \frac{5}{x-2}$$

أثبت بإستعمال التعريف أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$:

نهاية غير منتهية عند $+\infty$ أو $-\infty$



١٠

**تعريف**

دالة معرفة على $[x_0, +\infty)$ القول ان نهاية f عند $+\infty$ هي $+\infty$ يعني أن كل عدد $A, A > +\infty$ يشمل كل قيم $f(x)$ من أجل x كبير بالقدر الكافي ونكتب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$



٢٠

التقويم

نحصل على تعريفين مماثلين عند $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$
تطبيق

دالة معرفة على $[3; +\infty)$ بـ:

$$f(x) = \sqrt{2x-6}$$

أثبت بإستعمال التعريف أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$:

تطبيق

نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ:

$$h(x) = -3 + \frac{4x-1}{2x+2}$$

ولتكن (C_g) المنحني الممثل لها في مستوى منسوب إلى معلم متواحد ومتجانس.

بين أن المستقيم ذو المعادلة $y = -1$ هو مستقيم مقارب للمنحني (C_f) عند $+\infty$ وعند $-\infty$.

ملاحظات حول سير الحصة

ثانوية عبد الحميد بن باديس - غليزان

- « الوحدة التحلمية: النهايات »
- « ميدان التعلم: التحليل »
- « موضوع الجمعة: نهاية دالة عند عدد »

- « الأستاذ: بخدة أمين »
- « المستوى: السنة 3م - 3ر - 3ع »
- « المدة: 1 ساعة »


« **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول الدوال العددية،

« **الكفاءات المستهدفة:** حساب نهاية عند عدد

« **المراجع:** الكتاب المدرسي ، الأنترنت

المرأة	عناصر الدرس	الراجل
د10	<h3>نشاط مقترن 1</h3> <p>لتكن الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = 2x + 3$. نريد دراسة سلوك $f(x)$ لما x يؤول إلى 2.</p> <p>1. ضع تخمينا لسلوك $f(x)$ لما x يؤول إلى 2.</p> <p>2. في أي مجال يجب اختيار x بحيث $f(x)$ تنتهي إلى $[6,99; 7,01]$؟</p> <p>3. عدد حقيقي حيث $0 < \alpha < 1$.</p> <ul style="list-style-type: none"> في أي مجال يجب اختيار x بحيث ينتمي $f(x)$ إلى $[7 - \alpha; 7 + \alpha]$. علماً أننا نختار α صغير بالقدر الذي نريد، ماذا تستنتج؟ <p>نهاية منتهية عند عدد حقيقي</p>	مرحلة الإنطلاق
د5	<p>تعريف</p> <p>عدد حقيقي x_0 دالة f معرفة في جوار x_0 نقول أن نهاية الدالة f هي ℓ لما x يؤول إلى ℓ إذا كان من أجل كل عدد حقيقي موجب A، يوجد عدد حقيقي B، بحيث إذا كان: $f(x) - \ell < A$ فإن: $x - x_0 < B$.</p> <p>أي يمكن جعل $f(x)$ أقرب من أي عدد حقيقي إلى ℓ إذا كان x قريبا بالقدر الكافي من x_0 و نكتب</p> $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$	د5
د5	<h3>مثال</h3> <p>لتكن الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = x^2 - 3$. بـ: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ أثبت أن</p>	

تعريف



x_0 عدد حقيقي و f دالة معرفة في جوار x_0 (وليس بالضرورة عند x_0)

نقول أن نهاية الدالة f هي $+\infty$ لما x يؤول إلى x_0 إذا

كان من أجل كل عدد حقيقي A ، المجال $[A, +\infty)$

يضم كل قيم $f(x)$ من أجل x قريب بالقدر الكافي من

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

ونكتب عندئذ: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$


مثال

لتكن f الدالة المعرفة على $[0; +\infty) \cup [0; -\infty)$ بـ $f(x) = \frac{1}{x^2}$

عندما يقترب x من 0 يالقدر الكافي ، تأخذ $f(x)$ قيمًا كبيرة بالقدر الذي نريد ، عندئذ يكون

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

لدينا: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$



x_0 عدد حقيقي و f دالة معرفة في جوار x_0 (وليس بالضرورة عند x_0)

نقول أن نهاية الدالة f هي $-\infty$ لما x يؤول إلى x_0 إذا

كان من أجل كل عدد حقيقي A ، المجال $(-\infty, A]$

يضم كل قيم $f(x)$ من أجل x قريب بالقدر الكافي من

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

تعريف

المستقيم المقارب العمودي


نتيجة

ليكن (C_f) التمثيل البياني لدالة f في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ولتكن (Δ) المستقيم

الذي معادلته $x = a$

القول أن المستقيم (Δ) مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f) يعني أن الدالة f عند a (من العين أو من اليسار) هي $+\infty$ أو $-\infty$

المستقيم (Δ) مقارب عمودي للمنحنى (C_f) يعني أن الدالة f عند a (من العين أو من اليسار) هي $+\infty$ أو $-\infty$



مثال

المستقيم (Δ) مقارب عمودي للمنحنى (C_f) يعني أن الدالة f عند a (من العين أو من اليسار) هي $+\infty$ أو $-\infty$

لدينا:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$$

إذن للمنحنى (C_f) مستقيمين مقاربين ذا المعادلة $x = 1$ و $x = -1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 1}{x^2} = +\infty \quad \text{1}$$

2 أحسب في كل حالة النهايات التالية و فسر النتيجة هندسيا

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{\sqrt{3-x}}{3-x} \quad \text{4} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-9}{x^2-4} \quad \text{3} \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{2x-9}{(x-4)^2} \quad \text{2} \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{2x-9}{x-4} \quad \text{1}$$

تمرين منزلي

حل تمارين 13 و 14 و 16 صفحة 27



١٠



ملا جملات حول سير الحصة

.....
.....
.....

ثانوية عبد الحميد بن باديس - يلال - غليزان

الوحدة التعليمية: النبات
ميدان التعلم: التحليل
موضوع الدراسة: العمليات على النبات

﴿الأستانة﴾: بخدمة أمين
﴿المستوى﴾: السنة ثلاثة رياضيات
﴿المملكة﴾: ١ ساعة

- ↳ **المكتسبات القبلية** : مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة
- ↳ **الكافاءات المستهدفة** : عمليات على النهايات وطرق إزالة حالة عدم التعين .
- ↳ **المراجع** : الكتاب المدرسي ، الأنترنت

المرأة	عناصر المدرس	المراحل																																																																																										
٥د	<p>ملاحظات</p> <p> يتم حساب نهاية دالة عند الحدود المفتوحة لمجموعة التعريف.</p> <p> إذا كانت دالة قابلة للإشتقاق عند عدد حقيقي a من مجموعة تعريفها فإن $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.</p> <p> إذا قبلت دالة f عند عدد حقيقي a فإن هذه النهاية وحيدة.</p> <p> يمكن لدالة لا تقبل نهاية عند حد من حدود من مجموعة تعريفها، فمثل الدالة $\sin x \mapsto x$ لا تقبل نهاية عند $+\infty$</p>	مرحلة الإنطلاق																																																																																										
٥د	<h3>مبرهنات أولية على النهايات</h3> <p>f و g دالتان و a يمثل إما عدد حقيقي أو $+\infty$ أو $-\infty$ و L ، L' أعداد حقيقة.</p> <p><u>نهاية مجموعة التغير</u></p> <table border="1"> <tr> <td>$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$</td> <td>$L$</td> <td>$L$</td> <td>$L$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> </tr> <tr> <td>$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$</td> <td>$L'$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$-\infty$</td> </tr> <tr> <td>$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$</td> <td>$L + L'$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>حـ عـ تـ</td> <td>$-\infty$</td> </tr> </table> <p><u>نهاية جداء التغير</u></p> <table border="1"> <tr> <td>$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$</td> <td>$L$</td> <td>$L > 0$</td> <td>$L < 0$</td> <td>$L < 0$</td> <td>$L < 0$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$0$</td> <td>$0$</td> </tr> <tr> <td>$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$</td> <td>$L'$</td> <td>$\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> </tr> <tr> <td>$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \times g(x)]$</td> <td>$L \times L'$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>حـ عـ تـ</td> <td>حـ عـ تـ</td> </tr> </table> <p><u>نهاية حاصل قسمة التغير</u></p> <table border="1"> <tr> <td>$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$</td> <td>$L$</td> <td>$L$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$0$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$-\infty$</td> </tr> <tr> <td>$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$</td> <td>$L' \neq 0$</td> <td>$\pm\infty$</td> <td>$L' > 0$</td> <td>$L' > 0$</td> <td>$L' < 0$</td> <td>$L' < 0$</td> <td>$0$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> </tr> <tr> <td>$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$</td> <td>$\frac{L}{L'}$</td> <td>$0$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> <td>حـ عـ تـ</td> </tr> </table> <p>ملخص</p> <p> تسمى الحالات التي لا تسمح فيها النظريات السابقة من استنتاج النهاية بحالات : " عدم التعين (حـ عـ تـ)"</p> <p> توجد أربع حالات عدم التعين وهي من الشكل : $\frac{\infty}{\infty}; \frac{0}{0}; 0 \times \infty; +\infty - \infty$</p>	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	حـ عـ تـ	$-\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	$L > 0$	$L < 0$	$L < 0$	$L < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0	0	$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	L'	∞	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \times g(x)]$	$L \times L'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	حـ عـ تـ	حـ عـ تـ	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$L' \neq 0$	$\pm\infty$	$L' > 0$	$L' > 0$	$L' < 0$	$L' < 0$	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{L}{L'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	حـ عـ تـ	من				
$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$																																																																																						
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$																																																																																						
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	حـ عـ تـ	$-\infty$																																																																																						
$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	$L > 0$	$L < 0$	$L < 0$	$L < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0	0																																																																																		
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	L'	∞	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$																																																																																		
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \times g(x)]$	$L \times L'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	حـ عـ تـ	حـ عـ تـ																																																																																		
$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	L	L	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$																																																																																	
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$L' \neq 0$	$\pm\infty$	$L' > 0$	$L' > 0$	$L' < 0$	$L' < 0$	0	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$																																																																																	
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{L}{L'}$	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	حـ عـ تـ	حـ عـ تـ	حـ عـ تـ	حـ عـ تـ	حـ عـ تـ																																																																																	
٥د																																																																																												

نهايات بعض الدوال الشهيرة

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0^+ \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0^+ \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0^-$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{\sqrt{a-x}} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{\sqrt{x-a}} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0^+ \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

لـ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$ (لـ $n \in \mathbb{N}^*$ زوجي) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ (لـ $n \in \mathbb{N}^*$ فردي)

إزالة حالات عدم التعيين

لـ إزالة حالات عدم التعيين عند وجودها تبع مالي:

بالنسبة لدوال كثيرات الحدود عندما x يؤول إلى $+\infty$ أو $-\infty$ - نأخذ نهاية الحد الأعلى (الأكبر) درجة .

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -3x^3 + 4x + 6 \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} = 3x^2 - 2x + 3 \quad (1)$$

بالنسبة لدوال ناقفة عندما x يؤول إلى $+\infty$ أو $-\infty$ - نأخذ نهاية الحد الأعلى درجة في البسط و المقام .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2 + 2x}{x^3 - 6} \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+x - x^2}{x^3 - 1} \quad (1)$$

بالنسبة لدوال الجذرية عندما x يؤول إلى $+\infty$ أو $-\infty$ - أو x_0 في معظم الحالات نضرب و نقسم في المرافق .

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^2 - 3}}{x + 2} \quad (3) \quad \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{\sqrt{2x - 1} - 3} \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 3} + x - 2 \quad (6) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 3} + 2x - 2 \quad (5) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x - 3} - 3x + 2 \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1} \quad (8) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 3} - \sqrt{9x^2 - 2} \quad (8) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 - 3} - \sqrt{4x^2 - 2} \quad (7)$$

بالنسبة لحالات عدم التعيين عندما x يؤول إلى x_0 نستعمل الجداءات الشهيرة أو التحليل أو العامل المشترك أو العدد المشتق

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4} - 3}{x - 1} \quad (4) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad (3) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - x}{\sqrt{x}} \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - 3x + 2} \quad (1)$$

تطبيقات

تمرين 18 و 19 و 24 صفحة 26

التقويم

ملاحظات حول سير المراجعة

«الوحدة التحلمية»: النهايات

«ميثان التعلم»: التحليل

«موضوع الجدة»: السلوك التقاريبي لمنحنى دالة

«الأستاذ»: بخدة أمين

«المستوى»: السنة 3 ع - 3 تر - 3 ريا

«المدة»: ١ ساعة

- «المكتسبات القبلية»: دراسة الدوال العددية
 «الكفاءات المستهدفة»: تبرير أن مستقيما معلوما هو مستقيم مقارب ، البحث عن مستقيم مقارب مائل .
 «المراجع»: الكتاب المدرسي ، الأنترنت

المرأة	عناصر الدرس	الراجل
	التبيئة النفسية	
١٥ د	<h2 style="text-align: center;">١ نشاط مقترن</h2> <p>لتكن الدالة f المعرفة على المجال $[0, +\infty]$ كايلي : C_f وليكن $f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} + \frac{1}{x}$ المنحنى البياني المثل لها في مستوى منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس (\vec{i}, \vec{j}) ، وليكن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ وليكن M نقطة من (C_f) فاصلتها x و P نقطة من المستقيم (Δ) فاصلتها x</p> <p>١ أحسب المسافة MP</p> <p>٢ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} MP$</p> <p>٣ ارسم المنحنى (C_f) و (Δ) في نفس المعلم، ماذا تلاحظ.</p>	مرحلة الإنطلاق
٥ د	<p>خاتمة</p> <p>ليكن (C_f) التمثل البياني للدالة f في معلم متعمد ومتجانس (\vec{i}, \vec{j}) ، وليكن (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = ax + b$ حيث $a \neq 0$. القول ان المستقيم (Δ) هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$ يعني $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$</p> <p>ملاحظة</p> <p>إذا كانت f دالة بحيث $f(x) = (ax + b) + g(x)$ وكانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ فإن المستقيم ذو المعادلة $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) لما يؤول x إلى $+\infty$ نفس الملاحظة عند $(-\infty)$.</p> <p>الوضع النسبي لمنحنى و المستقيم المقارب المائل</p> <p>دالة عددية و (C_f) التمثل البياني لها في مستوى منسوب إلى معلم متعمد و متجانس (\vec{i}, \vec{j}) ، وليكن في نفس المستوى المستقيم المقارب المائل للمنحنى (C_f) ذو المعادلة $y = ax + b$ المعرفة وظيفة f بالنسبة للمستقيم المقارب المائل نقوم بحساب الفرق $f(x) - (ax + b)$ ثم ندرس إشارته أي</p> <p>إذا كان $f(x) - (ax + b) > 0$ فإن $f(x) - (ax + b)$ يقع فوق المستقيم المقارب المائل</p> <p>إذا كان $f(x) - (ax + b) < 0$ فإن $f(x) - (ax + b)$ يقع تحت المستقيم المقارب المائل</p> <p>إذا كان $f(x) - (ax + b) = 0$ فإن $f(x) - (ax + b)$ والمستقيم المقارب المائل يتقاطعان</p>	٣

تطبيقات

نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ: $x \mapsto f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ مثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس $(O; \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$.

1 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من \mathbb{R} لدينا: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$ ، ثم يستنتج نهاية الدالة f عند $+\infty$.

2 بين أن: $[f(x) + 2x]$ تؤول إلى 0 عندما x يؤول إلى $-\infty$.

3 بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من \mathbb{R} : $f(x) > 0$ ، ثم يستنتج إشارة $[f(x) + 2x]$ ، فسر النتائج بيانيا.

4 نقبل أن الدالة f متناقصة تماما على \mathbb{R} ، أرسم (C_f) و مستقيمته المقارب المائل.

التقويم

30

ملاحظات حول سير الحصة

.....
.....
.....

ثانوية عبد الحميد بن باديس - بيل - غليزان

- « الوحدة التحلمية: النهايات »
- « ميدان التعلم: التحليل »
- « موضوع الوحدة: العمليات على النهايات »

- « الأستاذ: بخدة أمين »
- « المستوى: السنة 3م - 3تر - 3ريا »
- « المدة: 2 ساعة »

« **المكتسبات القبلية:** عمليات على النهايات وطرق إزالة حالة عدم التعين.

« **الكافاءات المستهدفة:** حساب النهايات بإستعمال المقارنة أو الحصر و مركب دالتين.

« **المراجع:** الكتاب المدرسي ، الأنترنت

الرقة	عناصر الدرس	الراجل
10 د	<p>التبية النفسية</p> <p>تذكير بطرائق إزالة حالة عدم التعين</p> <p><u>نهاية مركبة بالتين</u></p> <p>مبرهنة ①</p> <p>نعتبر u, v, f ثالث دوال حيث $f = v \circ u$ ، ولتكن a ، b و c أعداد حقيقة إما منتهية أو $+\infty$ أو $-\infty$.</p> <p>إذا كانت $b = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$ و $\lim_{x \rightarrow b} u(x) = c$ فإن: $\lim_{x \rightarrow a} v(x) = c$</p>	مرحلة الإنطلاق
10 د	<p>مثال</p> <p>أحسب النهايات التالية :</p> <p>$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(\pi - 2x)$ ③ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 3x + 2)^2$ ② $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{4x - 1}{x}}$ ①</p> <p><u>النهايات بالمقارنة</u></p> <p>مبرهنة ②</p> <p>f و g دالتان معرفتان على D من \mathbb{R}</p> <p>إذا كانت $f(x) = +\infty$ و $g(x) \geq f(x)$ من أجل x كبير جدا بالقدر الكافي فإن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$</p>	ـ
10 د	<p>مثال</p> <p>أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x أن : $1 \leq x + \cos(x) \leq x$ ، ثم يستنتج</p> <p>مبرهنة ③</p> <p>f و g دالتان معرفتان على D من \mathbb{R}</p> <p>إذا كانت $f(x) = -\infty$ و $g(x) \leq f(x)$ من أجل x كبير جدا بالقدر الكافي فإن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$</p>	ـ

مثال

أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من \mathbb{R} : $-x - \cos(x) \leq 1 - x$ ، ثم إستنتج $-\sin(x) \leq \cos(x)$

أظف إلى

مبرهنة ④



١٠

مطويتك

f ، g و h دوال معرفة على D من \mathbb{R} و ليكن a و ℓ عدوان حقيقيان إما متهيان أو $+\infty$ أو $-\infty$

إذا كان : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ و $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$ و $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$ حيث $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$



٢٠

مثال

$$f(x) = \frac{x + \sin(x)}{2x + 1} \text{ دالة معرفة على } \left[-\frac{1}{2}, +\infty \right]$$

بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x > -\frac{1}{2}$ فإن:

إثتاج: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

تطبيق

النorum



٤٠

١ أحسب الهايات :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) &\quad ③ & \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + x \cos\left(\frac{1}{x}\right)\right) &\quad ② & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{x} &\quad ① \\ \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) &\quad ⑤ & \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 3 \sin(x) &\quad ④ \end{aligned}$$

تطبيق

في هذا الرسم ، B نقطة من الدائرة المثلثية المرفقة بعلم متعمد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، D و A ، C المسقطان العموديان للنقطة B على محوري العلم.


$I(1; 0)$ نقطة تقاطع المستقيم (OB) مع المماس (Δ) للدائرة في النقطة I .

نعلم أن مساحة القرص هي : πr^2 ، إذن ماهي مساحة جزء من القرص زاويته x (الجزء المضليل)

$$r = \frac{x}{2\pi} \rightarrow \pi r^2 = \frac{1}{2} x^2 \pi \quad \text{ومنه } S_x = \frac{x\pi r^2}{2\pi} = \frac{1}{2} x^2 \pi \quad \text{نعلم أن } 1 \rightarrow S_x$$

$$S_x = \frac{x}{2}$$

واضح من الشكل أن $S_{OAB} \leq S_x \leq S_{OCI}$ من أجل $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$



١ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; \frac{\pi}{2}]$: $\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{\cos(x)}$

٢ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $[-\frac{\pi}{2}; 0]$: $\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{\cos(x)}$

٣ إثتاج: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$

٤ أثبت أن $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$

٥ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x من \mathbb{R} : الدالة المشتقه للدالة $\cos(x) \rightarrow x$ هي الدالة $\sin(x)$

و الدالة المشتقه للدالة $\sin(x) \rightarrow x$ هي الدالة $\cos(x)$

$$S_{OIC} = \frac{IC \times OI}{2} = \frac{\tan(x)}{2}, S_x = \frac{x}{2}, S_{OAB} = \frac{OA \times AB}{2} = \frac{\sin(x) \cos(x)}{2} : \text{لدينا } 1$$

إذن $\sin(x) \cos(x) \leq x \leq \tan(x)$ تكفي $\frac{\sin(x) \cos(x)}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\tan(x)}{2}$ تكفي $S_{OAB} \leq S_x \leq S_{OCI}$

$$\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{\cos(x)}$$

تكفي $\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{\cos(x)}$

$$\cos(-x) \leq \frac{\sin(-x)}{-x} \leq \frac{1}{\cos(-x)} \text{ ومنه } -x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[\text{ فإن } x \in \left]-\frac{\pi}{2}; 0\right[$$

$$\cos(x) \leq \frac{-\sin(x)}{-x} \leq \frac{1}{\cos(x)}$$

$$\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{\cos(x)} \text{ أي}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \text{ يستنتاج أن } 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)}$$

لدينا: $\cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{\cos(x)}$

$$1 \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \leq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \text{ ومنه}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0 \text{ إثبات أن } 4$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} \times \frac{\cos(x) + 1}{\cos(x) + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2(x) - 1}{x} \times \frac{1}{\cos(x) + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sin^2(x)}{x} \times \frac{1}{\cos(x) + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{\sin(x)}{x} \times \frac{\sin(x)}{\cos(x) + 1} \\ &= -1 \times 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$x \rightarrow -\sin(x) \text{ هي الدالة } 5$$

من أجل كل عدد حقيقي x من \mathbb{R} لدينا:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x) \cos(h) - \sin(x) \sin(h) - \cos(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x)(\cos(h) - 1) - \sin(x) \sin(h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\cos(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} - \sin(x) \frac{\sin(h)}{h} \right] \\ &= -\sin(x) \end{aligned}$$

إثبات أن مشتق الدالة $x \rightarrow \cos(x)$ هي الدالة $x \rightarrow \sin(x)$

من أجل كل عدد حقيقي x من \mathbb{R} لدينا:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x)\cos(h) + \cos(x)\sin(h) - \sin(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x)(\cos(h) - 1) + \cos(x)\sin(h)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \frac{\sin(h)}{h} \right] \\&= \cos(x)\end{aligned}$$

النهايات المثلثية

$$\begin{array}{lll}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\alpha x)}{\tan(\beta x)} = \frac{\alpha}{\beta} & \text{❶} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\alpha x)}{\sin(\beta x)} = \frac{\alpha}{\beta} & \text{❷} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1 & \text{❸} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 & \text{❹} \\ & & & & & & & & \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2} & \text{❻} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0 & \text{❼} & & & & & \end{array}$$

تطبيقات

أحسب النهايات التالية :

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2(x)}{1 - \sin(x)} \quad \text{❶} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin(x)}{\tan(x)} \quad \text{❷} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x \cos(x)} \quad \text{❸} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} \quad \text{❹}$$



٢٠

ملا جملات حول سير الحصة

.....

.....

.....

