



المدة: 2 ساعة

الاختبار الثاني في مادة الرياضيات

## التمرين الأول (50ن):

اختر الإجابة الصحيحة مع تبرير اختيارك

1. دالتان معرفتان على  $\mathbb{R}$  بـ  $h(x) = x^2 + 3$  و  $g(x) = 2x - 1$  إذا  $(g \circ h)(x) = \dots$ 

ج - $2x^2 + 2$	ب - $2x^2 - 1$	أ - $2x^2 + 5$
----------------	----------------	----------------

2. دالة حيث  $f(0) = 3$  و  $f'(0) = 1$  معادلة مماس المنحني للدالة  $f$  عند النقطة  $(0;1)$  هي:

ج - $y = 3x + 3$	ب - $y = 3x$	أ - $y = 3x + 1$
------------------	--------------	------------------

3. هي معادلة مماس منحني الدالة  $f$  عند النقطة  $A(1; -1)$ . العدد  $f'(1)$  هو:

ج - 0	ب - 2	أ - 6
-------	-------	-------

4. الدالة  $f: x \mapsto 3x^5 + 7x^3$  المعرفة على  $\mathbb{R}$ ...

ج - ليست رتيبة	ب - متناقصة تماما	أ - متزايدة تماما
----------------	-------------------	-------------------

5. لتكن  $B$  و  $C$  ثلاثة حادثات من المجموعة  $\Omega$  حيث:

$$p(B \cap C) = \dots, p(B \cup C) = 0,7, p(C) = 0,7, p(B) = 0,4$$

ج - 0,5	ب - 0,4	أ - 0,35
---------	---------	----------

## التمرين الثاني (70ن):

تحتوي علبة على 3 كريات حمراء مرقمة بالأرقام 1، 2، 3 و 4 كريات سوداء مرقمة بالأرقام 0، 1، 2، 3 و كرتين صفراوين تحملان الرقمين 1، 4 (الكريات لا نفرق بينهم باللمس)  
نسحب كرية واحدة عشوائيا من العلبة

1. عين احتمال الأحداث التالية:

A: "الكرة المسحوبة حمراء"

B: "الكرة المسحوبة تحمل رقما أكبر أو يساوي 3"

2. هل الحادثتان A و C متلائمتين؟ براجابتكم

3. احسب احتمال الأحداث التالية:

$$\bar{C}, \bar{A} \cup B, A \cup C, A \cap B, \bar{A}$$

دالة معرفة على المجموعة  $f(x) = \frac{2x-2}{x+2}$  كمالي:  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

(C<sub>f</sub>) المنحى الممثل للدالة  $f$  في المستوى المنسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس  $(\vec{o}, \vec{i}, \vec{j})$ .

1. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $D_f$  :  $f(x) = 2 - \frac{6}{x+2}$
2. برهن ان النقطة  $A(-2, 2)$  مركز تناظر المنحى  $(C_f)$ .
3. أ- أحسب الدالة المشتقة للدالة  $f$  ثم عين اشارتها.  
ب- شكل جدول تغيرات الدالة  $f$
4. أكتب معادلة للمستقيم  $(\Delta)$  مماس للمنحى  $(C_f)$  عند النقطة التي فاصلتها  $x_0 = -3$  ادرس اشارته  $(x)$  على المجموعة  $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$
5. 6.  $g(x) = |f(x)|$  دالة معرفة على المجموعة  $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$  كمالي:  $(C_g)$  المنحى الممثل للدالة  $g$  في المعلم السابق.  
أ- اكتب عبارة الدالة  $g$  دون رمز القيمة المطلقة.  
ب- اشرح كيف نستنتج المنحى  $(C_g)$  انطلاقاً من المنحى  $(C_f)$ .
7.  $k(x) = -f(x)$  و  $h(x) = f(x) - 2$  دالتين معرفتين على  $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$  كمالي:  $(C_k)$  منحى الدالة  $h$  و  $(C_h)$  منحى الدالة  $k$  انطلاقاً من  $(C_f)$ .  
أ- استنتاج اتجاه تغير الدالتين  $h$  و  $k$ .  
ت- اشرح كيف يمكن انشاء  $(C_h)$  منحى الدالة  $h$  و  $(C_k)$  منحى الدالة  $k$  انطلاقاً من  $(C_f)$ .

مع تمنيات أستاذتي المادة لكم بالتوفيق

العلامة	الإجابة
<u>0.25</u> + <u>0.75</u> 5 ×	<p><u>التمرين الأول:</u></p> <p><u>اختيار الإجابة الصحيحة:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ال اختيار "أ" لأن: <math>(goh)(x) = g(x^2 + 3) = 2(x^2 + 3) - 1 = 2x^2 + 5</math></li> <li>ال اختيار "أ" لأن: <math>y = 3x + 1</math> ومنه: <math>y = f'(0)(x - 0) + f(0)</math></li> <li>ال اختيار "ب" لأن: <math>f'(1) = 2</math> لدينا: <math>y = 2x - 3</math> و <math>y = f'(1)(x - 1) + f(1)</math> ومنه: <math>2 = f'(1) + f(1)</math></li> <li>ال اختيار "أ" لأن: الدالة <math>f</math> قابلة للاشتتقاق على <math>\mathbb{R}</math> و: <math>f'(x) = 15x^4 + 21x^2 &gt; 0</math></li> <li>ال اختيار "ب" لأن: لدينا: <math>P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(B \cap C)</math> ومنه: <math>P(B \cap C) = 0.4 + 0.7 - 0.7 = 0.4</math> إذا: <math>P(B \cap C) = P(B) + P(C) - P(B \cup C)</math></li> </ol>
<u>0.75</u> 3 ×	<p><u>التمرين الثاني:</u></p> <p><u>1. تعين احتمال الأحداث:</u></p> $P(C) = \frac{3}{9} \quad , \quad P(B) = \frac{5}{9} \quad , \quad P(A) = \frac{3}{9}$ <p>2. الحادثان <math>A</math> و <math>C</math> متلائمتين لأن: <math>A \cap C = \{R_3\}</math></p>
<u>0.5</u> 2 ×	<p><u>3. حساب الاحتمالات:</u></p> $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{9} = \frac{6}{9} \quad -$ <p><math>P(A \cap B) = \frac{2}{9}</math> : "الكرية المسحوبة حمراء تحمل رقمًا فرديًا" ومنه: <math>A \cap B</math> -</p> $P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) = \frac{3}{9} + \frac{3}{9} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9} \quad -$ $P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A} \cap B) = \frac{6}{9} + \frac{5}{9} - \frac{3}{9} = \frac{8}{9} \quad -$ $P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{3}{9} = \frac{6}{9} \quad -$

**التمرين الثالث:**

دالة معرفة على المجموعة  $f: [-\infty; -2] \cup [-2; +\infty]$  كمالي:

**0.75**

1. التحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $D_f$

$$2 - \frac{6}{x+2} = \frac{2(x+2) - 6}{x+2} = \frac{2x+4 - 6}{x+2} = \frac{2x-2}{x+2} = f(x)$$

2. البرهان ان النقطة  $A(-2; 2)$  مركز تناظر المنحنى  $(C_f)$

**0.25**

لدينا:  $x \in D_f$  يعني:  $x \neq -2$  ومنه:  $-4 - x \neq 2 - 4$  إذا:  $2\alpha - x \neq -2$   $f(-2\alpha - x) + f(x) = f(-4 - x) + f(x)$

**0.75**

$$\begin{aligned} &= 2 - \frac{6}{-4 - x + 2} + 2 - \frac{6}{x + 2} \\ &= 4 - \frac{6}{-2 - x} - \frac{6}{x + 2} = 4 = 2\beta \end{aligned}$$

ومنه: النقطة  $A$  مركز تناظر للمنحنى  $(C_f)$

**+0.5  
0.25**

3. أ- أحسب الدالة المشتقة للدالة  $f$  ثم تعين اشارتها.

الدالة  $f$  قابلة للاشتاقاق على مجال تعريفها و:  $f'(x) = \frac{2(x+2) - 1(2x-2)}{(x+2)^2} = \frac{6}{(x+2)^2} > 0$

ومنه: الدالة  $f$  متزايدة تماما على مجال تعريفها

**ب. جدول تغيرات الدالة  $f$**

**0.5**

$x$	$-\infty$	$-2$	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	$\nearrow$		$\nearrow$

**0.75**

4. أكتب معادلة المستقيم  $(\Delta)$  مماس للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة التي فاصلتها  $x_0 = -3$

لدينا:  $y = 6x + 17$  إذا:  $y = f'(-3)(x+3) + f(-3)$  ومنه:  $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

**0.75**

5. ادرس اشارة  $f(x)$  على المجموعة  $[-\infty; -2] \cup [-2; +\infty]$ .

$x$	$-\infty$	$-2$	$1$	$+\infty$
$2x-2$	-	-	0	+
$x+2$	-	0	+	+
$\frac{2x-2}{x+2}$	+	-	0	+

6. دالة معرفة على المجموعة  $[-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$  كمالي:  $g(x) = |f(x)|$  - كتابة عبارة الدالة  $g$  دون رمز القيمة المطلقة.

0.5

$$\begin{cases} g(x) = f(x); x \in ]-\infty; -2[ \cup [1; +\infty[ \\ g(x) = -f(x); x \in ]-2; 1] \end{cases}$$

0.5  
0.5

- اشرح كيف نستنتج المنحنى  $(C_g)$  انطلاقاً من المنحنى  $(C_f)$  ينطبق على  $(C_g)$  لما  $x$  ينتمي للمجالين  $[-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$  و  $(C_g)$  نظير  $(C_f)$  بالنسبة لمحور الفواصل لما  $x$  ينتمي للمجال  $] -2; 1]$

7. دالتين معرفتين على  $[-\infty; -2] \cup [1; +\infty[$  كمالي:  $k(x) = -f(x)$  و  $h(x) = f(x) - 2$  -  
أ- استنتاج اتجاه تغير الدالتين  $h$  و  $k$ .

0.5  
0.5

ت- شرح كيفية يمكن انشاء  $(C_h)$  و  $(C_k)$  انطلاقاً من  $(C_f)$ .

- صورة  $(C_f)$  بالانسحاب الذي شعاعه  $\bar{j}$   
- نظير  $(C_f)$  بالنسبة لمحور الفواصل

0.5  
0.5