التمرين 1

ABC مثلث كيفي. ترجم بمساواة شعاعية العبارات التالية ثم أنشئ النقط D ، E ، F ، G ، H.

(1) D نظيرة B بالنسبة إلى A.

(2) C منتصف القطعة $[BE]$.

(3) F صورة B بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$.

(4) $BDGF$ متوازي الأضلاع.

(5) H مركز متوازي الأضلاع $ADGC$.

التمرين 2

A ، B ، C ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة.

(1) أنشئ النقطة D بحيث $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$.

(2) أنشئ النقطة E بحيث $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{0}$.

(3) استنتج نوع الرباعي $CEDB$.

التمرين 3

ABC مثلث قائم في A.

أنشئ النقط D ، E ، F ، G ، H و I بحيث :

$\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AC}$: $\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{BC}$: $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$

$\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{BF}$: $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AH}$: $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{0}$.

التمرين 4

$ABCD$ معين. مثّل الأشعة التالية :

$\overrightarrow{u} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$: $\overrightarrow{v} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$: $\overrightarrow{w} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{CB}$.

التمرين 5

$EFGH$ متوازي الأضلاع و I منتصف $[EF]$.

(1) أنشئ الشكل.

(2) (أ) ما هي صورة E بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{EH}$ ؟

(ب) ما هي صورة F بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{EH}$ ؟ علّل.

(3) أنشئ النقطة J ، صورة I بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{EH}$.

ماذا تمثل النقطة J بالنسبة للقطعة $[GH]$ ؟ علّل.

(4) أنشئ النقطة K بحيث $\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{EG} + \overrightarrow{EH}$.

بين أن J منتصف $[EK]$.

التمرين 6

(1) أنشئ متوازي الأضلاع $ABCD$ ثم النقط E ، F ، G و H بحيث :

$\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{0}$: $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$: $2\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{CD}$: $\overrightarrow{HA} = \overrightarrow{FB}$.

(2) ماذا تمثل النقط E ، F ، G ، H بالنسبة للقطع $[AB]$ ، $[BC]$ ، $[CD]$ ، $[DA]$ على الترتيب ؟

(3) استنتج نوع الرباعي $EFGH$.

التمرين 7

A ، B ، C ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة.

(1) (أ) أنشئ النقطة E بحيث $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BE}$.

(ب) بين أن الرباعي $ABEC$ متوازي الأضلاع.

(2) (أ) أنشئ النقطة G ، صورة النقطة A بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CA}$.

(ب) بين أن A منتصف $[GC]$.

(ج) استنتج $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AC}$.

(3) (أ) أنشئ النقطة H بحيث $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AG}$.

(ب) بين أن : $\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{0}$.

التمرين 8

ABC مثلث كيفي.

(1) عين النقطة H بحيث $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BH}$.

(2) عين النقطة E بحيث $\overrightarrow{HC} = \overrightarrow{CE}$.

(3) برهن أن $(AE) // (BC)$.

التمرين 9

ABC مثلث كيفي.

(1) أنشئ النقطتين D و N بحيث :

$\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

(2) بين أن B منتصف $[DN]$.

التمرين 10

(1) ارسم مثلثا MEC ثم عين K ، منتصف $[CM]$.

(2) أنشئ النقطة N ، نظيرة E بالنسبة إلى K.

(3) بين أن $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{EM}$.

(4) (أ) أنشئ النقطة D ، صورة النقطة M بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CN}$.

(ب) ماذا تمثل النقطة M بالنسبة للقطعة $[ED]$ ؟ علل.

(5) أتمم المساويات التالية باستعمال نقط الشكل :

(أ) $\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{MD} = \ldots$ (ب) $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{ND} = \ldots$ (ج) $\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EC} = \ldots$.

التمرين 11

EFG مثلث كيفي.

(1) أنشئ النقطة K ، صورة النقطة E بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{FG}$.

(2) أنشئ النقطة L حيث $\overrightarrow{EK} + \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{EL}$.

(3) بين أن النقطة G منتصف القطعة $[FL]$.

Scanné avec CamScanner

حل التمرين 1

(1) مثلا $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AB}$ أو $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$.

(2) مثلا $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{CB}$ أو $\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}$ أو $\overrightarrow{EC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EB}$ أو $\overrightarrow{EB} = 2\overrightarrow{EC}$.



(3) مثلا $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$ أو $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AB}$.

(4) مثلا $\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{DB}$ أو $\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{BF}$.

(5) مثلا $\overrightarrow{CH} = \overrightarrow{HD}$ و $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{HA}$
أو $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HD} + \overrightarrow{HG} + \overrightarrow{HC} = \vec{0}$.

حل التمرين 2

(1) ننشئ النقطة D بحيث يكون الرباعي $ABDC$ متوازي الأضلاع.



(2) $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$ يعني $\overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{CA}$ أي $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AC}$ و بالتالي C هي منتصف $[AE]$ أي E نظيرة A بالنسبة إلى C.

(3) نعلم، من السؤال الأول، أن $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ و من السؤال الثاني أن $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CE}$ نستنتج إذاً أن $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{CE}$ و هذا يعني بالضبط أن الرباعي $CEDB$ متوازي الأضلاع.

حل التمرين 3

(1) D هي نظيرة C بالنسبة إلى A.

(2) للشعاعين $\overrightarrow{DE}$ و $\overrightarrow{BC}$ نفس المنحى . نفس الاتجاه و $DE = 2BC$.

(3) حسب علاقة شال : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ إذاً $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AC}$ و بالتالي فالنقطة F تنطبق على النقطة C.

(4) للشعاعين $\overrightarrow{BE}$ و $\overrightarrow{BF}$ نفس المبدأ إذاً نطبق قاعدة متوازي الأضلاع : ننشئ النقطة G بحيث يكون $BEGF$ متوازي الأضلاع.

(5) ليس للشعاعين $\overrightarrow{AF}$ و $\overrightarrow{BD}$ نفس المبدأ إذاً ننشئ النقطة H بحيث $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{BD}$.

(6) الشعاعان $\overrightarrow{IA}$ و $\overrightarrow{BA}$ متعاكسان إذاً I هي نظيرة B بالنسبة إلى A أي I تنطبق على H.



حل التمرين 4

(1) حسب علاقة شال : $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA}$ إذاً $\vec{u} = \overrightarrow{BA}$.



(2) للشعاعين $\overrightarrow{BA}$ و $\overrightarrow{BC}$ نفس المبدأ إذاً نطبق قاعدة متوازي الأضلاع : ننشئ النقطة E بحيث يكون $ABCE$ متوازي الأضلاع منه $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AE}$ و بالتالي E تنطبق على D.
لدينا إذاً : $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BD}$ منه $\vec{v} = \overrightarrow{BD}$.

(3) لدينا : $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AD} + \left(-\overrightarrow{CB}\right) = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

ليس للشعاعين $\overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{BD}$ نفس المبدأ إذاً ننشئ النقطة F بحيث $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{BC}$ فيكون $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AF}$.
إذاً $\vec{w} = \overrightarrow{AF}$.

Scanné avec CamScanner

حل التمرين 5

(1) الشكل.

(2) بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{EH}$. صورة النقطة E هي النقطة H.

(3) بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{EH}$. صورة النقطة F هي النقطة G لأن $EFGH$ متوازي الأضلاع.

(4) الانسحاب يحول منتصف قطعة إلى منتصف قطعة و بما أن صورة القطعة $[EF]$ بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{EH}$ هي القطعة $[GH]$ فإن منتصف $[GH]$ هي صورة منتصف $[EF]$ أي I منتصف $[GH]$.



(5) حسب قاعدة متوازي الأضلاع : الرباعي $EGKH$ متوازي الأضلاع إذاً قطراه متناصفان أي I هي منتصف $[EK]$ (و هي منتصف $[GH]$).

حل التمرين 6

(1) الشكل.



(2) العلاقات التي عرفت بها النقط H . G . F . E تعني بالضبط أنها منتصفات القطع $[AB]$. $[BC]$. $[CD]$. $[DA]$ على الترتيب.

(3) بما أن $ABCD$ متوازي الأضلاع فإن $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$ منه :

$$\overrightarrow{AH} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{FC} \qquad \text{و} \qquad \overrightarrow{EA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CG}$$

منه : $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{FC}$ و حسب علاقة شال : $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{CG}$ أي $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$

و هذا يعني أن الرباعي $EFGH$ متوازي الأضلاع.

حل التمرين 7

(1) (أ) الشكل.



(ب) بما أن $AC = BE$ فإن $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BE}$ و $(AC) // (BE)$ إذاً للرباعي $ABEC$ ضلعان متقابلان متقايسان و حاملاهما متوازيان و بالتالي فهو متوازي الأضلاع.

(2) (أ) الشكل.

(ب) لدينا : $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$ و هذا يعني أن النقطة A هي منتصف $[GC]$.

(ج) بما أن $\overrightarrow{AG} = -\overrightarrow{AC}$ فإن $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{0}$.

(3) للشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AG}$ نفس المبدأ إذاً نطبق قاعدة متوازي الأضلاع : ننشئ النقطة H بحيث يكون $ABHG$ متوازي الأضلاع منه $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AG}$.

(4) حسب علاقة شال :

$$\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \underbrace{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}}_{\overrightarrow{AE}} + \underbrace{\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CA}}_{\overrightarrow{EA}} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EA} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0}$$

حل التمرين 8

(1) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BH}$ إذاً H هي نظيرة A بالنسبة إلى B أي B منتصف $[AH]$.

(2) $\overrightarrow{HC} = \overrightarrow{CE}$ إذاً E هي نظيرة H بالنسبة إلى C أي C منتصف $[HE]$.

(3) بما أن B منتصف $[AH]$ و C منتصف $[HE]$ فحسب نظرية مستقيم المنتصفين نستنتج أن $(AE) // (BC)$ (و $BC = \frac{1}{2}AE$).



<u>ملاحظة</u> : يمكن أيضا تطبيق النظرية العكسية لنظرية طاليس.

Scanné avec CamScanner

حل التمرين 9



(1) بما أن $\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB}$ فإن $ACBD$ متوازي الأضلاع منه $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AC}$.

للشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ نفس المبدأ إذاً نطبق قاعدة متوازي الأضلاع : ننشئ النقطة N بحيث يكون $ABNC$ متوازي الأضلاع منه $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AC}$.

(2) بما أن $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AC}$ فإن $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{BN}$ و هذا يعني أن B منتصف $[DN]$.

حل التمرين 10

(1) الشكل.

(2) الشكل.

(3) الرباعي $MECN$ متوازي الأضلاع لأن قطريه $[MC]$ و $[EN]$ متناصفان و بالتالي $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{EM}$ و $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{EC}$.



(4) (أ) D صورة النقطة M بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CN}$ معناه $CNDM$ متوازي الأضلاع منه $\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{CN}$.

(ب) بما أن $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{EM}$ و $\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{CN}$ فإن $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{MD}$ و هذا يعني أن M منتصف $[ED]$.

(5) (أ) بما أن $\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{CN}$ فإن $\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{EN}$ حسب علاقة شال.

(ب) حسب علاقة شال : $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{ND} = \overrightarrow{CD}$.

(ج) حسب علاقة شال : $\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{EN}$.

حل التمرين 11



(1) K صورة النقطة E بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{FG}$ معناه $FGKE$ متوازي الأضلاع منه $\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{FG}$.

(2) للشعاعين $\overrightarrow{EG}$ و $\overrightarrow{EK}$ نفس المبدأ إذاً نطبق قاعدة متوازي الأضلاع : ننشئ النقطة L بحيث يكون $EGLK$ متوازي الأضلاع منه $\overrightarrow{GL} = \overrightarrow{EK}$.

(3) بما أن $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{EK}$ و $\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{GL}$ فإن $\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{GL}$ و هذا يعني أن G منتصف $[FL]$.

Scanné avec CamScanner