

الاجماع من الموضوعين

الموضوع 01

التمرين الأول: (04 نقاط)

لتكن f الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty]$ بـ

• ادرس اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0; +\infty]$

نعتبر المتالية (u_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ

$$\begin{cases} u_0 = \frac{5}{4e} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

• الشكل في الورقة المرفقة يمثل المنحنى (C) للدالة f على المجال $[0; +\infty]$ والمستقيم (D) الذي معادلته $x = y$.

(1) مثلا على محور الفواصل الحدود ، u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 دون حسابها مبرزا خطوط الرسم.

ب) ما تخيينك حول إتجاه تغير المتالية (u_n) و تقارها ؟

(2) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} = \frac{2}{e} \left(1 - \frac{1}{eu_n + 1} \right)$$

ب) برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_n > \frac{1}{e}$$

ج) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{eu_n \left(\frac{1}{e} - u_n \right)}{eu_n + 1}$$

(3) نعتبر المتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ

$$v_n = \frac{eu_n}{eu_n - 1}$$

أ) بين أن (v_n) متالية هندسية أساسها 2 يطلب تعين حدتها الأول v_0 .

ب) عبر v_n و u_n عن بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

ج) أحسب المجموع S_n بدلالة n حيث :

$$S_n = \frac{1}{(eu_0 - 1)^2} + \frac{1}{(eu_1 - 1)^2} + \dots + \frac{1}{(eu_n - 1)^2}$$

التمرين الثاني: (05 نقاط)

لكل سؤال ثالث إجابات ، إجابة واحدة منها صحيحة ، المطلوب: تحديد الإجابة الصحيحة مع التبرير

1- جذور العدد المركب i - هي:

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \quad ج \quad -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \quad ب \quad \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \quad أ$$

2- الدالة المعرفة على $[0; +\infty]$ هي: $h(x) = xe^x$. القيمة المتوسطة للدالة h على المجال $[0; 1]$ هي:

$$\mu = 0 \quad ج \quad \mu = e - 1 \quad ب \quad \mu = 1 \quad أ$$

3- تتكون مجموعة أشخاص من 8 رجال و 6 نساء، نريد تكوين 3 أشخاص رئيس و نائب و أمين عام ، عدد اللجان التي تضم رجال و امرأةان

الممكن الحصول عليها بحيث الرئيس أنثى هو:

$$ج 240 \quad ب 480 \quad أ 360$$

4- الشكل الأسوي لحلول المعادلة $z + \sqrt{3}z + 1 = 0$ في مجموعة الأعداد المركبة هي

$$e^{\frac{2\pi i}{3}}; e^{\frac{4\pi i}{3}} \quad ج \quad e^{\frac{\pi i}{6}}; e^{\frac{7\pi i}{6}} \quad ب \quad e^{\frac{5\pi i}{6}}; e^{\frac{7\pi i}{6}} \quad أ$$

5 - حلول المعادلة التفاضلية $y' + 3y + 6 = 0$ هي الدالة $y(0) = 1$ و الذي يتحقق h حيث:

$$h(x) = -3e^{-3x} + 4.$$

$$h(x) = 3e^{-3x} + 2.$$

$$h(x) = 3e^{-3x} - 2.$$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

يحتوي صندوق على ثلاثة أزهار نرد متوازنة ، اثنان منها خضراء و احمر و فيها ست أوجه مرقمة من 1 إلى 6 وأما الزهر الثالث فلونه أحمر وفيه وجهان يحملان الرقم 1 وأربعة أوجه تحمل الرقم 6.

نسحب من الصندوق بصفة عشوائية زهر نرد ثم نرميه مرة واحدة و نسجل الرقم الظاهر ، نعتبر الأحداث التالية :

V : زهر النرد المسحوب أخضر ، R : زهر النرد المسحوب أحمر ، S : الرقم الظاهر هو 6 .

(1) أ translucent و أكمل شجرة الاحتمالات المقابلة

ب) بعد رمي زهر النرد كان الرقم الظاهر هو 6 ، ما احتمال أن يكون لونه أحمر ؟

ج) احسب احتمال أن يكون زهر النرد أخضر علماً أنه يحمل رقم 1 .

2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بـ a - إذا كان الرقم الظاهر 6 و a إذا كان عكس ذلك .

أ) عين قيم المتغير العشوائي X .

ب) عرف قانون الاحتمال L_X ، و أحسب أمله الرياضي .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

أ) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $[0; +\infty)$ كما يلي :

ولتكن (C_g) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

$$A\left(1, \frac{1}{2}\right) \text{ عند النقطة } (C_g) \text{ (D) مماساً}$$

1. عين قيمتي a و b .

2. عين اتجاه تغيرات الدالة g واستنتج إشارة $g(x)$ على المجال $[0; +\infty)$.

$$g(x) = \frac{1}{2}x^2 - \ln x$$

أ) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $[0; +\infty)$ كما يلي :

ولتكن (C_f) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. عين نهاية الدالة f عند 0 و $+\infty$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول التغيرات .

3. أثبتت أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x - 2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ب) حدد وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) في المجال $[0; +\infty)$.

د) أثبتت أنه توجد نقطة وحيدة B للمنحنى (C_f) يكون المماس (T) عندها موازي للمستقيم (Δ) يطلب كتابة معادلة (T) .

4. أ) برهن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث: $0,5 < \alpha < 0,6$.

$$\text{ب) ارسم } (C_f) \text{ و } (\Delta) \text{ و } (T) \text{ (} \|\vec{i}\| = 2\text{cm} ; \|\vec{j}\| = 1\text{cm} \text{)}$$

ج) ناقش بيانياً حسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة $(m+1)x - 1 - \ln x = 0$.

5. احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C) والمستقيمين اللذين معديلاهما 1 و $x = e$ و $x = 1$.

6. نعتبر الدالة h المعرفة على R^* $h(x) = f(x^2)$.

أ) اكتب $h'(x)$ بدلالة $f'(x)$.

ب) شكل جدول تغيرات الدالة h .

انتهى الموضوع الأول

الموضوع 02

التمرين الأول: (04 نقاط)

نعتبر المتتالية (U_n) الهندسية حدودها موجبة حيث: $4 = \ln(u_4) - \ln(u_2) = -12$ و $1 = \ln(u_1) + \ln(u_5)$

(1) بين أن أساس المتتالية (U_n) هو $q = \frac{1}{e^2}$ ثم عين حدتها الاولى u_0 .

(2) احسب U_n بدلالة n .

(3) أ- احسب المجموع $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$

ب- احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

(4) لتكن المتتالية (V_n) المعرفة من اجل كل عدد طبيعي n بـ: $V_n = \ln u_n + \ln u_{n+1}$

أ - بين أن (V_n) متتالية حسابية يطلب تعين أساسها.

ب - احسب المجموع S_n' حيث: $S_n' = V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n$

ت - هل توجد قيمة n حتى يكون $S_n' = 2^{30}$ علـ ؟

التمرين الثاني: (05 نقاط)

يحتوي صندوق على خمس كرات بيضاء مرقمة بـ: 1، 0، 0، 1، 1 و خمس كرات سوداء مرقمة بـ: 1، 1، 0، 1، 0. لانميـز بينـها باللمس ، نسحب عشوائـياً وفي آن واحد 3 كرات من الصندوق .

I. نعتبر الأحداث التالية :

A : الحصول على كرة بيضاء واحدة فقط

C : الكرات الثلاث المسحوبـة لها نفس اللون

F : مجموع أرقام الكرات الثلاث المسحوبـة يساوي 0

أحسب إحتمال الأحداث A ، B و C .

. $P(C \cap F) = \frac{7}{120}$ ، $P(F) = \frac{31}{120}$ و $P(D) = \frac{5}{6}$ 1 - بين أن :

2 - إذا كان مجموع أرقام الكرات المسحوبـة يساوي 0 ما هو إحتمال أن تكون الكرات الثلاث من نفس اللون ؟

3 - المتغير العشوائي الذي يرافق بكل سحب مجموع الأرقام المتحصل عليهـا

أ- عين قيم المتغير العشوائي X .

ب) عـين قـانون الـاحتمـال للمـتغير X ، أـحسب أـملـه الـرـياـضـيـاتـيـ .

ج) استنتج $E(2X + 1)$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

المستوى المركب منسوب إلى معلم متعامـد و متجانـس مباـشر $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. نضع $z_3 = -1 - 2i$ ، $z_2 = i\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)^3$ ، $z_1 = \frac{-3+i}{1+i}$

أ. أكتب على الشـكـل الجـبـرـي كل من الأـعـدـاد المـرـكـبـة z_1 ، z_2 .

ب. أـحسب طـولـيـة كل من الأـعـدـاد z_1 ، z_2 و z_3 .

2. نضع من أـجل كل عـدـد مـرـكـب z : $p(z) = z^3 + z^2 + 3z - 5$:

أ. أـحسب $p(1)$.

ب. عـين العـدـدـيـن الـحـقـيقـيـيـن α و β حيث: $p(z) = (z - 1)(z^2 + \alpha z + \beta)$

ت. حلـ في \mathbb{C} ، مـجمـوعـة الأـعـدـاد المـرـكـبـة ، المعـادـلـة $p(z) = 0$.

3. لـتكنـ النـقـط A ، B و C الـتي لـواـحـقـهـا $z_C = -1 - 2i$ ، $z_A = -1 + 2i$ ، $z_B = 1$ و i

أنشئ في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ النقط A ، B و C .

عين لاحقة النقطة D صورة A بواسطة تحاكي مركزه O ونسبة 3.

$$\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C}$$

احسب

استنتاج طبيعة المثلث ABC .

عين و انشئ مجموعة النقط M ذات الاحقة z التي تحقق: $|z + 1 - 2i| = 3$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

ا/ نعتبر الدالة g المعرفة على R ب: $g(x) = xe^x + 1$

احسب نهايتي الدالة g عند $-\infty$ و $+\infty$.

ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول اشارتها.

ii/ نعتبر الدالة f المعرفة على R ب: $f(x) = x - \ln(xe^x + 1)$

ولتكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. بين أنه من أجل كل x من R ب: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\ln\left(x + \frac{1}{e^x}\right)$

2. ا- بين أنه من كل x من R ، $f'(x) = \frac{-e^x + 1}{g(x)}$ ثم استنتاج اتجاه تغير الدالة و شكل جدول تغيراتها.

3. أ) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x = y$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

ج) بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) يطلب تعين معادلة له.

4. أ) بين أن المنحنى (C) الممثل للدالة $x \mapsto -\ln(x)$ مقارب لـ (C_f) عند $+\infty$

5. أحسب $f(0)$ ثم أرسم (Δ) ، (T) و المحنين (C) و (C_f) (حيث المنحنى (C_f) يقع فوق (C) من أجل $[0; +\infty)$).

6. عين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تكون للمعادلة: $f(x) = x + |m|$ حلين مختلفين.

7. نعتبر الدالة k المعرفة على R ب: $k(x) = \frac{(-1 + x^2)e^x + x + 1}{xe^x + 1}$

أ) بين أنه من أجل كل x من R ، $\int_0^{C_3^2} (k(x) - x) dx = -\ln(3 + e^{-3})$

ب) استنتاج A مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما

$$x = 3 \text{ و } x = 0$$

حيث (C_f) منحنى الدالة f' .

انتهى الموضوع الثاني

كلنا أمل في تفوقكم

بالتوفيق في شهادة البكالوريا

$$\begin{aligned} \frac{2}{e} \left(1 - \frac{1}{eu_n + 1} \right) &= \frac{2}{e} \left(\frac{eu_n + 1 - 1}{eu_n + 1} \right) \\ &= \frac{2}{e} \left(\frac{eu_n}{eu_n + 1} \right) = \frac{2u_n}{eu_n + 1} = u_{n+1} \end{aligned}$$

ب) برهان بالترافق أنه من أجل كل عدد طبيعي n $u_n > \frac{1}{e}$: $p(n)$...

$$u_0 = \frac{5}{4e} > \frac{1}{e} \quad n=0 \quad \text{ومنه} \quad p(n) \text{ من أجل } n=0 \quad \text{ومنه} \quad p(n+1)$$

ومنه $p(n)$ محققة من أجل $n=0$

نفرض صحة $p(n)$ أي $u_n > \frac{1}{e}$ ونبرهن صحة $p(n+1)$ أي نبرهن

$$u_{n+1} > \frac{1}{e}$$

طريقة 1) من فرض $eu_n + 1 > 1$ و منه $eu_n > 0$ و منه $eu_n + 1 > 2$ و منه $eu_n > \frac{1}{e}$

$$1 - \frac{1}{eu_n + 1} > \frac{1}{2} - \frac{1}{eu_n + 1} > -\frac{1}{2} \quad \text{و منه} \quad \frac{1}{eu_n + 1} < \frac{1}{2}$$

$$u_{n+1} > \frac{1}{e} \quad \text{أي} \quad \frac{2}{e} \left(1 - \frac{1}{eu_n + 1} \right) > \frac{1}{e} \quad \text{و منه}$$

طريقة 2) من فرض $u_n > \frac{1}{e}$ وبما أن f ممتزازة تماما على $[0; +\infty)$ فإن

$$u_{n+1} > \frac{1}{e} \quad f(u_n) > f\left(\frac{1}{e}\right)$$

و منه حسب مبدأ الاستدلال بالترافق فإن $u_n > \frac{1}{e}$ محققة من أجل كل

عدد طبيعي n

ج) اثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي n $u_{n+1} - u_n = \frac{eu_n \left(\frac{1}{e} - u_n \right)}{eu_n + 1} < 0$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n}{eu_n + 1} - u_n = \frac{2u_n - eu_n^2 - u_n}{eu_n + 1}$$

$$= \frac{u_n - eu_n^2}{eu_n + 1} = \frac{eu_n \left(\frac{1}{e} - u_n \right)}{eu_n + 1}$$

لدينا $eu_n + 1 > 0$ و $0 > \frac{1}{e} - u_n$ و منه $u_n > \frac{1}{e}$ أي $eu_n + 1 > 0$

فإن المتالية (u_n) متناقصة تماما.

الموضوع 01

التمرين الأول: (04 نقاط)

لتكن f الدالة المعرفة على المجال $[0; +\infty)$ دالة اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0; +\infty)$

دالة معرفة وقابلة للاشتراق على $[0; +\infty)$ و f' دالتها المشتقة معرفة

$$f'(x) = \frac{2(ex+1) - e2x}{(ex+1)^2} = \frac{2}{(ex+1)^2}$$


بما أن $f'(x) > 0$ فإن الدالة f متزايدة تماما على $[0; +\infty)$

$$\begin{cases} u_0 = \frac{5}{4e} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} \quad \text{نعتبر المتالية } (u_n) \text{ المعرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ}$$

الشكل في الورقة المرفقة يمثل المنحنى (C) للدالة f على المجال

$$y = x \quad [0; +\infty)$$

(أ) تمثيل على محور الفواصل الحدود ، u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 دون حسابها مبرزا خطوط الرسم.



ب) تخمين حول إتجاه تغير المتالية (u_n) و تقاربها

بما أن $u_3 > u_2 > u_1 > u_0$ فإن (u_n) متناقصة تماما ومتقاربة نحو

$$\frac{1}{e} \quad \text{أي} \quad (D) \text{ و } (C)$$

$$u_{n+1} = \frac{2}{e} \left(1 - \frac{1}{eu_n + 1} \right) : n$$

التمرين الثاني : (50 نقاط)

لكل سؤال ثلاثة إجابات ، إجابة واحدة منها صحيحة ، المطلوب :

تحديد الإجابة الصحيحة مع التبرير

1. جذور العدد المركب i هي: الإجابة (ب)

التبير نضع $i^2 = -1$ حيث $w^2 = -i$ ومنه $w = x + iy$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ 2xy = -1 \quad \text{أي} \quad x^2 - y^2 + 2xyi = -i \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{أو} \quad \begin{cases} 2x^2 = 1 & \dots(1) \\ 2xy = -1 & \dots(2) \end{cases}$$

$$x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{في المعادلة (2) فإن} \quad x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{في المعادلة (2) فإن} \quad x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

العدد المركب هي .2. الدالة المعرفة على $[0; +\infty]$. القيمة المتوسطة $h(x) = xe^x$

للدالة h على المجال $[0; 1]$ هي: الإجابة أ

$$\mu = \frac{1}{1-0} \int_0^1 xe^x dx$$

$$v'(x) = e^x \quad v(x) = e^x$$

$$= \int_0^1 xe^x dx \quad u(x) = x \quad u'(x) = 1$$

$$= xe^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx = (x-1)e^x \Big|_0^1 = 1$$

3. تتكون مجموعة أشخاص من 8 رجال و 6 نساء ، نريد تكوين 3 أشخاص رئيس و نائب و أمين عام ، عدد اللجان التي تضم رجل و امرأة الممكن

التحصل عليها بحيث الرئيس أنثى هو: الإجابة ب

التبير نضع الحادثة A ، عدد اللجان التي تضم رجل و امرأة الممكن

التحصل عليها بحيث الرئيس أنثى

$$|A| = 2A_6^2 \times A_8^1 = 2 \times 6 \times 5 \times 8 = 480$$

4. الشكل الأسي لحلول المعادلة $z^2 + \sqrt{3}z + 1 = 0$ في مجموعة الأعداد

المركبة هي الإجابة أ

$$z^2 + \sqrt{3}z + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = -1 = i^2$$

$$z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-\sqrt{3} + i}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} :$$

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-\sqrt{3} - i}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

$$|z_1| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{-1}{2}\right)^2} = 1 \quad \text{لدينا} \quad z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

بما أن المتتالية (u_n) متناقصة تماماً ومحدودة من الأسفل بـ $\frac{1}{e}$ فإنها

متقاربة .

(3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ :

أ) ثبات v_n ممتاليه هندسيه أساسها 2 .

$$v_{n+1} = \frac{eu_{n+1}}{eu_{n+1} - 1} = \frac{eu_n + 1}{eu_n + 1 - 1} = \frac{eu_n + 1}{2eu_n - eu_n - 1} = \frac{2eu_n}{eu_n + 1} = 2v_n$$

فإن (v_n) ممتاليه هندسيه أساسها 2 و $q = 2$

ب) عبر v_n عن بدلالة n :

$$v_n = \frac{eu_0}{eu_0 - 1} = 5 \quad \text{لدينا} \quad n \quad \text{بدلالة} \quad eu_n \quad \text{ومنه} \quad v_n = \frac{eu_n}{eu_n - 1}$$

$$(ev_n - e)u_n = v_n \quad \text{ومنه} \quad ev_n u_n - v_n = eu_n$$

$$u_n = \frac{5 \times 2^n}{e5 \times 2^n - e} = \frac{v_n}{ev_n - e}$$

حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{5 \times 2^n} = 0 \quad \text{لأن} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 \times 2^n}{e5 \times 2^n - e}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5 \times 2^n}{5 \times 2^n \left(e - \frac{e}{5 \times 2^n} \right)} = \frac{1}{e - \frac{e}{5 \times 2^n}}$$

$$= \frac{1}{e - \frac{e}{5 \times 2^n}} = \frac{1}{e}$$

ج) أحسب المجموع S_n بدلالة n

$$w_n = \frac{1}{(eu_n - 1)^2} = \frac{1}{\left(\frac{ev_n}{ev_n - e} - 1\right)^2} \quad \text{ومنه} \quad w_n = \frac{1}{(eu_n - 1)^2}$$

$$= \left(\frac{ev_n - e}{e}\right)^2 = (v_n - 1)^2 = v_n^2 - 2v_n + 1$$

ومنه :

$$S_n = \frac{1}{(eu_0 - 1)^2} + \frac{1}{(eu_1 - 1)^2} + \dots + \frac{1}{(eu_n - 1)^2}$$

$$= w_0 + w_1 + \dots + w_n = (v_0^2 - 2v_0 + 1) + (v_1^2 - 2v_1 + 1) + \dots + (v_n^2 - 2v_n + 1)$$

$$= (v_0^2 + v_1^2 + \dots + v_n^2) - 2(v_0 + v_1 + \dots + v_n) + 1 + 1 + \dots + 1 = (v_0^2 + v_1^2 + \dots + v_n^2) - 2(v_0 + v_1 + \dots + v_n) + 1 + 1 + \dots + 1$$

$$= 25 \left(\frac{4^{n+1} - 1}{4 - 1} \right) - 10 \left(\frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} \right) + n + 1$$

$$= \frac{25}{3} (4^{n+1} - 1) - 10 (2^{n+1} - 1) + n + 1$$

ب) بعد رمي زهر النرد كان الرقم الظاهر هو 6 ، حساب احتمال أن يكون لونه أحمر

$$p(S) = \frac{1}{6} \times \frac{2}{3} + \frac{4}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{6}{18}$$

$$p_S(R) = \frac{p(S \cap R)}{p(S)} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{4}{6}}{\frac{6}{18}} = \frac{4}{6}$$

ج) حساب احتمال أن يكون زهر النرد أخضر علماً أنه يحمل رقم 1 .

$$p(\bar{S}) = \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{6} \times \frac{1}{3} = \frac{12}{18}$$

$$p_{\bar{S}}(V) = \frac{p(V \cap \bar{S})}{p(V)} = \frac{\frac{2}{3} \times \frac{10}{6}}{\frac{12}{18}} = \frac{10}{12}$$

2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بـ 2a- إذا كان الرقم الظاهر 6 و a إذا كان عكس ذلك .

$$I = \{-2a, a\} . X$$

ب) عرف قانون الاحتمال لـ X ،

$$p(x = -2a) = p(S) = \frac{6}{18}$$

$$p(x = a) = p(\bar{S}) = \frac{12}{18}$$

X_i	$-2a$	a
$p(X = X_i)$	$\frac{6}{18}$	$\frac{12}{18}$

حساب أمله الرياضياتي

$$E(X) = \sum_{i=1}^2 X_i p(X = X_i) = \frac{-12a}{18} + \frac{12a}{18} = 0$$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

أ/ نعتبر الدالة العددية g المعرفة على $[0; +\infty)$ كما يلي :

$$g(x) = ax^2 + b \ln x$$

وليكن (C_g) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعمد

$$(O; \vec{i}, \vec{j})$$

$$A\left(1, \frac{1}{2}\right) \text{ مماساً لـ } (C_g) \text{ عند النقطة } (D)$$

1. تعين قيمتي a و b .

لدينا (D) مماساً موازياً محور الفواصل لـ (C_g) عند النقطة

$$\begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -1 \end{cases} \quad \text{حيث } g'(x) = 2ax + \frac{b}{x} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ 2a + b = 0 \end{cases} \quad \text{فإن} \quad \begin{cases} g(1) = \frac{1}{2} \\ g'(1) = 0 \end{cases}$$

2. عين اتجاه تغيرات الدالة g .

$$\arg z_1 = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad |k \in \mathbb{Z}| \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} \cos \theta_1 = \frac{x}{|z_1|} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta_1 = \frac{y}{|z_1|} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$z_1 = e^{\frac{7\pi}{6}i}$$

$$|z_2| = \sqrt{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1 \quad \text{ومنه} \quad z_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \quad \text{ولدينا}$$

$$\arg z_2 = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad |k \in \mathbb{Z}| \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} \cos \theta_2 = \frac{x}{|z_2|} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta_2 = \frac{y}{|z_2|} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$z_2 = e^{\frac{5\pi}{6}i}$$

ومنه لشكل الأسني لحلول المعادلة $\sqrt{3}z + 1 = 0$ في مجموعة الأعداد

$$e^{\frac{5\pi}{6}i}; e^{\frac{7\pi}{6}i}$$

5. حلول المعادلة التفاضلية $y' + 3y + 6 = 0$ و الذي يحقق

$$y(0) = 1$$

$$\text{لدينا } y' = -3y - 6 \quad \text{ومنه} \quad y' + 3y + 6 = 0$$

$$y = ce^{-3x} - \frac{-6}{-3} = ce^{-3x} - 2$$

$$c = 3 \quad \text{لدينا } y(0) = 1 \quad \text{ومنه} \quad c - 2 = 1 \quad \text{أي } c = 3$$

إذن حلول المعادلة التفاضلية $y' + 3y + 6 = 0$ و الذي يحقق


$$h(x) = 3e^{-3x} - 2 \quad \text{حيث } h(0) = 1$$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

نعتبر الأحداث التالية: V : زهر النرد المسحوب أخضر ، R : زهر النرد

المسحوب أحمر ، S : الرقم الظاهر هو 6 .

أ) الشجرة



3. أثبت أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x - 2$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

لدينا :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2 + 2 \ln x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} + \frac{2 \ln x}{x} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 2)] = 0$$

ومنه المستقيم (Δ) مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

ب) وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) في المجال $[0; +\infty)$.

$$f(x) - y = \frac{2 + 2 \ln x}{x} \cdot f(x) - y \text{ ندرس إشارة الفرق } y$$

جدول إشارة الفرق :

$$1 + \ln x = 0 \text{ معناه } 2 + 2 \ln x = 0 \text{ ومنه } f(x) - y = 0 \text{ أي } x = e^{-1} \text{ وبالتالي } \ln x = -1$$

x	0	e^{-1}	$+\infty$
$1 + \ln x$	—	0	+
$f(x) - y$	—	0	+
الوضع النسبي	(Δ) تحت (C_f) (Δ) يقطع (C_f)		(Δ) فوق (C_f)

د) أثبت أنه توجد نقطة وحيدة B للمنحنى (C_f) يكون المماس (T) عندها موازي للمستقيم (Δ) .

المماس (T) عندها موازي للمستقيمه (Δ) معناه $f'(x) = 1$ ومنه

$$\frac{x^2 - 2 \ln x}{x^2} = 1 \text{ معادلة } (T) \text{ هي}$$

$$(T) : y = f'(x)(x - 1) + f(1)$$

$$y = x$$

برهان أن المعادلة $y = x$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0.5 < \alpha < 0.6$.

بيان أن المعادلة $y = x$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0.5 < \alpha < 0.6$.

لدينا f مستمرة ورتبة تماما على المجال $[0.5; 0.6]$.

ولدينا : $f(0.5) < 0 < f(0.6)$.

حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $0 = f(x)$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0.5 < \alpha < 0.6$.

ب) رسم (C_f) و (Δ) (T).

($\|\vec{i}\| = 2 \text{ cm}$; $\|\vec{j}\| = 1 \text{ cm}$)

إشارة (x) على المجال $[0; +\infty)$ لدينا $\frac{1}{2}$ قيمة حدية صغرى ومنه متناظصة تماما على $[0; +\infty)$ و متزايدة تماما على $[0; +\infty)$.

$$g(x) \geq \frac{1}{2} \text{ أي } g(x) > 0 \text{ فإن موجبة على } [0; +\infty)$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x^2 - \ln x \text{ نضع}$$

II / نعتبر الدالة العددية f المعروفة على $[0; +\infty)$ كما يلي :

$$f(x) = x - 2 + \frac{2 + 2 \ln x}{x}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. عين نهاية الدالة f عند 0 و $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x - 2 + \frac{2 + 2 \ln x}{x} \right) = -\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} (2 + 2 \ln x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right) = +\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - 2 + \frac{2 + 2 \ln x}{x} \right) = +\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x} \right) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2) = +\infty \end{cases}$$

2. ادرس اتجاه تغير الدالة f , ثم شكل جدول التغيرات.

f دالة معروفة وقابلة للاشتاقاق على $[0; +\infty)$ و f' دالتها المشتقة

$$f'(x) = 1 + \left[\frac{\frac{2}{x} \times x - (2 + 2 \ln x)}{x^2} \right] \text{ لدينا :}$$

$$= 1 + \left[\frac{2 - (2 + 2 \ln x)}{x^2} \right] = \frac{x^2 - 2 \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{2 \left(\frac{1}{2}x^2 - \ln x \right)}{x^2} = \frac{2g(x)}{x^2}$$

استنتاج اتجاه تغير الدالة f : بما أن $0 < g(x) < 0$ فإن $f'(x) < 0$.

بما أن $0 < f'(x) < 0$ فإن f متزايدة تماما على $[0; +\infty)$.

جدول تغيرات الدالة f :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

6 . نعتبر الدالة $h(x) = f(x^2)$ المعرفة على R^*

$$f'(x) \text{ بدلالة } h'(x)$$

$$h'(x) = 2x f'(x^2)$$

• النهايات

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2) = 0^+ \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \end{cases} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x^2) = -\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2) = 0^+ \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \end{cases} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x^2) = -\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \end{cases} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2) = +\infty$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \end{cases} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2) = +\infty$$

• دراسة اتجاه تغير الدالة

لدينا $0 < x < 0$ $f'(x) > 0$ من أجل

أي لدينا $0 < x^2 < 0$ أي $f'(x^2) > 0$ من أجل

$$x \in]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$$


ومنه أشارة $h'(x)$ من أشارة

أي من أجل $x \in]0; +\infty[$ $h'(x) > 0$ فإن $h(x)$ متزايدة تماماً على $[0; +\infty[$

و من أجل $x \in]-\infty; 0[$ $h'(x) < 0$ فإن $h(x)$ متناقصة تماماً على $]-\infty; 0[$

ب) جدول تغيرات الدالة .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	—		+
$h(x)$	$+\infty$ ↘ — ∞	$-\infty$	$+\infty$ ↘



ج) مناقشة بيانياً حسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة

$$(m+1)x - 1 - \ln x = 0$$

معناه $(m+1)x - 1 - \ln x = 0$ ومنه

$$-2x + 2 + 2\ln x = 2mx - x + 1 + \ln x = mx$$

$$\frac{2 + 2\ln x}{x} = x + 2m - 2 + \frac{2 + 2\ln x}{x} = 2m \text{ أي}$$

$$f(x) = x + 2m$$

حلول المعادلة $f(x) = x + 2m$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع

$$\text{المستقيم } y_m = x + 2m \text{ ذو المعادلة } (\Delta_m)$$

العدد	m	$2m$
حل وحيد	$]-\infty; -1[$	$]-\infty; -2[$
حلين مختلفين	$] -1; 0[$	$] -2; 0[$
حل وحيد	0	0
لا يوجد حل	$]0; +\infty[$	$]0; +\infty[$

5. احسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C) والمستقيم

. $x = e$ و $x = 1$ و $y = x - 2$. $y = x - 2$ (D) والمستقيمين اللذين معدلتاهما

$$\begin{aligned} A &= \int_1^e |f(x) - y| dx \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \\ &= \int_1^e \left(\frac{2 + 2\ln x}{x} \right) dx \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \\ &= \int_1^e \left(\frac{2}{x} + \frac{2 + 2\ln x}{x} \right) dx \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \\ &= \left[2\ln|x| + (\ln|x|)^2 \right]_1^e \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| = 6cm^2 \end{aligned}$$

الموضوع 02

التمرين الأول : (04 نقاط)

نعتبر المتتالية (U_n) الهندسية حدودها موجبة حيث :

$$\begin{cases} \ln(u_2) - \ln(u_4) = 4 \\ \ln(u_1) + \ln(u_5) = -12 \end{cases} \quad \dots \dots \dots (1)$$

$$q = \frac{1}{e^2} \text{ هو } (U_n) \text{ هو}$$

لدينا $u_4 = u_2 q^2$ وبتعويض في المعادلة (1) نجد

$$\ln\left(\frac{1}{q^2}\right) = 4 \text{ ومنه } \ln\left(\frac{u_2}{u_2 q^2}\right) = 4 \text{ أي } \ln(u_2) - \ln(u_2 q^2) = 4$$

$$(U_n) \text{ مرفوض لأن } q = \frac{1}{e^2} \text{ ومنه } q^2 = \frac{1}{e^4} \text{ ومنه } \frac{1}{q^2} = e^4$$

$$q = \frac{1}{e^2} \text{ حدودها موجبة ومنه } u_0 \text{ تعين حدها}$$

لدينا $u_5 = u_0 q^5$ و $u_1 = u_0 q$ وبتعويض في المعادلة (2) نجد

$$\ln(u_0 q^6) = -12 \text{ ومنه } \ln(u_0 q^5) = -12$$

$$u_0 = -1 \text{ أو } u_0 = 1 \text{ أي } u_0^2 = 1 \text{ ومنه } u_0^2 e^{-12} = e^{-12} \text{ ومنه } u_0^2 q^6 = e^{-12}$$

مرفوض لأن لأن (U_n) حدودها موجبة ومنه $u_0 = 1$.

1.2 احسب U_n بدلالة n

$$u_n = u_0 q^n = e^{-2n}$$

1.3 احسب المجموع $S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$

$$S_n = u_0 \left(\frac{1 - (q)^{n+1}}{1 - q} \right) = \left(\frac{1 - (e^{-2})^{n+1}}{1 - e^{-2}} \right)$$

ب- احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 - (e^{-2})^{n+1}}{1 - e^{-2}} \right) = \frac{1}{1 - e^{-2}}$$

$$0 < e^{-2} < 1 ; \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-2})^{n+1} = 0$$

4. لتكن المتتالية (V_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ :

$$V_n = \ln u_n + \ln u_{n+1}$$

أ - بين أن (V_n) ممتالية حسابية يطلب تعين أساسها.

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \ln u_{n+1} + \ln u_{n+2} - (\ln u_n + \ln u_{n+1}) \\ &= \ln u_{n+2} - \ln u_n = \ln(e^{-2(n+2)}) - \ln e^{-2n} \\ &= -2n - 4 + 2n = -4 \end{aligned}$$

ومنه (V_n) ممتالية حسابية و $r = -4$ و $r = -4$

ب - احسب المجموع S_n حيث :

$$S_n = V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n$$

$$S_n = \frac{n+1}{2} (v_0 + v_n) = \frac{n+1}{2} (-2 - 4n - 2) = -2(n+1)^2$$

المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع الأرقام المتحصل عليها X

لأ توجد قيمة لـ n بحيث $S_n = 2^{30}$ لأن $S_n < 0$

التمرين الثاني : (05 نقاط)

يحتوي صندوق على خمس كرات بيضاء مرقمة بـ 1، 1، 0، 1، 1 . وخمس كرات سوداء مرقمة بـ 0، 0، 1، 1، 0 . لانميز بينها باللمس ، نسحب عشوائياً في آن واحد 3 كرات من الصندوق .

حساب إحتمال الأحداث A ، B و C .

$$|\Omega| = C_{10}^3 = \frac{10!}{3!7!} = 120$$

$$A = \{(B, N, N)\}$$

A : الحصول على كرة بيضاء واحدة فقط

$$p(A) = \frac{C_5^1 C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{50}{120} = \frac{5}{12}$$

B : الحصول على كرتين بيضاء على الأقل

$$B = \{(B, N, N); (B, B, N); (B, B, B)\}$$

$$p(B) = \frac{C_5^1 C_5^2 + C_5^2 C_5^1 + C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{110}{120} = \frac{11}{12}$$

C : الكرات الثلاث المسحوبة لها نفس اللون

$$C = \{(N, N, N); (B, B, B)\}$$

$$p(C) = \frac{C_5^3 + C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{20}{120} = \frac{1}{6}$$

D : الحصول على اللوين الأبيض والأسود

$$D = \{(B, N, N); (B, B, N)\}$$

$$p(D) = \frac{C_5^1 C_5^2 + C_5^1 C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{100}{120} = \frac{5}{6}$$

$$p(D) = 1 - p(C) = \frac{5}{6}$$

F : مجموع أرقام الكرات الثلاث المسحوبة يساوي 0

$$F = \{(0, 0, 0); (-1, 0, 1)\}$$

$$p(F) = \frac{C_3^3 + C_2^1 C_3^1 C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{31}{120}$$

$C \cap F$ مجموع الكرات المسحوبة معدوم وفي من نفس لون

$$C \cap F = \{(B_0, B_1, B_{-1}); (N_0, N_1, N_{-1})\}$$

$$p(C \cap F) = \frac{C_1^1 C_3^1 C_1^1 + C_1^1 C_2^1 C_2^1}{C_{10}^3} = \frac{7}{120}$$

حساب إحتمال أن تكون الكرات الثلاث من نفس اللون علماً أن

مجموع أرقام الكرات المسحوبة يساوي 0

$$p_F(C) = \frac{p(C \cap F)}{p(F)} = \frac{\frac{7}{120}}{\frac{31}{120}} = \frac{7}{31}$$

X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع الأرقام المتحصل عليها

2. نضع من أجل كل عدد مركب z :

$$p(1) = 1 \cdot p(1)$$

ب. عين العدددين الحقيقيين α و β حيث :

$$p(z) = (z-1)(z^2 + \alpha z + \beta)$$

$$(z-1)(z^2 + \alpha z + \beta)$$

$$\begin{aligned} \text{لدينا} \quad &= z^3 + z^2(\alpha - 1) + z(\beta - \alpha) - \beta \\ \text{ومنه بالتطابقة} \quad &= p(z) \\ &= z^3 + z^2(\alpha - 1) + z(\beta - \alpha) - \beta \end{aligned}$$

$$\beta = 5 \quad \alpha = 2$$

ج. حل في \mathbb{C} ، مجموعة الأعداد المركبة ، المعادلة

$$(z-1)(z^2 + 2z + 5) = 0 \quad p(z) = 0$$

$$z-1=0 \quad z^2 + 2z + 5 = 0$$

$$\{-1 + 2i, -1 - 2i, 1\} \quad p(z) = 0$$

3. لتكن النقط A ، B ، C و D التي لواحقها $z_B = 1$ ، $z_A = -1 + 2i$ و $z_C = -1 - 2i$ و

أنشئ في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ النقط A ، B و C .

النقطة D صورة A بواسطة تحاكي مركزه O ونسبة 3 .

$$z_D = 3z_A = 3(-1 + 2i) = -3 + 6i \quad z_D - z_o = 3(z_A - z_o)$$

ومنه $D(3; 6)$

$$\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C} \quad \text{احسب}$$

$$\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C} = \frac{1 - (-1 + 2i)}{1 - (-1 - 2i)} = \frac{(2 - 2i)(2 - 2i)}{(2 + 2i)(2 - 2i)} = -i$$

استنتج طبيعة المثلث ABC .

$$AB = BC \quad \text{أي} \quad \left| \frac{z_B - z_A}{z_B - z_C} \right| = |-i| = 1$$

لدينا متساوي الساقين (1)

$$\arg \left(\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C} \right) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$$

ومنه $\arg \left(\frac{z_B - z_A}{z_B - z_C} \right) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$

$$\left(\overrightarrow{CB}; \overrightarrow{AB} \right) = -\frac{\pi}{2}$$

ومنه المثلث ABC قائم (2)

من (1) و (2) نستنتج أن ABC مثلث قائم ومتتساوي الساقين في A .

تعين مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقق :

$$|z + 1 - 2i| = 3$$

$$|z - (-1 + 2i)| = 3 \quad \text{معناه} \quad |z + 1 - 2i| = 3$$

$$AM = 3 \quad \text{ومنه} \quad |z - z_A| = 3$$

ومنه مجموعة النقط هي دائرة مركزها A و نصف قطرها 3

قيم و قانون المتغير العشوائي X

$$I = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$p(x = -2) = \frac{C_2^2 C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{3}{120} \quad \longleftrightarrow \quad x = -2 \longleftrightarrow \{(-1, -1, 0)\}$$

$$p(x = -1) = \frac{C_2^1 C_3^2 + C_2^2 C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{11}{120} \longleftrightarrow x = -1 \longleftrightarrow \{(-1, 0, 0)(-1, -1, 1)\}$$

$$p(x = 0) = p(F) = \frac{31}{120} \quad \longleftrightarrow x = 0 \longleftrightarrow \{(0, 0, 0)(-1, 0, 1)\}$$

$$p(x = 1) = \frac{C_5^1 C_3^2 + C_5^2 C_3^1}{C_{10}^3} = \frac{35}{120} \longleftrightarrow x = 1 \longleftrightarrow \{(1, 0, 0)(-1, 1, 1)\}$$

$$p(x = 2) = \frac{C_3^1 C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{30}{120} \quad \longleftrightarrow x = 2 \longleftrightarrow \{(1, 1, 0)\}$$

$$p(x = 3) = \frac{C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{10}{120} \quad \longleftrightarrow x = 3 \longleftrightarrow \{(1, 1, 1)\}$$

x_i	-2	-1	0	1	2	3
$p(x = x_i)$	$\frac{3}{120}$	$\frac{11}{120}$	$\frac{31}{120}$	$\frac{35}{120}$	$\frac{30}{120}$	$\frac{10}{120}$

أحسب أمله الرياضي .

$$E(X) = \sum_{i=1}^6 x_i p(x = x_i) = \frac{9}{10}$$

$$E(2X + 1) = 2E(X) + 1 = \frac{14}{5}$$

التمرين الثالث : (04 نقاط)

المستوى المركب منسوب إلى معلم متعمد و متجلس مباشر $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$$z_3 = -1 - 2i \quad z_2 = i \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)^3, \quad z_1 = \frac{-3 + i}{1 + i}$$

أ. الشكل الجبري للأعداد المركبة z_1 ، z_2 ، z_3 .

$$z_1 = \frac{(-3 + i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-3 + 3i + i + 1}{1 + 1} = \frac{-2 + 4i}{2} = -1 + 2i$$

$$z_2 = i \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)^3$$

$$= i \left(\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3 + 3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \left(-\frac{i}{2} \right) + 3 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \left(-\frac{i}{2} \right)^2 + \left(-\frac{i}{2} \right)^3 \right)$$

$$= i \left(\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{9i}{8} - \frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{8} \right) = i(-i) = 1$$

ب. حساب طولية الأعداد z_1 ، z_2 و z_3 .

$$|z_1| = |-1 + 2i| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$|z_2| = |1| = 1$$

$$|z_3| = |-1 - 2i| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

نعتبر الدالة g المعرفة على R بـ:

حساب نهايتي الدالة g عند $-\infty$ و $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x + 1 = +\infty$$

$$\left\{ \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x) = 0 \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x + 1 = 1 \right.$$

دراسة اتجاه تغير الدالة g

دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على R و g' دالتها المشتقة

$$g'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$$

$$x=0 \text{ معناه } g'(x)=0$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+

أي من أجل $x \in]-1; +\infty[$ فإن $g'(x) > 0$ ومنه g متزايدة تماما على $]-1; +\infty[$

ومن أجل $x \in]-\infty; 0[$ فإن $g'(x) < 0$ ومنه g متناقصة تماما على $]-\infty; 0[$.

جدول تغيراتها.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

أ.3) اثبات أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - \ln(xe^x + 1) - x) = 0$$

$$\left\{ \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x + 1) = 1 \right.$$

$$\left. \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x) = 0 \right\}$$

ب) دراسة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم.

$$\begin{aligned} \text{أي } xe^x = 0 \text{ ومنه } xe^x + 1 = 1 = \ln(xe^x + 1) \text{ ومنه } \\ x = 0 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) - x$	+	0	-
الوضع النسبي	فوق (C_f) ـ (Δ)	يقطع (C_f) ـ (Δ)	تحت (C_f) ـ (Δ)

ج) اثبات أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم

$$\frac{1 - e^x - xe^x - 1}{xe^x + 1} = 0 \text{ ومنه } \frac{1 - e^x}{xe^x + 1} - 1 = 0 \text{ معناه } f'(x) = 1$$

$$x = -1 - x = 0 \text{ ومنه } \frac{(-1 - x)e^x}{xe^x + 1} = 0$$

$$(T) : y = f'(-1)(x + 1) + f(-1)$$

$$y = x + 1 - \ln(-1 + e)$$

أثبات أنه من أجل كل x من R بـ:

$$-\ln\left(x + \frac{1}{e^x}\right) = -\ln\left(\frac{xe^x + 1}{e^x}\right)$$

$$= -\left[\ln(xe^x + 1) - \ln(e^x)\right]$$

$$= -\ln(xe^x + 1) + x = f(x)$$

حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\ln\left(x + \frac{1}{e^x}\right) = -\infty$$

$$\left\{ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{e^x}\right) = +\infty \right.$$

$$\left. \lim_{x \rightarrow +\infty} -\ln(x) = -\infty \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x - \ln(xe^x + 1)\right) = -\infty$$

$$\left\{ \lim_{x \rightarrow -\infty} (x) = -\infty \right.$$

$$\left. \lim_{x \rightarrow -\infty} (xe^x + 1) = 1 \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) = 0$$

6. تعين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تكون للمعادلة $f(x) = x + |m|$ حلين مختلفين.

المعادلة: $f(x) = x + |m|$ حلين مختلفين من أجل $]-1 + \ln(-1 + e); 1 - \ln(-1 + e)[$ أي $|m| < 1 - \ln(-1 + e)$

7. نعتبر الدالة k المعرفة على R بـ

$$k(x) = \frac{(-1 + x^2)e^x + x + 1}{xe^x + 1}$$

(أثبات أنه من أجل كل x من 0^2 إلى 3^2) $\int_0^3 (k(x) - x) dx = -\ln(3 + e^{-3})$ ، R

$$\begin{aligned} \int_0^3 (k(x) - x) dx &= \int_0^3 \left(\frac{(-1 + x^2)e^x + x + 1 - xe^x - 1}{xe^x + 1} \right) dx \\ &= \int_0^3 f'(x) dx = [f(x)]_0^3 = -\ln(3 + e^{-3}) \end{aligned}$$

ب) ستنتاج A مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما $x = 0$ و $x = 3$

$$\int_0^3 |f'(x)| dx = -\int_0^3 f'(x) dx = -[f(x)]_0^3 = \ln(3 + e^{-3})$$

4. أثبات أن المنحنى (C_f) الممثل للدالة $x \mapsto -\ln(x)$ مقارب له عند $+\infty$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + \ln x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\ln x - \ln \left(\frac{xe^x + 1}{e^x} \right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln \left(\frac{xe^x}{xe^x + 1} \right) \right) = 0 \end{aligned}$$

ثم أرسم $f(0) = 0$. (C_f) و (T) ، (Δ) و (Δ) المنحنيين

