



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

دورة: 2020



الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبية: تسيير واقتصاد

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

- إليك جدول تغيرات دالة f معرفة وقابلة للاشتاقاق على كل من المجالين $[2; +\infty]$ و $[-\infty; 2]$.
 (C_f) التمثيل البياني لـ f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

أجب بـ: صحيح أو خاطئ مع التبرير في كل حالة من الحالات التالية:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	+	
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$	1

1) المستقيم ذو المعادلة $y = 2$ مقارب لـ (C_f) عند $-\infty$.

2) النقطة $A(3; 2)$ تتبع إلى المنحنى (C_f) .

3) $f(2020) > f(2019)$.

4) المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ يقطع (C_f) في نقطة واحدة.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يتقاضى موظف خلال 2019 راتبا شهريا ثابتا يقدر بـ 70 000 DA ، في شهر جانفي استهلك منه 80% و ابتداءً من شهر فيفري قرر تخفيض مبلغ الاستهلاك شهريا بنسبة 5% من المبلغ المستهلك في الشهر الذي قبله.

1) أ. ما هو المبلغ المستهلك في شهر جانفي ؟

ب. حدد المبلغ المستهلك في شهر فيفري.

2) نضع: u_1 المبلغ المستهلك في شهر جانفي و u_n المبلغ المستهلك في الشهر n ، حيث n عدد طبيعي

غير معروف.

عُّبر عن u_{n+1} بدلالة u_n و استنتج أن (u_n) متتالية هندسية أساسها 0.95 .

3) اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n .

4) أ. احسب المبلغ المستهلك خلال سنة 2019 .

ب. أوجد المبلغ المدخر خلال هذه السنة.

التمرين الثالث: (40 نقاط)

المتالية العددية (u_n) معرفة بحدها الأول u_0 حيث: $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_n < \frac{9}{2} \quad (1)$$

ب. ادرس اتجاه تغير المتالية (u_n) و استنتج أنها متقاربة .

$$v_n = u_n - \frac{9}{2} : n \quad (2)$$

أ. بين أن المتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ يطلب حساب حدّها الأول v_0 .

ب. عُّبر عن v_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$\cdot S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n : \quad (3)$$

احسب S_n بدلالة n .

التمرين الرابع: (48 نقاط)

(I) الدالة العددية g معرفة على المجال $[0; +\infty]$ بـ:

$$\cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) \quad (1)$$

ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $[0; +\infty]$ ثم شُكّل جدول تغيراتها.

(3) احسب $(1) g$ ثم استنتاج حسب قيم x اشارة $(x) g$ على المجال $[0; +\infty]$.

(II) الدالة العددية f معرفة على المجال $[0; +\infty]$ بـ:

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x + 2 + x \ln x$. (التمثيل البياني لـ f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس (C_f))

$$(1) \text{ احسب } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad (\text{يعطى})$$

(2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $f'(x) = g(x)$.

(3) استنتاج اتجاه تغير الدالة f على المجال $[0; +\infty]$ ثم شُكّل جدول تغيراتها.

(4) احسب $(2) f$ ثم انشئ (C_f) .

(5) الدالة F معرفة على المجال $[0; +\infty]$ بـ:

بين أن F دالة أصلية للدالة f على المجال $[0; +\infty]$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

الدالة العددية f معرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2x$

(C_f) التمثيل البياني لـ f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة التالية مع التبرير.

(1) الدالة الأصلية لـ f على \mathbb{R} التي تتعدم من أجل $x=1$ هي الدالة F حيث:

$$F(x) = \frac{1}{9}x^3 - x^2 + \frac{8}{9} \quad (ج) \quad F(x) = \frac{1}{9}x^3 - x^2 \quad (ب) \quad F(x) = x^3 - x^2 \quad (أ)$$

(2) القيمة المتوسطة للدالة f على المجال $[0;1]$ هي:

$$\frac{8}{9} \quad (ج) \quad \frac{-8}{9} \quad (ب) \quad \frac{1}{9} \quad (أ)$$

(3) الدالة f متزايدة تماماً على المجال:

$$[-\infty; 3] \quad (ج) \quad [-3; +\infty[\quad (ب) \quad [3; +\infty[\quad (أ)$$

(4) المستقيم ذو المعادلة $y = -\frac{5}{3}$ يقطع المنحني (C_f) في نقطتين فاصلتاها:

$$-5 \quad (ج) \quad -1 \quad (ب) \quad 1 \quad (أ)$$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

المتتالية الهندسية (v_n) حدّها الأول v_0 وأساسها q موجبان تماماً و:

$$\begin{cases} \ln v_5 + \ln v_3 = 8 \ln 2 \\ \ln v_5 - \ln v_3 = 2 \ln 2 \end{cases}$$

(1) بين أنّ: $v_3 = 32$ و $v_5 = 8$

(2) أ. بين أنّ: $q = 2$ و $v_0 = 1$

ب. اكتب v_n بدلالة n .

ج. هل العدد 1024 حدّ من حدود المتتالية (v_n) ؟

(3) المتتالية (w_n) معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية \mathbb{N} بـ: $w_n = 2n - 3 + 2^n$

أ. تحقق أنّ: $w_n = u_n + v_n$ ، حيث (u_n) متتالية حسابية يطلب تعين أساسها وحدّها الأول u_0 .

ب. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$

$$S_n = (n+1)(n-3) + 2^{n+1} - 1 : n$$

التمرين الثالث: (04 نقاط)

المتتالية العددية (u_n) معرفة بحدّها الأول u_0 حيث: $u_0 = 5$ و من أجل كل عدد طبيعي n :

(1) برهن بالترّاجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 3$

(2) ادرس اتجاه تغير المتالية (u_n) واستنتج أنّها متقاربة.

(3) المتالية العددية (v_n) معرفة من أجل كلّ عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n - 3$.
أـ. بين أنّ المتالية (v_n) هندسية يُطلب تعين أساسها وحدّها الأول.

بـ. اكتب عبارة v_n بدالة n .

جـ. استنتاج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n واحسب نهاية (u_n) .
 $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{7}\right)^n + 3$

(4) عيّن أصغر قيمة للعدد الطبيعي n التي يكون من أجلها: $u_n < \frac{7}{2}$

التمرين الرابع: (08 نقاط)

(I) الجدول المقابل هو جدول تغيرات الدالة g المعرفة

$$g(x) = 3x^3 - 2 + 4\ln x \quad : \quad \text{على المجال } [0; +\infty[$$

(1) بين أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث: $0,9 < \alpha < 1$

(2) استنتاج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من $[0; +\infty[$.

(II) الدالة العددية f معرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ:

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (تؤخذ وحدة الطول 2cm)

(1) احسب كلاً من $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$. (يعطى: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+}} f(x)$)

(2) أـ. بين أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 3x - 2$ مقاًرب مائل للمنحنى (C_f) .

بـ. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

(3) أـ. بين أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x من المجال $[0; +\infty[$:

بـ. استنتاج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.


(4) ارسم كلاً من (Δ) و (C_f) . (تؤخذ $f(\alpha) \approx 0,9$).

(5) الدالة H معرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ:


أـ. بين أنّ H دالة أصلية للدالة: $x \mapsto -\frac{\ln x}{x^2}$ على المجال $[0; +\infty[$.

بـ. احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوى المحدّد بالمنحنى (C_f) و حامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما: $x = 1$ و $x = 2$.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
التمرين الأول: (04 نقاط)		
1	2x0.5	(1) خاطئة، لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \neq 2$
1	2x0.5	(2) خاطئة، لأن $f(3) < 1$
1	2x0.5	(3) صحيحة، لأن f متزايدة تماما على $[2; +\infty]$.
1	2x0.5	(4) صحيحة، لأن $f(x) = 1$ تقبل حلا وحيدا في $[-\infty; 2]$ ولا تقبل حلا في $[2; +\infty]$
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1	0.5	(1) أ. المبلغ المستهلك في شهر جانفي هو $56000DA$
	0.5	ب. المبلغ المستهلك في شهر فيفري هو $53200DA$
1	0.5 0.5	(2) نجد: $u_{n+1} = \frac{19}{20}u_n$ و $u_1 = 56000$ الاستنتاج: (u_n) متالية هندسية أساسها 0.95
	0.25 0.75	(3) $u_n = 56000 \left(\frac{19}{20}\right)^{n-1}$ أي $u_n = u_1 \times q^{n-1}$
1	0.5	(4) أ. حساب المبلغ المستهلك خلال سنة 2019 $u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{12} = 56000 \frac{\left[1 - \left(\frac{19}{20}\right)^{12}\right]}{1 - \left(\frac{19}{20}\right)} = 514796.7018 DA$
	0.5	ب. المبلغ المدخر خلال هذه السنة $12 \times 70000 - 514796.7018 = 325203.2982DA$
التمرين الثالث: (04 نقاط)		
1.5	0.75	(1) أ. إثبات بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $u_n < \frac{9}{2}$
	0.5 0.25	ب. $u_{n+1} - u_n \geq 0$ ومنه $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{3}(u_n - \frac{9}{2})$ استنتاج أن (u_n) متقاربة
1.75	0.5 0.25	(2) أ. نجد: $v_0 = -\frac{7}{2}$ و $\frac{2}{3}$ و منه (v_n) متالية هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n$
	0.25 0.5	ب. $v_n = -\frac{7}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{9}{2}$ و $u_n = -\frac{7}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{9}{2}$ لدينا:
0.75	0.75	$S_n = \frac{21}{2} \left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 1 \right) + \frac{9}{2}(n+1)$ (3)

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)									
مجموعه	مجازأة										
التمرين الرابع: (08 نقاط)											
1	2x0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$ (1 (I))									
1	0.25 0.25 0.5	2) من أجل كل x من $g'(x) = \frac{2x^2+1}{x}$: $]0; +\infty[$ الدالة g متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$ جدول التغيرات <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$g'(x)$</td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$g(x)$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> </table>	x	0	$+\infty$	$g'(x)$	+		$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$
x	0	$+\infty$									
$g'(x)$	+										
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$									
1	0.25 0.75	3) لدينا: $g(0) = 0$ وبما أن g متزايدة تماما على $[0; +\infty[$ فإن: g سالبة تماما على المجال $]1; +\infty[$ ومحببة تماما على المجال $[0; 1]$.									
1	2x0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2$ (1 (II))									
1	1	$f'(x) = x^2 - 1 + \ln(x) = g(x)$ (2)									
1	0.5 0.5	3) الدالة f متناقصة تماما على المجال $[1; +\infty[$ ومتزايدة تماما على $]0; 1]$. جدول تغيرات.									
1	0.25 0.75	 $f(2) = \frac{2}{3} + 2 \ln 2$ (4) إنشاء (C_f)									
1	1	5) من أجل كل x من المجال $F'(x) = f(x) :]0; +\infty[$									

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموععة	مجزأة	
		التمرين الأول: (04 نقاط)
1	2x0.5	(1) الاقتراح الصحيح: ج، لأن $F'(x) = f(x) \neq 0$ و $F(1) = f(1)$
1	2x0.5	(2) الاقتراح الصحيح: ب، لأن $\frac{F(1)-F(0)}{1-0} = -\frac{8}{9}$
1	2x0.5	(3) الاقتراح الصحيح: أ، لأن $f'(x) \geq 0$ على المجال $[3; +\infty)$
1	2x0.5	(4) الاقتراح الصحيح: أ، لأن $x=5$ تكافئ $f(x)=\frac{-5}{3}$ أو $x=1$
		التمرين الثاني: (04 نقاط)
1	2x 0.5	(1) بيان أن: $v_3 = 32$ و $v_5 = 8$
02	0.75 0.25	(2) أ. بيان أن: $v_0 = 1$ و $q = 2$
	0.5	ب. $v_n = 2^n$.
	0.5	ج. يكافيء $n = 10$ و $2^n = 2^{10}$ وبالتالي $v_n = 1024$
1	0.5	(3) أ. حسابية أساسها 2 و $u_0 = -3$ حيث: $u_n = 2n - 3$ و $w_n = u_n + v_n$
	0.5	ب. بيان أن: $S_n = (n+1)(n-3) + 2^{n+1} - 1$
		التمرين الثالث: (04 نقاط)
1	0.25 0.75	(1) البرهان بالترجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 3$
1	0.75 0.25	(2) متناقصة تماما (u_n) متناقصة تماما ومحددة من الأسفل فهي متقاربة (u_n)
	0.75 0.25	(3) أ. هندسية أساسها $\frac{5}{7}$ و $v_0 = 2$ و منه $v_{n+1} = \frac{5}{7}v_n$.
1.75	0.25	ب. $v_n = 2\left(\frac{5}{7}\right)^n$.
	2x0.25	ج. استنتاج أن: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 3$ و $u_n = 2 \times \left(\frac{5}{7}\right)^n + 3$
0.25	0.25	(4) ومنه أصغر قيمة لـ n هي 5 تكافئ $u_n < \frac{7}{2}$ و $n > \frac{\ln \frac{1}{4}}{\ln \frac{5}{7}}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)								
مجموعه	مجازأة									
		التمرين الرابع: (08 نقاط)								
1	0.75 0.25	(1) g مستمرة ومتزايدة تماما على $]-\infty; +\infty]$ وتأخذ قيمها في $[0; +\infty]$ ومنه المعادلة $0 = g(x)$ تقبل حلا وحيدا α في $[0; +\infty]$ وبما أن: $0.9 < \alpha < 1$: $g(0.9) > g(1) < 0$								
0.5	0.5	(2) على المجال $[\alpha; +\infty]$ $g(\alpha) < 0$ و $g(x) > 0$ وعلى $[0; \alpha]$ $g(x) < 0$								
1	2x0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (1)(II)								
	0.25	. مقارب مائل C_f . $(\Delta): y = 3x - 2$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (3x - 2)) = 0$. أ . ب. وضعية (C_f) بالنسبة (Δ) :								
1	0.25 0.5	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">$+\infty$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$f(x) - (3x - 2)$</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table> <p>$]0; 1[$ فوق (Δ) على (C_f) $].1; +\infty[$ تحت (Δ) على (C_f).</p> <p>• $A(1; 1)$ في النقطة (C_f) يقطع (Δ).</p>	x	0	1	$+\infty$	$f(x) - (3x - 2)$	+	0	-
x	0	1	$+\infty$							
$f(x) - (3x - 2)$	+	0	-							
1.5	0.5	أ . بيان أن: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$								
	0.5	ب. f متزايدة تماما على $[\alpha; +\infty]$ ومتناقصة تماما على $[\alpha; +\infty]$								
	0.5	جدول التغيرات								
1	0.25 0.75	 <p>• إنشاء (Δ) و (C_f) .</p>								
2	1	أ . من أجل كل x من $[0; +\infty]$: $H'(x) = -\frac{\ln x}{x^2}$								
	1	ب. حساب المساحة: $\int_1^2 f(x) dx = 2(3 + 2\ln 2) cm^2$								

الموقع الأول لتحضير الفروض والاختبارات في الجزائر

<https://www.dzexams.com>

https://www.dzexams.com/ar/0ap	القسم التحضيري
https://www.dzexams.com/ar/1ap	السنة الأولى ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/2ap	السنة الثانية ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/3ap	السنة الثالثة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/4ap	السنة الرابعة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/5ap	السنة الخامسة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/bep	شهادة التعليم الابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/1am	السنة الأولى متوسط
https://www.dzexams.com/ar/2am	السنة الثانية متوسط
https://www.dzexams.com/ar/3am	السنة الثالثة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/4am	السنة الرابعة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/bem	شهادة التعليم المتوسط
https://www.dzexams.com/ar/1as	السنة الأولى ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/2as	السنة الثانية ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/3as	السنة الثالثة ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/bac	شهادة البكالوريا