


# الدالة الأُسْيَة

الدالة الأُسْيَة

## الكفاءات المستهدفة



الكفاءات المستهدفة من خلال هذا المحور هي :

تعريف الدالة الأُسْيَة

مشتقة الدالة الأُسْيَة


الدوال الأُسْيَة من الشكل  $x \mapsto e^{kx}$

## ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

- « الوحدة التعلمية: الدوال الأسيّة »
- « ميدان التعلم: التحليل »
- « موضوع الوحدة: دالة الأسيّة »

الاستاذ: بخدة أمين  
المستوى: السنة ثلاثة رياضيات  
المدة: 2 ساعة

- « المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقرير أولي »
- « الكفاءات المستهدفة: التعرف على الدالة الأسيّة التبالية وخصائصها »
- « المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت »

المرأة	عناصر الدرس	الراهن												
٥٥	<p><b>مناقشة نشاط 1 صفحة 75</b></p> <p><b>1</b> إنشاء تمثيل تقريري للدالة <math>f</math> بإستعمال طريقة اول نضع : <math>h = 0,5</math>  <math>f'(x) = f(x)</math> و <math>f(0) = 1</math> لدينا:  ونعلم أن: <math>y_1 = y_0(1+h)</math> أي <math>y_1 = f(x_0) + hf(x_0) \approx f(x_0) + hf'(x_0)</math> ومنه نجد <math>y_2 = y_1(1+h)</math> و <math>y_3 = y_2(1+h)</math> و <math>y_n = y_{n-1}(1+h)</math> إذن الفواصل متالية النقط <math>(x_n; y_n)</math> تشكل حدود متالية حسابية أساسية <math>r = h</math>  و تراتيبيها تشكل حدود متالية هندسية أساسها <math>q = h + 1</math></p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>2</td><td>1,5</td><td>1</td><td>0,5</td><td>0</td><td><math>x_n</math></td></tr> <tr> <td>7,38</td><td>4,48</td><td>2,71</td><td>1,64</td><td>1</td><td><math>y_n</math></td></tr> </table> <p><b>2</b> نعتبر الدالة <math>h</math> المعروفة على <math>\mathbb{R}</math> بـ: <math>h(x) = f(x)f(-x)</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بيان أن <math>h</math> ثابتة على <math>\mathbb{R}</math></li> <li>الدالة <math>h</math> ثابتة معناه <math>h'(x) = 0</math> الدالة <math>h</math> قابلة للإشتقاق على <math>\mathbb{R}</math> و دالتها المشتقة <math>h'</math> حيث :</li> </ul> $ \begin{aligned} h'(x) &= f'(x)f(-x) + f(x)[-f'(-x)] \\ &= f'(x)f(-x) - f'(-x)f(x) \\ &= f(x)f(-x) - f(-x)f(x) \\ &= 0 \end{aligned} $ <p>ومنه <math>h</math> ثابتة على <math>\mathbb{R}</math> إذن <math>f(x)f(-x) = 1</math>: <math>\mathbb{R}</math> من أجل <math>x</math> من <math>\mathbb{R}</math></p> <p>لدينا: <math>f(x) \times f(-x) = 1</math> و منه من أجل <math>x</math> من <math>\mathbb{R}</math> <math>f(x) = f(-x)</math> ، إذن <math>f(x) = f(-x) = 1</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>نبرهن بالخلاف أن <math>f(x) \neq 0</math> ففرض أن <math>f(x) = 0</math> من أجل <math>x \in \mathbb{R}</math> و منه <math>f(-x) = 0</math> و <math>f(x) \times f(-x) = 0</math> وهذا تناقض مع <math>f(x) \times f(-x) = 1</math> ، إذن <math>f(x) \neq 0</math></li> </ul>	2	1,5	1	0,5	0	$x_n$	7,38	4,48	2,71	1,64	1	$y_n$	  
2	1,5	1	0,5	0	$x_n$									
7,38	4,48	2,71	1,64	1	$y_n$									

**3** نفرض أنه توجد دالة ثانية  $g$  تتحقق  $g' = g$  و  $g(0) = 0$  ، بما أن  $f$  لا تتعدي على  $\mathbb{R}$  ، نعتبر الدالة  $k$  المعرفة على  $\mathbb{R}$

$$k(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$$

• تبيان أن الدالة  $k$  ثابتة على  $\mathbb{R}$

قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  و دالتها المشتقة  $k'$  حيث

$$k(x) = \frac{g'(x)f(x) - f'(x)g(x)}{[f(x)]^2} = \frac{g(x)f(x) - f(x)g(x)}{[f(x)]^2} = 0$$

و منه  $k$  ثابتة على  $\mathbb{R}$

• الاستنتاج أن:  $f(x) = g(x)$

$$g(x) = f(x) \text{ و منه } \frac{g(x)}{f(x)} = 1 \text{ و منه } k(0) = \frac{g(0)}{f(0)} = \frac{1}{1} = 1$$

نستنتج أن الدالة  $f$  دالة وحيدة .

$$i(x) = \frac{f(x+y)}{f(y)} \quad \text{ليكن } y \text{ عدد حقيقي ثابت ، نعتبر الدالة } i \text{ المعرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ}$$

• تبيان أن:  $i$  دالة ثابتة على  $\mathbb{R}$

الدالة  $i$  قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  و دالتها المشتقة  $i'$  حيث

$$\mathbb{R} \quad i(x) = \frac{f'(x+y)f(x) - f'(x)}{[f(x)]^2} = \frac{f(x+y)f(x) - f(x)f(x+y)}{[f(x)]^2} = 0$$

• إثبات أن:  $i(x) = f(y)$

$$i(x) = f(y) \text{ و منه } i(0) = \frac{f(y)}{f(0)} = f(y)$$

• إثبات أن:  $f(x+y) = f(x)f(y)$

$$f(x+y) = f(x)f(y) \text{ و منه } i(x) = \frac{f(x+y)}{f(x)}$$

• إثبات أن:  $f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$

$$f(x-y) = f(x+(-y)) = f(x)f(-y) \text{ لدینا :}$$

$$f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)} \text{ و منه } f(-y) = \frac{1}{f(y)} \text{ فإن } f(y)f(-y) = 1$$

$$j(x) = \frac{f(nx)}{[f(x)]^n} \quad \text{ليكن } n \text{ عددا صحيحا نسبيا و لتكن } j \text{ الدالة المعرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ}$$

• إثبات أن  $j$  دالة ثابتة

الدالة  $j$  قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  و دالتها المشتقة  $j'$  حيث :

$$\begin{aligned} j'(x) &= \frac{(f(nx))' \times [f(x)]^n - ([f(x)]^n)' \times f(nx)}{(f(x))^n} \\ &= \frac{nf'(nx) \times [f(x)]^n - nf'(x) [f(x)]^{n-1} \times f(nx)}{(f(x))^{2n}} \\ &= \frac{nf'(nx) \times [f(x)]^n - nf(x) [f(x)]^{n-1} \times f(nx)}{(f(x))^{2n}} \\ &= \frac{n [f(x)]^n (f'(nx) - f(nx))}{[f(x)]^{2n}} \\ &= \frac{n (f'(nx) - f(nx))}{[f(x)]^n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

إذن الدالة  $j$  دالة ثابتة على  $\mathbb{R}$

• إستنتاج أن من أجل كل  $x$  من  $\mathbb{R}$

$$f(nx) = [f(x)]^n: \quad j(x) = j(0) = \frac{f(0)}{[f(0)]^n} = 1$$

من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :

$$f(nx) = [f(x)]^n \quad \text{أي } j(x) = 1 \text{ و منه } \frac{f(nx)}{[f(x)]^n} = 1$$

لدينا من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :

تسمى الدالة الوحيدة  $f$  القابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  حيث:  $f' = f$  ،  $f(0) = 1$  الدالة الأسية النيرية و نرمز لها بالرمز EXP


# الدالة الأسية ١

## مبرهنة وتعريف



٥

توجد دالة وحيدة  $f$  قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  بحيث:  $f' = f$  و  $f(0) = 1$  نرمز إلى هذه الدالة بالرمز "exp" ونسمّها الدالة الأساسية التبيرية  
من أجل كل  $x \in \mathbb{R}$ :  $f(x) = \exp(x)$  وتقرئ أسيّة  $x$



**ملاحظة:** الدالة الأساسية هي حل خاص للمعادلة التفاضلية  $y' = y$  التي تتحقق  $y(0) = 1$

### خواص الدالة الأساسية ١



١٠

**خاصية:** الدالة الأساسية قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  ودالتها المشقة  $\exp'(x) = \exp(x)$

**خاصية:** الدالة الأساسية مستمرة على  $\mathbb{R}$  و  $\exp(0) = 1$

**خاصية:** الدالة الأساسية موجبة تماماً على  $\mathbb{R}$  أي من أجل عدد حقيقي  $x \in \mathbb{R}$ :  $\exp(x) > 0$

## البرهان

نستعمل مبرهنة القيم المتوسطة على المجال  $[0; c]$

من أجل كل عدد حقيقي  $x \neq 0$  (\*)

الدالة  $\exp$  مستمرة على  $\mathbb{R}$

بفرض وجود عدد حقيقي  $c$  حيث  $\exp(c) < 0$  يعني  $\exp(0) \cdot \exp(c) < 0$  تناقض

### خواص جبرية



٥

$$\exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y) \quad ③ \quad \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} \quad ② \quad \exp(x) \neq 0 \quad ①$$

$$\exp(nx) = [\exp(x)]^n \quad ⑤ \quad \exp(x-y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)} \quad ④$$

## العدد $e$ والترميز ٢



٥

العدد  $e$  هو صورة العدد ١ بالدالة الأساسية أي  $e = \exp(1)$ .

تعطينا الحاسبة  $e \approx 2.718281828$

من أجل كل عدد صحيح نسي  $n$ ,  $\exp(n) = [\exp(1)]^n = [\exp(1)]^{n \times 1}$

لدينا إذن: من أجل كل عدد صحيح نسي  $n$ ,  $\exp(n) = e^n$

اصطلاحاً نرمز، من أجل كل عدد حقيقي  $x$ , إلى  $e^x$

## كتابه الخواص السابقة بإستعمال الترميز الجديد



٥

$$e^{x+y} = e^x \times e^y \quad ③ \quad e^{-x} = \frac{1}{e^x} \quad ② \quad e^x \neq 0 \quad ①$$

$$(e^x)' = e^x \quad ⑦ \quad e^0 = 1 \quad ⑥ \quad e^{nx} = (e^x)^n \quad ⑤ \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y} \quad ④$$



١٠


$$c = \frac{e^{2x} + e^x}{e^{2x}}$$

$$b = \frac{e^{2x+3}}{e^{2x} \times e^2}$$

$$a = (e^x)^3 \times e^{-5x} \times e^{2x}$$

## مثال

بسط العبارات التالية:



$$\begin{aligned} c &= \frac{e^{2x} + e^x}{e^{2x}} \\ &= \frac{e^{2x}}{e^{2x}} + \frac{e^x}{e^{2x}} \\ &= 1 + e^{-x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \frac{e^{2x+3}}{e^{2x} \times e^2} \\ &= \frac{e^{2x+3}}{e^{2x+2}} \\ &= e^{2x+3} \times e^{-(2x+2)} \\ &= e^{2x+3-2x-2} \\ &= e \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= (e^x)^3 \times e^{-5x} \times e^{2x} \\ &= e^{3x} \times e^{-5x} \times e^{2x} \\ &= e^{3x-5x+2x} \\ &= e^0 \\ &= 1 \end{aligned}$$



١٥

### تطبيقات

$$f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$$

الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f$  هي  $f(-x) = 1 - f(x)$  فإن  $f$  فردية.

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} = \frac{\frac{1}{e^x}}{1+\frac{1}{e^x}} = \frac{\frac{1}{e^x}}{\frac{e^x+1}{e^x}} = \frac{1}{e^x+1} \\ 1-f(x) &= 1-\frac{e^x}{1+e^x} = \frac{e^x-e^x+1}{e^x+1} = \frac{1}{e^x+1} \end{aligned}$$

إذن  $f(-x) = 1 - f(x)$   
نتيجة: نستنتج أن النقطة  $A\left(0; \frac{1}{2}\right)$  مرکز تناول للمنحى  $(C_f)$

### تمرين محلول

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

أولاً: بين أن الدالة  $f$  فردية.

$$f(2x) = \frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2}$$

### الحل

أولاً: من أجل كل  $x$  من  $\mathbb{R}$ ،  $(-x)$  ينتمي إلى  $\mathbb{R}$  ولدينا:

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{\frac{1}{e^x} - 1}{\frac{1}{e^x} + 1} = \frac{\frac{1-e^x}{e^x}}{\frac{1+e^x}{e^x}} = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

ثانياً:

$$\frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2} = \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{1+\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2} = \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{\frac{(e^x+1)^2+(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}}$$

$$= \frac{2\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)}{\frac{2(e^{2x}+1)}{(e^x+1)^2}} = \left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right) \frac{(e^x+1)^2}{(e^{2x}+1)}$$

$$\frac{2f(x)}{1+[f(x)]^2} = \frac{(e^x-1)(e^x+1)}{(e^{2x}+1)} = \frac{(e^{2x}-1)}{(e^{2x}+1)} = f(2x)$$

و هكذا نجد أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :

تمرين منزل ٣-٢ ص ١٠٢

### ملاحظات حول سير الدرس



## ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

- « الوحدة التعلمية: الدوال الأسيّة »
- « ميدان التعلم: التحليل »
- « موضوع الوحدة: دراسة الدالة الأسيّة »

- « الأستاذ: بخدة أمين »
- « المستوى: السنة ثالثة رياضيات »
- « المدة: 2 ساعة »

- « **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقرير أولي
- « **الكفاءات المستهدفة:** التعرف على الدالة الأسيّة التبّيرية وخصائصها.
- « **المراجع:** الكتاب المدرسي ، الأنترنت »

المراد	عناصر الدرس	المرأة
د 10	<p>التبيّنة النفسيّة</p> <p>تذكير بقواعد الحساب في الدالة الأسيّة</p> <p><b>1 دالة الأسيّة</b></p> <p>اتجاه تغيير الدالة الأسيّة :</p> <p><b>خاصية ①</b></p> <p>من أجل كل عدد حقيقي <math>x &gt; 0</math></p> <p><b>البرهان</b></p> <p>: من أجل كل <math>x \in \mathbb{R}</math></p> $e^x = e^{2 \times \frac{x}{2}} = \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2$ <p><b>خاصية ②</b></p> <p>الدالة الأسيّة متزايدة تماماً على <math>\mathbb{R}</math></p> <p><b>البرهان</b></p> <p>من أجل كل <math>x \in \mathbb{R}</math> ، <math>e^x &gt; 0</math> ومنه <math>exp'(x) = e^x &gt; 0</math> متزايدة تماماً على <math>\mathbb{R}</math></p> <p><b>نتائج</b></p> <p>من أجل كل عددين حقيقيين <math>a</math> و <math>b</math> لدينا :</p> $a = b \Rightarrow e^a = e^b \quad a > b \Rightarrow e^a > e^b$ <p><b>حالة خاصة</b></p> <p>من أجل كل عدد حقيقي <math>x</math> لدينا :</p> $e^x = e^0 \Rightarrow e^x = 1 \quad x < 0 \Rightarrow e^x < e^0 \quad x > 0 \Rightarrow e^x > e^0$ <p><math>x = 0</math> يعني</p>	<p>التبيّنة النفسيّة</p> <p>تذكير بقواعد الحساب في الدالة الأسيّة</p> <p><b>1 دالة الأسيّة</b></p> <p>اتجاه تغيير الدالة الأسيّة :</p> <p><b>خاصية ①</b></p> <p>من أجل كل عدد حقيقي <math>x &gt; 0</math></p> <p><b>البرهان</b></p> <p>: من أجل كل <math>x \in \mathbb{R}</math></p> $e^x = e^{2 \times \frac{x}{2}} = \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2$ <p><b>خاصية ②</b></p> <p>الدالة الأسيّة متزايدة تماماً على <math>\mathbb{R}</math></p> <p><b>البرهان</b></p> <p>من أجل كل <math>x \in \mathbb{R}</math> ، <math>e^x &gt; 0</math> ومنه <math>exp'(x) = e^x &gt; 0</math> متزايدة تماماً على <math>\mathbb{R}</math></p> <p><b>نتائج</b></p> <p>من أجل كل عددين حقيقيين <math>a</math> و <math>b</math> لدينا :</p> $a = b \Rightarrow e^a = e^b \quad a > b \Rightarrow e^a > e^b$ <p><b>حالة خاصة</b></p> <p>من أجل كل عدد حقيقي <math>x</math> لدينا :</p> $e^x = e^0 \Rightarrow e^x = 1 \quad x < 0 \Rightarrow e^x < e^0 \quad x > 0 \Rightarrow e^x > e^0$ <p><math>x = 0</math> يعني</p>
د 10		

## خاصية ③

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

أضف إلى  
ملومناتك

١٠

## البرهان

١ نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على المجال  $[0; +\infty]$  بـ:  $f(x) = e^x - x$   
لدينا من أجل  $x$  من  $[0; +\infty]$ :  $f'(x) = e^x - 1$  و بما أن: من أجل  $x$  من  $[0; +\infty]$ :  $e^x \geq 1$  فإن:  $e^x - 1 \geq 0$  ومنه  $f$  متزايدة تماماً على  $[0; +\infty]$  و  $f(0) = 1$

إذن من أجل كل  $x$  من  $[0; +\infty]$ :  $f(x) > 0$  أي  $e^x > x$  لدينا:  $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = +\infty$  ومنه  $\lim_{x \rightarrow \infty} x = +\infty$

٢ من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $\mathbb{R}$ :  $e^x = \frac{1}{e^{-x}}$  نضع  $y = -x$  إذن لما  $x$  يؤول إلى  $-\infty$  فإن  $y$  يؤول إلى  $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{e^{-x}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^y} = 0$$

## جدول التغيرات

$x$	$-\infty$	0	$+\infty$
$exp'(x)$		+	
$exp(x)$	0	1	$+\infty$

## التمثيل البياني

• المنحنى ( $C$ ) الممثل للدالة الأسية يقبل حامل محور الفواصل  $x \rightarrow -\infty$  كمستقيم مقارب لما  $x$  يؤول إلى

• لدينا  $1 = exp(0) = exp'(0)$  إذن المنحنى ( $C$ ) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة 0 مماساً له  $y = x + 1$  معادلة له

• من تعريف العدد المشتق لدينا  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{0+x} - e^0}{x} =$


$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \text{ إذن: } exp'(0) = 1$$

## نتيجة

الدالة  $x \mapsto e^x$  هي أحسن تجريب تألفي للدالة  $x \mapsto e^x$  بمحوار 0.

أي من أجل كل  $x$  قريب من 0 لدينا:  $e^x \approx x + 1$

التقويم



١٥

الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $f(x) = \frac{4e^x + 3}{2(e^x + 1)}$  و ( $C_f$ ) المنحنى الممثل لها في المستوى إلى معلم متعامد و متجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  حيث:  $\|\vec{i}\| = 2\text{cm}$

٢٥

١ أحسب نهاية الدالة  $f$  عند  $-\infty$  و  $+\infty$  ، ثم فسر النتيجة هندسياً .

٢ أحسب  $f'(x)$  من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $\mathbb{R}$  .

٣ أدرس إتجاه تغير الدالة  $f$  .

٤ أرسم المستقيمات المقاربة للمنحنى ( $C_f$ ) .

## ٢ تطبيقات المعادلات و المترابحات

2



١٠



٢٥

طريقة

المعادلة  $u(x) = v(x)$  تعني  $e^{u(x)} = e^{v(x)}$

المترابحة  $u(x) < v(x)$  تعني  $e^{u(x)} < e^{v(x)}$

ملاحظة

مجموعة تعريف المعادلة أو المترابحة هي :  $D_v \cap D_u$

التقويم

### تطبيق

حل في  $\mathbb{R}$  المعادلات و المترابحات التالية :

$$e^{x+1} > e^{-\frac{2}{x}} \quad ⑥ \quad e^{3x} < 1 \quad ⑦ \quad e^{x+3} = e^{\frac{4}{x}} \quad ⑧ \quad e^{-x^2} = \frac{1}{e} \quad ⑨ \quad e^x = e^{-2x} \quad ⑩ \quad e^{2x} = 1 \quad ⑪$$

$$e^{7x} + 5 = 0 \quad ⑫ \quad e^{2x} > 2 - e^x \quad ⑬ \quad e^{2x} > 2e^x - 1 \quad ⑭$$

تمرين منزلي

ليكن  $(C)$  منحى مثل الدالة  $e^x \mapsto x$  في مستوى منسوب إلى معلم متعدد و متجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  ولتكن  $M(m, e^m)$  نقطة من  $(C)$  ، ول يكن  $\mathbb{T}$  ماس للمنحنى  $(C)$  في النقطة  $M$

١ أحسب ميل الماس في النقطة  $M$  ، ثم أكتب معادله

٢ لتكن الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $g(x) = e^x - e^m(x - m + 1)$

• أدرس تغيرات الدالة  $g$  و شكل جدول تغيراتها

٣ إستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $\mathbb{R} : g(x) > 0$

٤ إستنتج الوضع النسبي بين  $(C)$  و جميع مسالاته.

ملاحظات حول سير الدرس




## ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

- « الوحدة التعليمية: الدوال الأسيّة »
- « ميدان التعلم: التحليل »
- « موضوع الوحدة: الدوال الأسيّة :  $x \mapsto e^{kx}$  »

- « الأستاذ: بخدة أمين »
- « المستوى: السنة ثلاثة رياضيات »
- « المدة: ١ ساعه »

- « المكتسبات القبلية: مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقرير أولي »
- « الكفاءات المستهدفة: التعرف على الدالة الأسيّة التبالية وخصائصها. »
- « المراجع: الكتاب المدرسي ، الأنترنت »

المرأة	عناصر الدرس	المراحل
١٥ د	<p>التبيئة النفسية</p> <p>تذكير بقواعد الحساب في الدالة الأسيّة</p> <p><b>١ حقيقة المعاكلة :</b></p> <p><b>مبرهنة وتعريف</b></p> <p>توجد دالة وحيدة <math>f</math> قابلة للإشتقاق على <math>\mathbb{R}</math> بحيث: <math>f' = kf</math> و <math>f(0) = 1</math> هي الدالة <math>f(x) = e^{kx}</math></p> <p><b>البرهان</b></p> <p><b>الوجود</b></p> <p>لتكن <math>f</math> الدالة المعرفة على <math>\mathbb{R}</math> بـ <math>f(x) = e^{kx}</math> الدالة <math>f</math> قابلة للإشتقاق على <math>\mathbb{R}</math> ولدينا من أجل كل <math>x \in \mathbb{R}</math> كـ <math>f'(x) = ke^{kx} = kf(x)</math> كـ <math>f'(0) = k = 1</math> وبالتالي الدالة <math>f</math> تحقق <math>f' = kf</math> و <math>f(0) = 1</math></p> <p><b>الوحدانية</b></p> <p>نفرض وجود دالة ثانية <math>g</math> قابلة للإشتقاق على <math>\mathbb{R}</math> بحيث <math>g'(0) = g(0) = 1</math>، نعتبر الدالة <math>h</math> المعرفة على <math>\mathbb{R}</math> كـ <math>h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}</math>، الدالة <math>h</math> قابلة للإشتقاق على <math>\mathbb{R}</math> ولدينا من أجل كل <math>x \in \mathbb{R}</math> كـ <math>h'(x) = \frac{g'(x)f(x) - g(x)f'(x)}{[f(x)]^2} = \frac{kg(x)f(x) - g(x)kf(x)}{[f(x)]^2} = 0</math> إذن <math>h</math> ثابتة على <math>\mathbb{R}</math> مع <math>h(x) = h(0) = \frac{g(0)}{f(0)} = 1</math> ومنه من أجل كل <math>x \in \mathbb{R}</math> كـ <math>h(x) = 1</math> وعليه <math>g(x) = f(x)</math> إذن الدالة <math>f</math> موجودة ووحيدة.</p> <p><b>مثال</b></p> <p><b>١</b> عـين كل الدوال القابلة للإشتقاق على <math>\mathbb{R}</math> بحيث: <math>f'(x) - 2f(x) = 0</math></p> <p><b>٢</b> من بين الدوال <math>f</math> <math>f'(x) - 2f(x) = 0</math> عـين تلك منها البصري يمر من النقطة <math>A\left(\frac{1}{2}; e^2\right)</math></p> <p><b>الحل</b></p> <p><math>f'(x) - 2f(x) = 0</math> تعـني <math>f'(x) = 2f(x)</math> ومنه <math>f = kf</math> مع <math>k = 2</math> <math>f = 2f(x)</math> كـ <math>f(x) = Ce^{2x}</math> حيث <math>C</math> عدد حقيقي ثابت.</p>	١٥ د
١٥ د		



المثيلات المقابلة هي لدوال  $f$  المعروفة على  $\mathbb{R}$  كألي بلي  $f(x) = Ce^{2x}$   
**2** بحث إذن عن الدالة  $f$  حيث  $f(x) = Ce^{2x}$  مع  $C = e^k$  أي  $Ce^1 = e^2$  ومنه  $Ce^{2(\frac{1}{2})} = e^2$  إذن الدالة الوحيدة  $f$  حيث  $f'(x) - 2f(x) = 0$  والتي منحناها  
 البياني يمر من النقطة  $A\left(\frac{1}{2}; e^2\right)$  هي الدالة  $x \mapsto e^{2x+1}$



٥

أضف إلى  
ملحوظاتك

مبرهنة ②

الدوال غير المعدومة  $f$  قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  بحيث : من أجل كل عددين حقيقيين  $x$  و  $y$  حيث  $x \mapsto e^{kx}$  هي الدالة  $f(x+y) = f(x)f(y)$



٢٥

$f$  دالة معرفة على  $\mathbb{R}$  وغير معدومة حيث من أجل كل عددين حقيقيين  $x$  ،  $y$  لدينا :

**1** بين أن  $f(0) = 1$

**2** بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :  $f(x) \times f(-x) = 1$

**3** بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  :  $f\left(\frac{x}{2}\right) \times f\left(\frac{x}{2}\right) = f(x)$

**4** إستنتج إشارة  $f(x)$

التقويم

تطبيق

تمرين رقم 12 صفحه 112  
 تمرين رقم 13 صفحه 112

تمرين منز {11 – 15 } صفحه {102}

ملاحظات حول سير الدرس

## ثانوية ساجي مختار السمار - غليزان

- « الوحدة التعليمية: الدوال الأساسية »
- « ميدان التعلم: التحليل »
- « موضوع الوحدة: دراسة دالة:  $e^{u(x)}$  »

- « الأستاذ: بخدة أمين »
- « المستوى: السنة ثلاثة رياضيات »
- « المدة: 2 ساعة »

« **المكتسبات القبلية:** مفاهيم أولية حول الدوال العددية، العمليات على الدوال المشتقة، تقرير أولى

« **الكافاءات المستهدفة:** دراسة إتجاه تغير الدالة  $(x) \mapsto \exp \circ u(x)$  »

« **المراجع:** الكتاب المدرسي ، الأنترنت »

الرقة	عناصر الدرس	الراهن
10	<p>التبيئة النفسية</p> <p>تذكير بمشتقه دالة مركب <math>\exp \circ u</math></p>	
11	<p><b>مبرهنة ①</b></p> <p>نضع: <math>f(x) = e^{u(x)}</math> حيث <math>u</math> دالة عدديّة مجموعه تعريف الدالة <math>f</math> هي نفسها مجموعه تعريف الدالة <math>u</math> ، إذن: <math>D_f = D_u</math></p> <p>إتجاه تغير الدالة <math>\exp \circ u</math></p>	
12	<p><b>مبرهنة ②</b></p> <p>إذا كانت <math>u</math> دالة معرفة على المجال <math>I</math> من <math>\mathbb{R}</math> فإن للدالتين <math>u</math> و <math>\exp \circ u</math> نفس إتجاه التغير على <math>I</math></p>	
13	<p><b>البرهان</b></p> <p>نعلم أن الدالة <math>\exp</math> متزايدة تماما على <math>\mathbb{R}</math> ، إذن حسب المبرهنة الخاصة بإتجاه تغير دالة مركبة يكون للدالتين <math>u</math> و <math>\exp \circ u</math> نفس إتجاه التغيرات على المجال <math>D_u</math></p>	
14	<p><b>مثال</b></p> <p>نعتبر الدالة <math>f</math> المعرفة على <math>\mathbb{R}</math> بناءً على <math>f(x) = e^x</math>. نلاحظ أن: <math>f = \exp \circ u</math> هي الدالة المعرفة على <math>\mathbb{R}</math> بناءً على <math>u(x) = x^2</math> بما أن الدالة <math>u</math> متناقصة تماما على المجال <math>[0; +\infty]</math> – [ فإن: الدالة <math>f</math> متناقصة تماما على المجال <math>[0; +\infty]</math> بما أن الدالة <math>u</math> متزايدة تماما على المجال <math>[0; +\infty]</math> فإن: الدالة <math>f</math> متناقصة تماما على المجال <math>[0; +\infty]</math></p>	
15	<p><b>النهايات</b></p> <p><b>مبرهنة ③</b></p> <p>نعتبر الدوال التاليّة <math>u</math> ، <math>e^x</math> و <math>f</math> حيث <math>f = \exp \circ u</math> و <math>f(x) = e^{u(x)}</math> إذا كانت <math>b</math> ، <math>a</math> ، <math>c</math> و <math>d</math> أعداداً حقيقية أو <math>+\infty</math> أو <math>-\infty</math> <math>\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c</math> و <math>\lim_{x \rightarrow b} e^x = d</math> فإن <math>\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b</math></p>	

## مثال

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = e^{-x+2}$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x+2} = +\infty$  وبما أن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$  فإن  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x+2) = +\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  أي  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x+2} = 0$  وبما أن  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$  فإن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x+2) = -\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$  أي  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x+2} = -\infty$  وبما أن  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = -\infty$  فإن  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x+2) = -\infty$   
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

## المشتقة

### مبرهنة ③

إذا كانت  $u$  دالة قابلة للإشتقاق على مجال  $I$  فإن للدالة  $\exp \circ u$  قابلة للإشتقاق على  $I$   
 $(\exp \circ u)'(x) = u'(x)e^{u(x)}$  ولدينا من أجل كل  $x$  من  $I$

أضف إلى

معلوماتك



15

## البرهان

إذا كانت الدالة  $u$  قابلة للإشتقاق على  $I$  وعلينا أن الدالة  $\exp$  قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  فإن: الدالة المركبة  $\exp \circ u$  قابلة للإشتقاق على  $I$  وبنطبيق قاعدة حساب مشتقة دالة مركبة تكون لدينا من أجل كل  $x$  من  $I$   
 $(\exp \circ u)'(x) = u'(x)\exp'(x)[u(x)] = u'(x)\exp(x)[u(x)]$

## مثال

مشتقة الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = e^{-x^2+3x-5}$  هي :

مشتقة الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}^+$  بـ  $f(x) = e^{\sqrt{x}}$  هي :

التقويم



10



50

## تطبيق

لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = e^{x^3+3x+1}$

1 أدرس تغيرات الدالة  $f$

2 أثبت أن المعادلة  $2 = f(x)$  تقبل حلًا وحيدًا على المجال  $[0; -1]$ .

## بكالوريا 2013 شعبة علوم تجريبية

(I) الدالة المعرفة على  $[-\infty; 1]$  بـ  $f(x) = \frac{x}{x-1} + e^{\frac{1}{x-1}}$  تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

1 أحسب  $f(x)$  و  $f'(x)$  ، ثم استنتج المستقيمين المقاربين للمنحي  $(C)$ .

2 أحسب  $f'(x)$  . بين أن الدالة  $f$  متزايدة تماما على المجال  $[-\infty; 1]$  ، ثم شكل جدول تغيراتها.

3 بين أن المعادلة  $0 = f(x)$  تقبل في  $[-\infty; 1]$  حلًا وحيدًا.

باستعمال جدول القيم أعلاه جد حصرا للعدد  $a$ .

4. أرسم المستقيمين المقاربين والمنحي  $(C)$  ، ثم أرسم المنحي  $(C')$  الممثل للدالة  $|f|$ .

5. عين بيانيا مجموعة قيم الأعداد الحقيقة  $m$  التي من أجلها يكون للمعادلة  $m = |f(x)|$  حلان مختلفان في الإشارة.

6) الدالة المعرفة على  $[-\infty; 1]$  بـ  $f(x) = g(2x-1) \cdot g(x)$  . عباره  $(x)$  غير مطلوبة (II)

$x$	$f(x)$
0,20	0,037
0,21	0,016
0,22	-0,005
0,23	-0,026
0,24	-0,048
0,25	-0,070

**1** أدرس تغيرات الدالة  $g$  على  $[-\infty; 1]$  ، ثم شكل جدول تغيراتها.


أ) تتحقق أن  $0$  ، ثم بين أن  $(\alpha)$  :  $\cdot g' \left( \frac{\alpha+1}{2} \right) = 2f' \left( \frac{\alpha+1}{2} \right)$

ب) إستنتج معادلة  $(T)$  المماس لمنحنى الدالة  $g$  في النقطة ذات الفاصلة  $\frac{\alpha+1}{2}$ .

ج) تتحقق من أن  $0$  ، معادلة للمستقيم  $(T)$  :

$$y = \frac{2}{(\alpha-1)^3}x - \frac{\alpha+1}{(\alpha-1)^3}$$

**بكالوريا 2019 شعبة تقني رياضي**



I) الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  كالتالي:

و  $(C_g)$  تمثلها البياني كما هو مبين في الشكل . بقراءة بيانية:

حدّد إشارة  $g(-1)$  و  $g(-\frac{1}{2})$ . **1**

إستنتج وجود عدد حقيقي  $\alpha$  وحيد من المجال  $\left] -1; -\frac{1}{2} \right[$  **2**

حيث  $g(\alpha) = 0$  ثم تتحقق أن  $-0.8 < \alpha < -0.7$  :

إستنتاج إشارة  $g(x)$  على  $\mathbb{R}$ . **3**

II) الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:

و  $(C_f)$  تمثلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . **1**

2) بين أنه من كل عدد حقيقي  $x$  ،  $f'(x) = g(x)$  ثم كل جدول تغيرات الدالة  $f$ .

أ) أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x)$  ثم إستنتج أن  $(C_f)$  يقبل مستقيما مقاربا مائلا  $(\Delta)$  يطلب تعين معادلة له. **3**

ب) أدرس الوضع النسيي للمنحنى  $(C_f)$  والمستقيم  $(\Delta)$ .

ج) أكتب معادلة لـ  $(T)$  ماس  $(C_f)$  الموازي للمستقيم  $(\Delta)$ .

أرسم المستقيم  $(\Delta)$  والمنحنى  $(C_f)$  على المجال  $[-\infty; 1]$  (يعطى  $-0.7$ ). **4**

أحسب  $f(x) - g(x)$  ثم إستنتاج دالة الأصلية للدالة  $f$  على  $\mathbb{R}$ . **5**

6) الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  كالتالي :  $h(x) = |x|(e^{|x|-2} - 1) + 1$  و  $(C_h)$  تمثلها البياني في المعلم السابق .

أ) بين أن الدالة  $h$  زوجية.

ب) تأكّد أنه من أجل كل  $x$  من المجال  $[0; +\infty)$  فإن  $h(x) = f(x-2) + 1$ :

ج) إشرح كيف يمكن رسم  $(C_h)$  إنطلاقا من  $(C_f)$  ثم أرسم  $(C_h)$  على المجال  $[-3; 3]$ .

ليكن  $f_k$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f_k(x) = (x+1)^2 e^{-kx}$  حيث  $K$  وسيط حقيقي. I

1) بين أن كل المنحنيات  $(C_k)$  تمر من نقطتين ثابتتين يطلب تعينهما.

2) أحسب نهايي الدالة  $f_K$  عند  $-\infty$  و  $+\infty$ . (ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي  $K$ ) .

أ) أحسب  $(f'_k(x))$  ، ثم حدد حسب قيم الوسيط الحقيقي  $K$  إتجاه تغير الدالة  $f_k$ .

ب) شكل جدول تغيرات الدالة  $f_k$  من أجل  $K$  عدد حقيقي موجب تماماً.

4) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي  $K$  الأوضاع النسبية للمنحنيات  $(C_k)$  و  $(C_{k+1})$ .

نسمعي  $f$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = (x+1)^2 e^{-2x}$  تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . II

1) شكل جدول تغيرات الدالة  $f$  ، ثم أرسم المنحنى  $(C_f)$  على المجال  $\left[-\frac{3}{2}; +\infty\right]$ .

أ) بين أن المعادلة  $1 = f(x)$  تقبل حلّين في  $\mathbb{R}$  أحدهما  $\alpha$  حيث  $-1,27 < \alpha < -1,28$ .

ب) عين قيم العدد الحقيقي  $m$  التي من أجلها تقبل المعادلة:  $\left| \frac{x+1}{e^x} \right| = \left| \frac{m+1}{e^m} \right|$  حالاً وحيداً.

3) g الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $g(x) = (x+1)e^{-2x}$ .

أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  فإن:  $0 = g'(x) + 2g(x) - e^{-2x}$  ثم إستنتج دالة أصلية لـ  $g$  على  $\mathbb{R}$ .

ب) بإستعمال المكاملة بالتجزئة ، أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  ومحور الفواصل و المستقيمين اللذين معادلاتها  $-1 = x = 0$ .

المستوى منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  . توحد وحدة الطول  $2cm$  .  
 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}ex^2$  و  $g(x) = e^x - ex$  كلياً :  $f$  و  $g$  المعرفتين على  $\mathbb{R}$  كلياً

أ) أدرس إتجاه تغير الدالة  $g$ .

ب) إستنتاج إشارة  $(x) g$  حسب قيم  $x$  الحقيقة.

2) أدرس إتجاه تغير الدالة  $f$ .

3) أحسب كلاً من  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $f$ .

4) أدرس الوضع النسيي للمنحنيات  $(C_f)$  و  $(C_g)$  على  $\mathbb{R}$ .

5) أرسم على المجال  $[0; 2]$  المنحنيات  $(C_f)$  و  $(C_g)$  في نفس المعلم  $(\vec{i}, \vec{j})$  . (يعطى  $2 \approx e^2 - 2e$ ).

6) أحسب بالسنتيمتر المربع ، مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيات  $(C_f)$  و  $(C_g)$  .

7) h الدالة المعرفة على المجال  $[2; -2]$  كلياً :  $h(x) = \frac{1}{2}ex^2 - e^{|x|}$  ولتكن  $(\Gamma)$  تمثيلها البياني في المعلم السابق

أ) بين أن  $h$  دالة زوجية.

ب) من أجل  $x \in [0; 2]$  أحسب  $f(x) + h(x)$  ثم إستنتاج كيفية رسم  $(\Gamma)$  إنطلاقاً من  $(C_f)$  ثم أرسمه.